

# Liste der in Berlin und Brandenburg nachgewiesenen Dipteren

erstellt auf der Basis der Sammlungsbestände des Museums für Naturkunde Berlin und der in der Fachliteratur publizierten Daten

von Hubert Schumann

## Mücken

FAMILIE / <i>Gattung</i> / Art / Autor	- 1900	1901- 1949	1950 -	Anmerkungen/Synonyma /Subgenera
<b>ANISOPODIDAE Fenstermücken</b> [ <i>Mycetobiidae, Rhyphidae, Phryneidae</i> ]				<b>BB: 5 / Dt.: 8 / Eur.: 10 / Ww: 110 Arten</b>
<i>Mycetobia</i> Meigen, 1818				<i>Mycetoica</i>
<i>pallipes</i> Meigen, 1818		+		
<i>Sylvicola</i> Harris, [1776]				<i>Phryne, Anisopus, Rhyphus</i>
<i>cincta</i> (Fabricius, 1787)	o	+		
<i>fenestralis</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>fuscata</i> (Fabricius, 1775)	o			
<i>punctata</i> (Fabricius, 1787)	o	+		
<b>BIBIONIDAE Haarmücken</b> [ <i>Hesperinidae, Penthetriidae</i> ]				<b>BB: 17 / Dt.: 20 / Eur.: 47 / Ww: 700 Arten</b>
<i>Bibio</i> Geoffroy, 1762				<i>Pullata, Hirtea, Bibiophus</i>
<i>clavipes</i> Meigen, 1818	o	+		
<i>femoralis</i> Meigen, 1838	o	+		
<i>ferruginatus</i> (Linnaeus, 1767)	o	+		
<i>hortulanus</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>johannis</i> (Linnaeus, 1767)	o	+		
<i>lanigerus</i> Meigen, 1818	o	+		
<i>lepidus</i> Loew, 1871			x	
<i>leucopterus</i> (Meigen, 1804)		+		
<i>marci</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>nigriventris</i> Haliday, 1833	o	+		
<i>pomona</i> (Fabricius, 1775)	o		x	
<i>reticulatus</i> Loew, 1846	o	+		
<i>varipes</i> Meigen, 1830	o	+		
<i>venosus</i> (Meigen, 1804)	o	+		
<i>Dilophus</i> Meigen, 1803				<i>Philia, Triploctenia, Tridiploctena, Dactylodisca, Cnemidoctenia</i>
<i>febrilis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>femoratus</i> Meigen, 1804	o	+	x	
<i>humeralis</i> Zetterstedt, 1850		+		
<b>BLEPHARICERIDAE Lidmücken</b> [ <i>Liponeuridae</i> ]				<b>BB: 0 / Dt.: 7 / Eur.: 37 / Ww: 335 Arten</b>
<b>BOLITOPHILIDAE Bolitophiliden</b> [ehem. zu Mycetophilidae]				<b>BB: 4 / Dt.: 22 / Eur.: 33 / Ww: 55 Arten</b>
<i>Bolitophila</i> Meigen, 1818				<i>Messala, Bolitophilella, Cliopisa</i>
<i>bimaculata</i> Zetterstedt, 1838		x		
<i>cinerea</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>hybrida</i> (Meigen, 1804)	o	+		
<i>maculipennis</i> Walker, 1836		+		
<b>CANTHYLOSCELIDAE Canthylosceliden</b> [ <i>Hyperoscelidae</i> ]				<b>BB: 0 / Dt.: 1 / Eur.: 2 / Ww: 9 Arten</b>
<b>CECIDOMYIIDAE Gallmücken</b> [ <i>Lestremiidae, Itonididae, Heteropezidae</i> ]				<b>BB: 255 / Dt.: 836 / Eur.: 1.639 / Ww: 5.000 Arten</b>
<i>Acodiplosis</i> Kieffer, 1895				<i>Arthroceratis, Neurodiplosis</i>
<i>inulae</i> (H. Loew, 1947)	+			

<b><i>Acoenonia</i></b> Pritchard, 1947				
<i>nana</i> Meyer & Spungis, 1994			x	
<b><i>Allarete</i></b> Pritchard, 1951				<i>Allaretina</i>
<i>vernalis</i> (Felt, 1908)			x	
<b><i>Ametrodiplosis</i></b> Rübsaamen, 1910				<i>Anthodiplosis, Loewodiplosis, Cyrtodiplosis</i>
<i>thalietricola</i> (Rübsaamen, 1895)	+			
<b><i>Anaretella</i></b> Enderlein, 1911				
<i>defecta</i> (Winnertz, 1870)			x	
<b><i>Anisostephus</i></b> Rübsaamen, 1917				
<i>betulinum</i> (Kieffer, 1889)	+			
<b><i>Aphidoletes</i></b> Kieffer, 1904				<i>Phaenobremia</i>
<i>aphidimyza</i> (Rondani, 1847)	+			
<b><i>Aprionus</i></b> Kieffer, 1894				<i>Apriocryptus</i>
<i>brachypterus</i> Edwards, 1938			x	
<i>confusus</i> Mamaev, 1969			x	
<i>halteratus</i> (Zetterstedt, 1852)			x	
<i>miki</i> Kieffer, 1895			x	
<b><i>Arnoldiola</i></b> Strand, 1926				<i>Arnoldia</i>
<i>gemmae</i> (Rübsaamen, 1921)	+	+		Locus typicus: Berlin
<i>quercus</i> (Binnie, 1877)	+			
<b><i>Arthrocnodax</i></b> Rübsaamen, 1895				<i>Asomyia</i>
<i>incana</i> (Rübsaamen, 1890)	+			
<i>vitis</i> Rübsaamen, 1895	+			
<i>jaapi</i> Rübsaamen, 1921		+		Locus typicus: in Brandenburg
<b><i>Asphondylia</i></b> H. Loew, 1850				<i>Ischnonyx, Ussurasphondylia, Phyllophaga, Chenasphondylia, Monasphondyla, Eumarchalia, Gisnobasis</i>
<i>ervi</i> Rübsaamen, 1896	+			
<b><i>Brachydiplosis</i></b> Rübsaamen, 1910				
<i>caricum</i> Rübsaamen, 1910	+	+		Locus typicus: Berlin
<b><i>Bremiola</i></b> Rübsaamen, 1915				
<i>onobrychidis</i> (Bremer, 1847)	+			
<b><i>Bryomyia</i></b> Kieffer, 1895				<i>Tomonomyia</i>
<i>bergrothi</i> Kieffer, 1895			x	
<b><i>Campylomyza</i></b> Meigen, 1818				
<i>flavipes</i> Meigen, 1818	o		x	
<i>fusca</i> Winnertz, 1870			x	
<b><i>Catocha</i></b> Haliday, 1833				
<i>latipes</i> Haliday, 1833	o		x	
<b><i>Cecidomyia</i></b> Meigen, 1803				<i>Itonidia, Cryptodiplosis, Diplosis</i>
<i>pini</i> (De Geer, 1782)	+			
<b><i>Claspettomomyia</i></b> Grover, 1964				<i>Pachylabis</i>
<i>chrysanthemi</i> (Panelius, 1965)			x	
<i>niveitarsis</i> (Zetterstedt, 1850)			x	
<b><i>Clinodiplosis</i></b> Kieffer, 1894				<i>Alethediplosis, Carpodiplosis, Calamondiplosis</i>
<i>botularia</i> (Winnertz, 1853)	x			
<i>cilicrus</i> (Kieffer, 1889)	+		+	
<i>oleracei</i> Rübsaamen, 1917		+		Locus typicus: in Brandenburg
<b><i>Colomyia</i></b> Kieffer, 1891				
<i>caricis</i> Rübsaamen, 1899	x	+		Locus typicus: Berlin
<b><i>Contarinia</i></b> Rondani, 1860				<i>Stenodiplosis, Atylodiplosis, Syndiplosis, Eudiplosis, Stictodiplosis, Dexodiplosis, Dryodiplosis</i>
<i>acetosellae</i> (Rübsaamen, 1891)	+			
<i>anthobia</i> (F. Löw, 1877)	+			
<i>barbichi</i> (Kieffer, 1890)	+			

<i>coryli</i> (Kaltenbach, 1859)			x	
<i>cracca</i> Kieffer, 1897	+			
<i>floriperda</i> Rübsaamen, 1917		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>gei</i> Kieffer, 1909	+	+		Locus typicus für <i>C. geicola</i> Rübs., 1917 in Brbg.
<i>hypochoeridis</i> (Rübsaamen, 1891)	+			Locus typicus: Berlin
<i>jaapi</i> Rübsaamen, 1914		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>lamiicola</i> Rübsaamen, 1915		+ x		Locus typicus: in Brandenburg
<i>molluginis</i> (Rübsaamen, 1889)	+			
<i>nasturtii</i> (Kieffer, 1888)	+			
<i>nicolayi</i> (Rübsaamen, 1895)	+			
<i>pastinaceae</i> (Rübsaamen, 1891)	+			Locus typicus: Berlin
<i>petioli</i> (Kieffer, 1898)	+		x	
<i>pilosellae</i> Kieffer, 1896		+		
<i>pisi</i> (Winnertz, 1854)	+			
<i>polygonati</i> Rübsaamen, 1921		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>populi</i> Rübsaamen, 1917		+		
<i>sambuci</i> (Kaltenbach, 1873)	x			
<i>scutati</i> Rübsaamen, 1910	+	x		
<i>solani</i> (Rübsaamen, 1891)	+	+		Locus typicus: Berlin
<i>steini</i> (Karsch, 1881)	+			Locus typicus: Berlin
<i>thlaspeos</i> Rübsaamen, 1910		+		
<i>tiliarum</i> (Kieffer, 1890)	+	+		
<i>tritici</i> (Kirby, 1798)	+			
<i>Coquillettomyia</i> Felt, 1908				<i>Almatamyia, Picrodiplosis, Pelodiplosis, Strobilodiplosis</i>
<i>caricis</i> (Möhn, 1955)			x	
<i>dentata</i> Felt, 1918			x	
<i>mirifica</i> (Marikovskij, 1953)			x	
<i>Cystiphora</i> Kieffer, 1892				<i>Laubertia</i>
<i>sanguinea</i> (Bremer, 1847)	+			
<i>sonchi</i> (Bremer, 1847)	+			
<i>Dasineura</i> Rondani, 1840				<i>Dasyneura, Perrisia</i>
<i>acrophila</i> (Winnertz, 1853)	+			
<i>affinis</i> (Kieffer, 1886)	+	+	x	
<i>angelicae</i> Rübsaamen, 1915		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>auritae</i> Rübsaamen, 1915	+			
<i>brassicae</i> (Winnertz, 1853)	+			
<i>capsulae</i> Kieffer, 1901	+			
<i>crataegi</i> (Winnertz, 1853)	+			
<i>dioicae</i> (Rübsaamen, 1895)	+	x		Locus typicus: Berlin
<i>dryophila</i> (Rübsaamen, 1917)		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>engstfeldi</i> (Rübsaamen, 1889)	+	+		
<i>filicina</i> (Kieffer, 1889)	+			
<i>foliumcrispans</i> (Rübs., 1896)	+	+		
<i>frangulae</i> (Rübsaamen, 1917)	+	+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>fructum</i> (Rübsaamen, 1895)	+			Locus typicus: Berlin
<i>galiicola</i> (F. Löw, 1880)	+			
<i>glechomae</i> (Kieffer, 1889)	+			
<i>harrisoni</i> (Bagnall, 1922)		+		Locus typicus f. <i>D. jaapiana</i> Rübs., 1917: in Brbg.
<i>hygrophila</i> (Mik, 1883)	+			
<i>hyperici</i> (Bremer, 1847)	+			
<i>irregularis</i> (Bremer, 1847)	+			
<i>kleini</i> (Rübsaamen, 1891)	+			
<i>loewiana</i> Rübsaamen, 1917		+		

<i>lotharingiae</i> (Kieffer, 1888)	+			
<i>mali</i> (Kieffer, 1904)		+		
<i>medicaginis</i> (Bremi, 1847)			x	
<i>papaveris</i> (Winnertz, 1853)		+		
<i>periclymeni</i> (Rübsaamen, 1889)		+		
<i>plicatrix</i> (H. Loew, 1850)	+	+		
<i>populeti</i> (Rübsaamen, 1889)	+			
<i>potentillae</i> (Wachtl, 1885)	+			
<i>pteridicola</i> (Kieffer, 1901)		+		
<i>pulsatillae</i> (Kieffer, 1894)		+		
<i>pustulans</i> (Rübsaamen, 1889)	+			
<i>salviae</i> (Kieffer, 1909)			+	
<i>schulzei</i> (Rübsaamen, 1917)		+		Locus typicus: Berlin
<i>similis</i> (F. Löw, 1888)	+	+		
<i>sisymbrii</i> (Schränk, 1803)	+			
<i>strumosa</i> (Bremi, 1847)		+		
<i>subpatula</i> (Bremi, 1847)	o +			
<i>symphyti</i> (Rübsaamen, 1891)	+			Locus typicus: Berlin
<i>tetensi</i> (Rübsaamen, 1891)	+			Locus typicus: Berlin
<i>thomasiana</i> (Kieffer, 1888)	+	+		
<i>tiliae</i> (Schränk, 1803)	+	+		
<i>tortilis</i> (Bremi, 1847)	+			
<i>trifolii</i> (F. Löw, 1874)	+	+		
<i>tubicola</i> (Kieffer, 1889)		+		
<i>ulmaria</i> (Bremi, 1847)	+	+		
<i>urticae</i> (Perris, 1840)	+			
<i>viciae</i> (Kieffer, 1888)	+			
<i>violae</i> (F. Löw, 1880)	+	+		
<b><i>Dicerura</i> Kieffer, 1898</b>				<i>Iridomyza, Ulmomyia</i>
<i>iridis</i> (Kaltenbach, 1874)	x			
<b><i>Didymomyia</i> Rübsaamen, 1912</b>				
<i>tiliacea</i> (Bremi, 1847)	+			
<b><i>Feltiella</i> Rübsaamen, 1911</b>				
<i>tetranychii</i> Rübsaamen, 1911		x		Locus typicus: Berlin
<b><i>Geocrypta</i> Kieffer, 1913</b>				
<i>braueri</i> (Handlirsch, 1884)		+		
<i>galii</i> (H. Loew, 1850)	+			
<b><i>Giraudiella</i> Rübsaamen, 1915</b>				
<i>inclusa</i> (Frauenfeld, 1862)	+			
<b><i>Harmandia</i> Kieffer, 1896</b>				
<i>globuli</i> (Rübsaamen, 1889)	+	+		
<i>populi</i> Rübsaamen, 1917		+	x	
<i>tremulae</i> Winnertz, 1853	+			
<b><i>Hartigiola</i> Rübsaamen, 1912</b>				
<i>annulipes</i> (Hartig, 1839)			x	
<b><i>Holobremia</i> Kieffer, 1912</b>				
<i>fallacicornis</i> (Kieffer, 1904)			x	
<b><i>Iteomyia</i> Kieffer, 1913</b>				
<i>capreae</i> (Winnertz, 1853)	+			
<b><i>Jaapiella</i> Rübsaamen, 1915</b>				
<i>bryoniae</i> (Bouché, 1847)	o			
<i>catariae</i> Rübsaamen, 1915		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>cirsicola</i> Rübsaamen, 1915		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>compositarum</i> (Kieffer, 1888)	+			

<i>crinita</i> (Rübsaamen, 1891)	+			
<i>jaapiana</i> (Rübsaamen, 1914)		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>loticola</i> (Rübsaamen, 1889)	+			
<i>rubicundula</i> (Rübsaamen, 1891)	+	+		
<i>sarothamni</i> Rübsaamen, 1917		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>schmidti</i> (Rübsaamen, 1912)		+		
<i>thalictri</i> (Rübsaamen, 1895)	+			Locus typicus: Berlin
<i>vacciniorum</i> (Kieffer, 1895)	+			
<i>veronicae</i> (Vallot, 1827)	o +			
<i>volvans</i> Rübsaamen, 1917		+		Locus typicus: in Brandenburg
<b><i>Kiefferia</i> Mik, 1895</b>				
<i>pericarpücola</i> (Bremer, 1847)	+	+		
<b><i>Kiefferiola</i> Tavares, 1920</b>				
<i>panteli</i> (Kieffer, 1909)	+			
<b><i>Lasioptera</i> Meigen, 1818</b>				<i>Prolasioptera, Thomasiella</i>
<i>calamagrostidis</i> Rübsaamen, 1893	+			Locus typicus: Berlin
<i>molinae</i> Möhn, 1968			x	Locus typicus: Berlin
<i>populnea</i> Wachtl, 1883	+	+		
<i>rubi</i> (Schrank, 1803)	+		x	
<b><i>Lestodiplosis</i> Kieffer, 1894</b>				<i>Coprodiplosis, Tjanshaniella, Chliodiplosis, Phonodiplosis, Leptodiplosis, Hemidiplosis</i>
<i>ceomatis</i> (Winnertz, 1853)		+		
<i>morchellae</i> Rübsaamen, 1911			x	
<i>necans</i> (Rübsaamen, 1891)	+			
<i>tarsonemi</i> Rübsaamen, 1895	+			
<i>vorax</i> (Rübsaamen, 1891)	+			
<b><i>Lestremia</i> Macquart, 1826</b>				
<i>cinerea</i> Macquart, 1826			+	
<i>leucophaea</i> (Meigen, 1818)	o			
<b><i>Macrodiplosis</i> Kieffer, 1895</b>				
<i>dryobia</i> (F. Löw, 1875)	+		x	
<i>volvans</i> Kieffer, 1895		+		
<b><i>Macrolabis</i> Kieffer, 1892</b>				
<i>achilleae</i> Rübsaamen, 1893	+			
<i>cirsii</i> (Rübsaamen, 1890)	+			
<i>dulcamarae</i> (Rübsaamen, 1891)	+			
<i>heraclei</i> (Kaltenbach, 1862)	+			
<i>hieracii</i> Rübsaamen, 1917		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>incolens</i> Rübsaamen, 1895	+			
<i>stellariae</i> (Liebel, 1889)	+			
<b><i>Mayetiola</i> Kieffer, 1896</b>				<i>Poomyia, Chortomyia, Caulomyia</i>
<i>bimaculata</i> (Rübsaamen, 1895)	+			
<i>destructor</i> (Say, 1817)	o +			
<i>molinae</i> (Rübsaamen, 1895)	+			
<i>radicifica</i> (Rübsaamen, 1895)	+			Locus typicus: Berlin
<b><i>Miastor</i> Meinert, 1864</b>				
<i>metraloas</i> Meinert, 1864	+		+	
<b><i>Mikiola</i> Kieffer, 1896</b>				
<i>fagi</i> (Hartig, 1839)	+			
<b><i>Mikomya</i> Kieffer, 1912</b>				
<i>coryli</i> (Kieffer, 1901)	+			
<b><i>Monardia</i> Kieffer, 1895</b>				<i>Mycopriona, Vulcanardia, Furcapriona, Procnomyia, Trichopteromyia, Xylopriona</i>
<i>atra</i> (Meigen, 1804)			+	

<i>monilicornis</i> (Zetterstedt, 1838)			x	
<i>obsoleta</i> Edwards, 1938			x	
<i>stirpium</i> Kieffer, 1895			x	
<i>toxicodendri</i> (Felt, 1907)			x	
<b><i>Mycodiplosis</i> Rübsaamen, 1895</b>				<i>Isodiplosis</i>
<i>gloeopeniophorae</i> Rübs., 1926		x		Locus typicus: in Brandenburg
<i>pucciniae</i> (Rübsaamen, 1889)			x	
<b><i>Neoisodiplosis</i> Holz, 1970</b>				
<i>corticii</i> (Rübsaamen, 1926)		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>longisaetosa</i> Holz, 1970			x	Locus typicus: in Brandenburg
<b><i>Neomikiella</i> Hedicke, 1938</b>				<i>Mikiella</i>
<i>lychnidis</i> (Heyden, 1861)	x			
<b><i>Neomycodiplosis</i> Holz, 1970</b>				
<i>ruebsaameni</i> Holz, 1970			x	Locus typicus: in Bandenburg
<b><i>Neurolyga</i> Rondani, 1840</b>				<i>Cordylomyia, Microcordylomyia</i>
<i>fenestralis</i> Rondani, 1840			x	
<i>verna</i> (Mamaev, 1963)			x	
<b><i>Octodiplosis</i> Giard, 1894</b>				
<i>glyceriae</i> (Rübsaamen, 1894)	+			Locus typicus: Berlin
<b><i>Oligotrophus</i> Latreille, 1805</b>				
<i>juniperinus</i> (Linnaeus, 1758)	+			
<b><i>Ozirhincus</i> Rondani, 1840</b>				<i>Clinorhynchia</i>
<i>longicollis</i> Rondani, 1840			+	als chrysanthemii (Loew, 1850) (syn.)
<i>millefolii</i> (Wachtl, 1884)	+	+		
<b><i>Parallelodiplosis</i> Rübsaamen, 1910</b>				
<i>galliperda</i> (F. Löw, 1889)	+	+		
<b><i>Parepidosis</i> Kieffer, 1913</b>				
<i>argentifera</i> (de Meijere, 1906)			x	
<b><i>Peromyia</i> Kieffer, 1894</b>				
<i>borealis</i> (Felt, 1919)			x	
<i>caricis</i> (Kieffer, 1901)			x	
<i>cornuta</i> (Edwards, 1938)			x	
<i>ovalis</i> (Edwards, 1938)			x	
<i>palustris</i> (Kieffer, 1895)			x	
<i>ramosa</i> (Edwards, 1938)			x	
<b><i>Physemocecis</i> Rübsaamen, 1914</b>				
<i>hartigi</i> (Liebel, 1892)	+			
<i>ulmi</i> (Kieffer, 1909)	+			
<b><i>Planetella</i> Westwood, 1840</b>				<i>Hormomyia, Jaapiola, Diplolaboncus, Planetes</i>
<i>arenariae</i> (Rübsaamen, 1899)	+			
<i>caricis</i> (Rübsaamen, 1911)	+			
<i>gallarum</i> (Rübsaamen, 1899)	+			
<i>grandis</i> (Meigen, 1804)		+		
<i>granifex</i> (Kieffer, 1898)		x	x	
<i>rosenhaueri</i> (Rübsaamen, 1892)	+			
<i>tarda</i> (Rübsaamen, 1914)		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>tumorifica</i> (Rübsaamen, 1899)	+			
<b><i>Plemeliella</i> Seitner, 1908</b>				
<i>betulicola</i> (Kieffer, 1889)	+			
<b><i>Polyardis</i> Pritchard, 1947</b>				
<i>adela</i> Pritchard, 1947			x	
<i>bispinosa</i> (Mamaev, 1963)			x	
<i>silvalis</i> (Rondani, 1840)			x	
<b><i>Porricondyla</i> Rondani, 1840</b>				<i>Vesperomyia</i>

<i>distinguenda</i> Mamaev, 1963			x	
<i>photophila</i> Spungis, 1981			x	
<b><i>Rabdophaga</i> Westwood, 1847</b>				<i>Helicomylia</i>
<i>albipennis</i> (H. Loew, 1850)	+			
<i>clavifex</i> (Kieffer, 1891)	+	+	#	
<i>dubiosa</i> (Kieffer, 1913)	+	+		
<i>exsiccans</i> (Rübsaamen, 1915)		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>gemmicola</i> (Kieffer, 1896)		+		Locus typicus f. <b><i>R. gemmarum</i></b> (Rübs.) : in Brbg.
<i>heterobia</i> (H. Loew, 1850)	+			
<i>karschi</i> (Kieffer, 1892)	+	+		
<i>marginemtorquens</i> (Bremi, 1847)		+		
<i>nervorum</i> (Kieffer, 1895)	+			
<i>nielseni</i> Kieffer & Nielsen, 1906		+		
<i>pierrei</i> (Kieffer, 1896)		+		
<i>pseudococcus</i> (Thomas, 1890)	+	+		
<i>ramicola</i> (Rübsaamen, 1905)		x		
<i>repentis</i> (Skuhrová, 1986)		x		
<i>rosaria</i> (H. Loew, 1850)	o +		x	
<i>saliciperda</i> (Dufour, 1841)		+		
<i>salicis</i> (Schränk, 1803)	+	+		
<i>terminalis</i> (H. Loew, 1850)	+			
<i>viminalis</i> (Westwood, 1847)		x		
<b><i>Rhopalomyia</i> Rübsaamen, 1892</b>				<i>Diarthronomyia, Boucheella</i>
<i>artemisiae</i> (Bouché, 1834)	o +		x	Locus typicus: ? Berlin
<i>cristaegalli</i> (Karsch, 1877)	x	+		Locus typicus: bei Berlin
<i>magnusi</i> Rübsaamen, 1893	+			
<i>millefolii</i> (H. Loew, 1850)	+			
<i>tubifex</i> (Bouché, 1847)	o			Locus typicus: ? Berlin
<b><i>Rondaniola</i> Hedicke, 1938</b>				<i>Rondaniella</i>
<i>bursaria</i> (Bremi, 1847)	+			
<b><i>Schizomyia</i> Kieffer, 1889</b>				
<i>galiorum</i> Kieffer, 1889	+			
<b><i>Schmidtella</i> Rübsaamen, 1914</b>				
<i>gemmarum</i> Rübsaamen, 1914	+	+		
<b><i>Spurgia</i> Gagné, 1990</b>				
<i>capitigena</i> (Bremi, 1847)	+			
<b><i>Sterrhaulul</i> Rübsaamen, 1915</b>				
<i>corneolus</i> (Rübsaamen, 1899)	+			
<b><i>Stroblia</i> Kieffer, 1898</b>				
<i>brachycornis</i> Spungis & Jas., 2000			x	
<b><i>Thecodiplosis</i> Kieffer, 1895</b>				
<i>brachyptera</i> (Schwäggrichen, 1835)	+			
<b><i>Thurauia</i> Rübsaamen, 1899</b>				
<i>aquatica</i> Rübsaamen, 1899	+			Locus typicus: Berlin
<i>uliginosa</i> Rübsaamen, 1899	+			Locus typicus: Berlin
<b><i>Tricholaba</i> Rübsaamen, 1917</b>				
<i>similis</i> Rübsaamen, 1917		+		
<b><i>Wachtliella</i> Rübsaamen, 1915</b>				

<i>persicariae</i> (Linnaeus, 1767)	+			
<i>riparia</i> (Winnertz, 1853)		+		
<i>rosarum</i> (Hardy, 1850)	+			
<i>stachydis</i> (Bremi, 1847)	+			
<b><i>Winnertzia</i> Rondani, 1861</b>				<i>Lobowinnertzia, Mycowinnertzia, Xyloinnertzia</i>
<i>nigripennis</i> Kieffer, 1896			+	
<i>salicis</i> (Bouché, 1834)	o +			als <b><i>W. boucheana</i></b> Loew (syn.)
<b><i>Xenodiplosis</i> Felt, 1911</b>				<i>Allodiplosis</i>
<i>laeviusculi</i> (Rübsaamen, 1910)		+		Locus typicus: Berlin
<b>CERATOPOGONIDAE Gnitzén [<i>Heleidae</i>]</b>				<b>BB: 38 / Dt.: 325 / Eur.: 588 / Ww: 5.155 Arten</b>
<b><i>Atrichopogon</i> Kieffer, 1906</b>				<i>Psammopogon, Kempia, Meleohela, Psilokempia, Gymnohelea, Rostropogon</i>
<i>lucorum</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>oedemerarum</i> Stora, 1939			x	
<i>pavidus</i> (Winnertz, 1852)	o			?
<i>rostratus</i> (Winnertz, 1852)	o			?
<b><i>Bezzia</i> Kieffer, 1899</b>				<i>Homobezzia, Phaenobezzia, Silviabezziella, Isohela, Pygobezzia, Lasiobezzia</i>
<i>flavicornis</i> (Staeger, 1839)	o			?
<i>nobilis</i> (Winnertz, 1852)		+		
<i>rubiginosa</i> (Winnertz, 1852)	o			?
<i>signata</i> (Meigen, 1804)	o			?
<i>winnertziana</i> Kieffer, 1919		+		
<b><i>Ceratopogon</i> Meigen, 1803</b>				<i>Helea, Psilohelea, Isohelea, Anakempia</i>
<i>niveipennis</i> Meigen, 1804	o			?
<b><i>Clinohelea</i> Kieffer, 1917</b>				
<i>rubiginosa</i> (Winnertz, 1852)	o			?
<b><i>Culicoides</i> Latreille, 1809</b>				<i>Avarita, Beltranmyia, Monoculicoides, Callotia, Oecacta, Wirthomyia, Diplosella, Prosapelma, Trihecodes, Pontoculicoides</i>
<i>pulicaris</i> (Linnaeus, 1759)	o	+	x	
<i>riethi</i> Kieffer, 1914			x	
<i>scoticus</i> Downes & Kettle, 1952			x	
<b><i>Dasyhelea</i> Kieffer, 1911</b>				<i>Dicryptoscena, Prokempia, Pseudoculicoides, Sebessia, Cryptoscena</i>
<i>flavoscutellata</i> (Zetterstedt, 1850)		+		
<b><i>Forcipomyia</i> Meigen, 1818</b>				<i>Euprojoannisia, Lasiohelea, Coloforcipomyia, Synthyridomyia, Labidomyia, Lepidohelea, Apelma, Microhelea, Trichohelea, Panhelea, Thyridomyia, Phytohelea, Pterobosca</i>
<i>bipunctata</i> (Linnaeus, 1767)		+	x	Locus typicus f. <b><i>C. trichopterus</i></b> Mg., 1818: Berlin
<i>ciliata</i> (Winnertz, 1852)			x	
<i>eques</i> (Johannsen, 1908)		+		
<i>fuliginosa</i> (Meigen, 1818)	x	+		Locus typicus f. <b><i>C. crudelis</i></b> Karsch, 1886: Berlin
<i>pulchrithorax</i> Edwards, 1924			x	
<i>regulus</i> (Winnertz, 1852)	o			?
<i>sanguinolenta</i> Kieffer, 1925		#		Locus typicus: Berlin
<i>titillans</i> (Winnertz, 1852)	o			?
<b><i>Macropeza</i> Meigen, 1818</b>				<i>Macroptilum, Haasiella</i>
<i>albitarsis</i> Meigen, 1818	o			?
<b><i>Monohelea</i> Kieffer, 1917</b>				<i>Allohelea, Schizohela, Kiefferomyia</i>
<i>leucopeza</i> (Meigen, 1804)		+		
<b><i>Palpomyia</i> Meigen, 1818</b>				<i>Apogon, Alasion, Gluhhovia</i>
<i>flavipes</i> (Meigen, 1804)	o	+	x	
<i>fulva</i> (Macquart, 1826)	o			?
<i>lineata</i> (Meigen, 1804)		#	x	Locus typicus für <b><i>P. murina</i></b> Kieffer, 1925 : Berlin



<i>serripes</i> (Meigen, 1818)	o			?
<i>terrea</i> (Meigen, 1818)		#		Loc. typicus f. <i>P. oldenbergi</i> Gtghb., 1932: Berlin
<i>tibialis</i> (Meigen, 1818)	o			?
<b><i>Probezzia</i> Kieffer, 1906</b>				<i>Dicrobezzia</i>
<i>seminigra</i> (Panzer, 1798)	o	+		
<b><i>Serromyia</i> Meigen, 1818</b>				<i>Prionomyia, Ceratolophus, Johannseniella</i>
<i>femorata</i> (Meigen, 1804)	o	+	x	
<b><i>Sphaeromyias</i> Curtis, 1829</b>				<i>Xylocrypta</i>
<i>candidatus</i> (Loew, 1856)		+		
<i>fasciatus</i> (Meigen, 1804)	o	+		
<i>pictus</i> (Meigen, 1818)		+		Locus typicus: Berlin
<b>CHAOBORIDAE Büschelmücken [<i>Chironomapedidae, Mesotendipedidae</i>]</b>				<b>BB: 4 / Dt.: 7 / Eur.: 9 / Ww: 200 Arten</b>
<b><i>Chaoborus</i> Lichtenstein, 1800</b>				<i>Corethra, Pseusomyia, Proboscistoma, Cryophila, Schadonophasma</i>
<i>crystallinus</i> (De Geer, 1776)	o	+		
<i>flavicans</i> (Meigen, 1830)		+	x	
<i>obscuripes</i> (van der Wulp, 1859)		+		
<b><i>Mochlonyx</i> Loew, 1844</b>				
<i>velutinus</i> (Ruthé, 1881)		+		
<b>CHIRONOMIDAE Zuckmücken [<i>Tendipedidae</i>]</b>				<b>BB: 88 / Dt.: 696 / Eur.: 1.229 / Ww: 15.000 Arten</b>
<b><i>Ablabesmyia</i> Johannsen, 1905</b>				
<i>longistyla</i> Fittkau, 1962			x	
<i>monilis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>phatta</i> (Egger, 1863)			x	
<b><i>Anatopynia</i> Johannsen, 1905</b>				
<i>plumipes</i> (Fries, 1823)		+		
<b><i>Arctopelobia</i> Fittkau, 1962</b>				
<i>barbitarsis</i> (Zetterstedt, 1850)			x	
<b><i>Camptocladius</i> van der Wulp, 1776</b>				
<i>stercorarius</i> (De Geer, 1776)	o	+	+	
<b><i>Chironomus</i> Meigen, 1803</b>				<i>Chaetolabis, Loboichironomus, Tendipes, Haltedahlos, Camptochironomus</i>
<i>aprilinus</i> Meigen, 1830		+		
<i>pilicornis</i> (Fabricius, 1787)		+		
<i>plumosus</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>prasinus</i> Meigen, 1804		+		
<i>riparius</i> Meigen, 1804	o			?
<i>tentans</i> Fabricius, 1805			x	
<b><i>Cladopelma</i> Kieffer, 1921</b>				
<i>bicarinata</i> Brundin, 1947			x	
<b><i>Cladotanytarsus</i> Kieffer, 1921</b>				<i>Atanytarsus</i>
<i>difficilis</i> Brundin, 1947			x	
<i>dispersopilosus</i> Goetghebuer, 1935			x	
<i>iucundus</i> Hirvenoja, 1962			x	
<b><i>Clinotanypus</i> Kieffer, 1913</b>				
<i>nervosus</i> (Meigen, 1818)	o	+		
<b><i>Conchapelopia</i> Fittkau, 1957</b>				
<i>melanops</i> (Meigen, 1818)		+	x	
<b><i>Cricotopus</i> van der Wulp, 1874</b>				<i>Isocladius, Nostococladius, Eucriotopus</i>
<i>bicinctus</i> (Meigen, 1818)	o	+		
<i>pirifer</i> Hirvenoja, 1973			x	Locus typicus: in Brandenburg
<i>sylvestris</i> (Fabricius, 1794)	o	+	x	
<i>tibiales</i> (Meigen, 1804)	o			?
<i>tricinctus</i> (Meigen, 1818)	o	+		

<b><i>Cryptochironomus</i></b> Kieffer, 1918				
<i>defectus</i> (Kieffer, 1913)			x	
<b><i>Demeijerea</i></b> Kruseman, 1933				<i>Demeigerea</i>
<i>rufipes</i> (Linnaeus, 1761)	o	+		
<b><i>Dicotendipes</i></b> Kieffer, 1913				<i>Limnochironomus, Calochironomus, Kimius</i>
<i>nervosus</i> (Staeger, 1839)		+	x	
<i>notatus</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Endochironomus</i></b> Kieffer, 1918				
<i>dispar</i> (Meigen, 1830)			x	
<b><i>Glyptotendipes</i></b> Kieffer, 1913				<i>Phytodentipes</i>
<i>pallens</i> (Meigen, 1804)		x	x	
<i>signatus</i> (Kieffer, 1909)			x	
<b><i>Hydrobaenus</i></b> Fries, 1830				<i>Psilocerus, Eutrissocladius</i>
<i>lugubris</i> Fries, 1830	x	+		Locus typicus f. <i>Ch.occultans</i> Meigen, 1830: Berlin
<b><i>Krenopelopia</i></b> Fittkau, 1962				
<i>binotata</i> (Wiedemann, 1817)			x	
<b><i>Labrundinia</i></b> Fittkau, 1962				
<i>longipalpis</i> (Goethgebuer, 1921)			x	
<b><i>Lauterborniella</i></b> Thienem. & B., 1913				
<i>agrayloides</i> (Kieffer, 1911)			x	
<b><i>Limnophyes</i></b> Eaton, 1875				
<i>natalensis</i> (Kieffer, 1914)			+	
<b><i>Macropelopia</i></b> Thienemann, 1916				
<i>nebulosa</i> (Meigen, 1804)		+		
<b><i>Mesosmittia</i></b> Brundin, 1956				
<i>flexuella</i> (Edwards, 1929)			x	
<b><i>Metriocnemus</i></b> van der Wulp, 1874				<i>Chasmatocladius, Wulpiella</i>
<i>atriclava</i> Kieffer, 1921			x	
<i>fuscipes</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Microtendipes</i></b> Kieffer, 1915				
<i>pedellus</i> (De Geer, 1776)	o			?
<b><i>Monopelopia</i></b> Fittkau, 1962				
<i>tenuicalcar</i> (Kieffer, 1918)			x	
<b><i>Paramerina</i></b> Fittkau, 1962				
<i>cingulata</i> (Walker, 1856)			x	
<b><i>Parapsectra</i></b> Reiss, 1969				
<i>styriaca</i> (Reiss, 1969)			x	Locus typicus: in Brandenburg
<b><i>Paratanytarsus</i></b> Thienem. & B., 1913				
<i>tenuis</i> (Meigen, 1830)		+	x	
<b><i>Paratendipes</i></b> Kieffer, 1911				
<i>albimanus</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Polypedilum</i></b> Kieffer, 1912				<i>Tripodura, Pentapedilum, Pentapelma</i>
<i>hirtiforceps</i> Kieffer, 1926		#		nom. dubia, Locus typicus: Berlin
<i>nubeculosum</i> (Meigen, 1804)		+	x	
<b><i>Procladius</i></b> Skuse, 1889				<i>Holotanypus, Psilotanypus</i>
<i>choreus</i> (Meigen, 1804)		+	x	
<i>crassinervis</i> (Zetterstedt, 1838)	o		x	
<i>culiciformis</i> (Linnaeus, 1767)		+		
<i>flavifrons</i> Edwards 1929			x	
<i>fuscus</i> Brundin, 1956			x	
<i>imicola</i> Kieffer, 1922			x	
<i>islandicus</i> (Goethgebuer, 1931)			x	
<i>nudipennis</i> Brundin, 1947			x	
<i>pectinatus</i> Kieffer, 1909			x	

<i>rufovittatus</i> (van d. Wulp, 1874)			x	
<i>signatus</i> (Zetterstedt, 1850)			x	
<i>suecicus</i> Brundin, 1949			x	
<b><i>Prodiamesa</i> Kieffer, 1906</b>				<i>Trichodiamesia</i>
<i>olivacea</i> (Meigen, 1818)			x	
<b><i>Propsilocerus</i> Kieffer, 1923</b>				<i>Synpsilocerus</i>
<i>lacustris</i> Kieffer, 1923			+	Locus typicus f. <i>P. lusatiensis</i> Barth., 1964: Berlin
<b><i>Psectrocladius</i> Kieffer, 1906</b>				<i>Allospectrocladius</i> , <i>Mesopsectrocladius</i> , <i>Monopsectrocladius</i>
<i>sordidellus</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<b><i>Psectrotanypus</i> Kieffer, 1909</b>				<i>Derotanypus</i>
<i>varius</i> (Fabricius, 1787)	o	+		
<b><i>Rheocricotopus</i> Thienem. &amp; B., 1913</b>				
<i>glabricollis</i> (Meigen, 1830)	o			?
<b><i>Smittia</i> Holmgren, 1869</b>				<i>Euphaenocladus</i> , <i>Phaenocladus</i>
<i>aterrima</i> (Meigen, 1818)			+	
<i>edwardsi</i> Goetghebuer, 1932			x	
<i>foliacea</i> (Kieffer, 1921)			x	
<i>leucopogon</i> (Meigen, 1804)	o			?
<b><i>Stictochironomus</i> Kieffer, 1919</b>				<i>Allochironomus</i>
<i>pictulus</i> (Meigen, 1830)	o			?
<i>sticticus</i> (Fabricius, 1781)		+		
<b><i>Tanypus</i> Meigen, 1803</b>				<i>Pelopia</i> , <i>Protenithes</i>
<i>punctipennis</i> Meigen, 1818	o	+		
<i>vilipennis</i> (Kieffer, 1918)			x	
<b><i>Tanytarsus</i> van der Wulp, 1874</b>				<i>Calopsectra</i> , <i>Fournieria</i> , <i>Xenotanytarsus</i> , <i>Clinotanytarsus</i> , <i>Ditanytarsus</i> , <i>Tetratanytarsus</i>
<i>gregarius</i> Kieffer, 1909			x	
<i>medius</i> Reiss & Fittkau, 1971			x	Locus typicus: in Brandenburg
<i>striatulus</i> Lindeberg, 1976			x	
<b><i>Thienemannimyia</i> Fittkau, 1957</b>				
<i>carnea</i> (Fabricius, 1805)	o			?
<i>vitellina</i> (Kieffer, 1916)			x	
<b><i>Tribelos</i> Townes, 1945</b>				
<i>intextus</i> (Walker, 1856)			x	
<b>CULICIDAE Stechmücken</b>				<b>BB: 39 / Dt.: 46 / Eur.: 104 / Ww: 3.209 Arten</b>
<b><i>Aedes</i> Meigen, 1818</b>				<i>Aedimorphus</i> , <i>Ochlerotatus</i> , <i>Edwardsaedes</i> , <i>Finlaya</i> , <i>Verrallina</i> , <i>Rusticoidus</i> , <i>Acartomyia</i> , <i>Stegomyia</i> , <i>Feltianus</i> , <i>Neomelaniconion</i>
<i>annulipes</i> (Meigen, 1830)		+	x	
<i>cantans</i> (Meigen, 1818)		+	x	
<i>caspicus</i> (Pallas, 1771)		+	+	
<i>cataphylla</i> Dyar, 1916		+	x	
<i>cinereus</i> Meigen, 1818		+	x	
<i>communis</i> (De Geer, 1776)		+	x	
<i>cypricus</i> Ludlow, 1919		+	x	
<i>diantaeus</i> Howard et all, 1913		x	x	
<i>dorsalis</i> (Meigen, 1830)		+		Locus typicus: Berlin
<i>excrucians</i> (Walker, 1856)		+	x	
<i>flavescens</i> (Müller, 1764)			x	
<i>geminus</i> Peus, 1970			+	Locus typicus: Berlin
<i>geniculatus</i> (Olivier, 1791)		+	x	
<i>intrudens</i> Dyar, 1919			x	
<i>leucomelas</i> (Meigen, 1804)			x	
<i>punctor</i> (Kirby in Richardson, 1837)		+	+	

<i>refiki</i> Medschid, 1928		+		
<i>riparius</i> Dyar & Knab, 1907		+		
<i>rossicus</i> Dolbeskin et al., 1930			x	
<i>rusticus</i> (Rossi, 1790)		+	x	
<i>sticticus</i> (Meigen, 1838)			x	
<i>vexans</i> (Meigen, 1830)	o	+	x	Locus typicus: Berlin
<b><i>Anopheles</i> Meigen, 1818</b>				<i>Myzorhynchus, Rossia, Myzomyia, Aldrichia, Cellia</i>
<i>algeriensis</i> Theobald, 1903			x	
<i>claviger</i> (Meigen, 1804)		+	x	
<i>maculipennis</i> Meigen, 1818	o	+	+ x	Locus typicus: Berlin
<i>plumbeus</i> Stephens, 1828		+		
<b><i>Coquilletidia</i> Dyar, 1905</b>				
<i>richiardii</i> (Rossi, 1790)			x	
<b><i>Culex</i> Linnaeus, 1758</b>				<i>Maillotia, Lophoceraomyia, Barraudius, Lutzia, Neoculex, Maillotia, Culiciomyia, Barraudius, Eumelanomyia, Lasiosiphon, Jamesia</i>
<i>hortensis</i> Ficalbi, 1889			x	
<i>martinii</i> Medschid, 1930			x	
<i>modestus</i> Ficalbi, 1890			x	
<i>pipiens pipiens</i> Linnaeus, 1758	o	+	+	
<i>pipiens erectus</i> Iglisch, 1977			x	Locus typicus: Berlin
<i>pipiens torridus</i> Iglisch, 1977			x	Locus typicus: Berlin
<i>territans</i> Walker, 1856		+		
<i>torrentium</i> Martini, 1925			x	
<b><i>Culiseta</i> Felt, 1904</b>				<i>Culicella, Allotheobaldia, Theobaldinella</i>
<i>alaskaensis</i> (Ludlow, 1906)		+	x	
<i>annulata</i> (Schrank, 1776)		+	x	
<i>morsitans</i> (Theobald, 1901)			x	
<i>ochroptera</i> Peus, 1935		+		Locus typicus: in Brandenburg
<b>CYLINDROTOMIDAE Moosmücken</b>				<b>BB: 4 / Dt.: 4 / Eur.: 6 / Ww: 70 Arten</b>
<b><i>Cylindrotoma</i> Macquart, 1834</b>				
<i>distinctissima</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Diogma</i> Edwards, 1938</b>				
<i>glabrata</i> (Meigen, 1818)	o	+		
<b><i>Phalacrocera</i> Schiner, 1863</b>				
<i>replicata</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<b><i>Triogma</i> Schiner, 1863</b>				
<i>trisulcata</i> (Schummel, 1829)		+		
<b>DIADOCIDIIDAE Diadociden [ehem. zu Mycetophilidae]</b>				<b>BB: 1 / Dt.: 4 / Eur.: 5 / Ww: 10 Arten</b>
<b><i>Diadocidia</i> Ruthe, 1831</b>				<i>Macronevra, Adidocida</i>
<i>ferruginosa</i> (Meigen, 1830)		+		
<b>DITOMYIIDAE Ditomyiden [ehem. zu Mycetophilidae]</b>				<b>BB: 2 / Dt.: 4 / Eur.: 4 / Ww: 90 Arten</b>
<b><i>Ditomyia</i> Winnertz, 1846</b>				
<i>fasciata</i> (Meigen, 1818)		x		
<b><i>Symmerus</i> Walker, 1848</b>				<i>Plesiastina</i>
<i>annulatus</i> (Meigen, 1830)		+		
<b>DIXIDAE Tastermücken</b>				<b>BB: 9 / Dt.: 16 / Eur.: 32 / Ww: 400 Arten</b>
<b><i>Dixa</i> Meigen, 1818</b>				<i>Palaeodixa</i>
<i>maculata</i> Meigen, 1818	o	+		
<i>nebulosa</i> Meigen, 1830		+		
<i>nubilipennis</i> Curtis, 1832		+		
<i>puberula</i> Loew, 1849		#		
<i>submaculata</i> Edwards, 1920		+		
<b><i>Dixella</i> Dyar &amp; Shannon, 1924</b>				<i>Paradixa, Dixina</i>

<i>aestivalis</i> (Meigen, 1818)		o	+		
<i>amphibia</i> (De Geer, 1776)			+		
<i>autumnalis</i> (Meigen, 1838)			+		
<i>serotina</i> (Meigen, 1818)		x			Locus typicus: Berlin
<b>HESPERINIDAE Hesperiniden [ehem. zu Bibionidae]</b>					<b>BB: 0 / Dt.: 1 / Eur.: 2 / Ww: 5 Arten</b>
<b>KEROPLATIDAE Plathornmücken [Macroceridae]</b>					<b>BB: 16 / Dt.: 60 / Eur.: 109 / Ww: 800 Arten</b>
<i>Asindulum</i> Latreille, 1805					<i>Asyndulum</i>
<i>nigrum</i> Latreille, 1805			+		
<i>Isoneuromyia</i> Brunetti, 1912					
<i>semirufa</i> (Meigen, 1818)		o	+		
<i>Macrocera</i> Meigen, 1803					<i>Euphrosyne, Geneja, Promacrocera</i>
<i>angulata</i> Meigen, 1818			+		
<i>centralis</i> Meigen, 1818			+		
<i>fasciata</i> Meigen, 1804			+		
<i>fascipennis</i> Staeger, 1840			+		
<i>fastuosa</i> Loew, 1869			+		
<i>lutea</i> Meigen, 1804			+		
<i>maculata</i> Meigen, 1818		x			Locus typicus: bei Berlin
<i>phalerata</i> Meigen, 1818		x	+		Locus typicus: Berlin
<i>pusilla</i> Meigen, 1830			+		
<i>stigma</i> Curtis, 1837			+		
<i>Neoplatyura</i> Malloch, 1928					<i>Platyura</i>
<i>flava</i> (Macquart, 1826)			+		
<i>Orfelia</i> Costa, 1857					<i>Zelmira</i>
<i>fasciata</i> (Meigen, 1804)			+		
<i>nigricornis</i> (Fabricius, 1805)			+		
<i>Urytalpa</i> Edwards, 1929					
<i>ochracea</i> (Meigen, 1818)			+		
<b>LIMONIIDAE Stelzmücken [Archotipulidae, ehem. zu Tipulidae]</b>					<b>BB: 125 / Dt.: 280 / Eur.: 545 / Ww: 9.000 Arten</b>
<i>Achyrolimonia</i> Alexander, 1965					
<i>decemmaculata</i> (Loew, 1873)			+		
<i>Atypophthalmus</i> Brunetti, 1911					<i>Microlimonia</i>
<i>inustus</i> (Meigen, 1818)			+		
<i>Austrolimnophila</i> Alexander, 1920					<i>Archilimnophila, Polymoria</i>
<i>ochracea</i> (Meigen, 1804)			+		
<i>Cheilotrichia</i> Rossi, 1848					<i>Empeda, Platytoma</i>
<i>cinerascens</i> (Meigen, 1804)			x		
<i>Chionea</i> Dalman, 1816					<i>Sphaeconophilus</i>
<i>belgica</i> (Becker, 1912)			x	x	
<i>lutescens lut.</i> Lundström, 1907				x	
<i>Crypteria</i> Bergroth, 1913					
<i>limnophiloides</i> Bergroth, 1913			+		
<i>Dicranomyia</i> Stephens, 1829					<i>Glochina, Idiopyga, Melanolimonia, Ataracta, Furcomyia, Telecephala, Numantia, Erostrata</i>
<i>autumnalis</i> (Staeger, 1840)			+		
<i>chorea</i> (Meigen, 1818)		o	+		
<i>didyma</i> (Meigen, 1804)			x		
<i>frontalis</i> (Staeger, 1840)				x	
<i>fusca</i> (Meigen, 1804)			x		
<i>hyalinata</i> (Zetterstedt, 1851)			x		
<i>incisurata</i> Lackschewitz, 1928					Nachweis fraglich
<i>longipennis</i> (Schummel, 1829)			+		
<i>lucida</i> de Meijere, 1918				x	

<i>mitis</i> (Meigen, 1830)		+	x	
<i>modesta</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>morio</i> (Fabricius, 1787)			x	
<i>stigmatica</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>tristis</i> (Schummel, 1829)		+		
<i>ventralis</i> (Schummel, 1829)		+		
<b><i>Dicranoptycha</i></b> Osten-Sacken, 1860				<i>Marginomyia, Ulugbekia</i>
<i>cinerascens</i> (Meigen, 1818)			x	
<i>fuscescens</i> (Schummel, 1829)		+	x	
<i>livescens</i> Loew, 1871			x	x
<b><i>Ellipteroides</i></b> Becker, 1907				<i>Protogonomyia, Ptilostenodes, Progonomyia, Gonomyella</i>
<i>alboscuteclatus</i> (von Roser, 1840)		+		
<i>lateralis</i> (Meigen, 1835)		+		
<b><i>Eloeophila</i></b> Rondani, 1856				<i>Ephelia</i>
<i>apicata</i> (Loew, 1871)				x
<i>maculata</i> (Meigen, 1804)		+		
<i>miliaria</i> (Egger, 1863)		+		
<i>submarmorata</i> (Verrall, 1887)		+		
<i>verralli</i> (Bergroth, 1912)				x
<b><i>Epiphragma</i></b> Osten-Sacken, 1860				
<i>ocellare ocell.</i> (Linnaeus, 1761)		+		
<b><i>Erioconopa</i></b> Starý, 1976				
<i>trivialis</i> (Meigen, 1818)	o	+		
<b><i>Erioptera</i></b> Meigen, 1803				<i>Mesocyphona, Teleneura, Mesocyphona, Tasiocerodes, Limnoica, Limnoea, Ilisiophila, Chemalida, Octavia, Polyraphia, Polymeda</i>
<i>bivittata</i> (Loew, 1873)		+		
<i>divisa</i> (Walker, 1848)		+		
<i>flavata</i> (Westhoff, 1882)		+		
<i>fuscipennis</i> Meigen, 1818	o	x		
<i>griseipennis</i> Meigen, 1838				x
<i>lutea lutea</i> Meigen, 1804	o	+		
<i>minor distinguenda</i> Starý, 1983		+		
<i>sordida</i> Zetterstedt, 1838		+		
<i>squalida</i> Loew, 1871			x	?
<b><i>Euphylidorea</i></b> Alexander, 1972				
<i>aperta</i> (Verrall, 1887)				x
<i>dispar</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>lineola</i> (Meigen, 1804)	o	x		
<i>phaeostigma</i> (Schummel, 1829)		x	x	
<b><i>Eutonia</i></b> van der Wulp, 1874				<i>Gagamba</i>
<i>barbipes</i> (Meigen, 1804)	o	+		
<b><i>Gnophomyia</i></b> Osten-Sacken, 1860				
<i>viridipennis</i> (Gimmerthal, 1847)		+		
<b><i>Gonempeda</i></b> Alexander, 1924				
<i>flava</i> (Schummel, 1829)		+		
<b><i>Gonomyia</i></b> Meigen, 1818				<i>Prolipophleps, Taphrosia, Teuchogonomyia, Gonomyia, Lipophleps, Leiponeura, Ideocerodes</i>
<i>abbreviata</i> Loew, 1873		+		
<i>bifida</i> Tonnoir, 1920		x	x	
<i>lucidula</i> de Meijere, 1920		+		
<i>recta</i> Tonnoir, 1920		+		
<i>simplex</i> Tonnoir, 1920		+	x	
<i>tenella</i> (Meigen, 1818)	o	+		

<b><i>Helius</i></b> Le Peletier & Serville, 1828				<i>Megarhina, Leptorhina, Rhamphidia</i>
<i>flavus</i> (Walker, 1856)		+	x	
<i>longirostris long.</i> (Meigen, 1818)	o	+		
<i>pallirostris</i> Edwards, 1921		+		
<b><i>Hexatoma</i></b> Latreille, 1809				<i>Eriocera, Cladolipes, Caloptera, Allarithmia, Penthoptera, Glocericera, Trimacromera, Nematocera, Anisomera, Peronecera, Coreocelia</i>
<i>fuscipennis</i> (Curtis, 1836)		+		
<i>gaedii</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>nubeculosa</i> (Burmeister, 1829)		+		
<b><i>Idioptera</i></b> Macquart, 1834				
<i>linnei</i> Oosterbroek, 1992	o	+		
<i>pulchella</i> (Meigen, 1830)		+		
<b><i>Ilisia</i></b> Rondani, 1856				<i>Trichosticha</i>
<i>maculata</i> (Meigen, 1804)		+		
<b><i>Limnophila</i></b> Macquart, 1834				<i>Limnomyia, Poecilostola, Dicranophragma, Dendrolimnophila</i>
<i>pictipennis</i> (Meigen, 1818)	o	+		
<i>schranksi</i> Oosterbroek, 1992		+		
<b><i>Limonia</i></b> Meigen, 1803				<i>Amphinome, Limnobia, Unomyia, Limnomyza</i>
<i>albifrons</i> (Meigen, 1818)		x		
<i>flavipes</i> (Fabricius, 1787)		+		
<i>hercegovinae</i> (Strobl, 1898)			x	
<i>macrostigma</i> (Schummel, 1829)			x	
<i>nigropunctata</i> (Schummel, 1829)		+		
<i>nubeculosa</i> Meigen, 1804		x	x	
<i>phragmitidis</i> (Schrank, 1781)	o	+		
<i>stigma</i> (Meigen, 1818)	o	+		
<i>trivittata</i> (Schummel, 1829)		+		
<b><i>Lipsothrix</i></b> Loew, 1873				<i>Electrolabis</i>
<i>ecucullata</i> Edwards, 1938			x	
<i>remota</i> (Walker, 1848)		+		
<b><i>Metalimnobia</i></b> Matsumura, 1911				
<i>bifasciata bifasc.</i> (Schrank, 1781)		x		
<i>quadrinotata</i> (Linnaeus, 1761)		+	x	
<i>quadrinotata quadr.</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Molophilus</i></b> Curtis, 1833				<i>Promolophilus</i>
<i>appendiculatus</i> (Staeger, 1840)		+		
<i>ater</i> (Meigen, 1804)		+		
<i>bifidus</i> Goetghebuer, 1920			x	
<i>corniger</i> de Meijere, 1920			x	
<i>crassipygus</i> de Meijere, 1920			x	
<i>griseus</i> (Meigen, 1804)		+	x	
<i>medius</i> de Meijere, 1918			x	
<i>obscurus</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>ochraceus</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>propinquus propinq.</i> (Egger, 1863)		x		
<i>serpentiger</i> Edwards, 1938			x	
<b><i>Neolimnomyia</i></b> Séguy, 1937				<i>Brachylimnophila, Mixolimnomyia</i>
<i>batava</i> (Edwards, 1938)			x	
<i>filata</i> (Walker, 1856)			x	
<i>nemoralis</i> (Meigen, 1818)	o	+		
<b><i>Neolimonia</i></b> Alexander, 1964				
<i>dumetorum</i> (Meigen, 1804)		+		
<b><i>Ormosia</i></b> Rondani, 1856				<i>Ilisiomyia, Oreophila, Parormosia, Rhypholophus</i>

<i>depilata</i> Edwards, 1938			x	
<i>fascipennis</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>hederae</i> (Curtis, 1835)			x	
<i>lineata</i> (Meigen, 1804)		+		
<i>nodulosa</i> (Macquart, 1826)		+		
<b><i>Paradelphomyia</i> Alexander, 1936</b>				<i>Oxyrhiza, Haploneura, Adelphomyia</i>
<i>fuscula</i> (Loew, 1873)		+		
<i>senilis</i> (Haliday, 1833)		+		
<b><i>Phylidorea</i> Bigot, 1854</b>				<i>Macrolabina, Veruina, Paraphylidorea</i>
<i>abdominalis</i> (Staeger, 1840)		+		
<i>bicolor</i> (Meigen, 1804)		x		
<i>ferruginea</i> (Meigen, 1818)	o	x		
<i>fulvonervosa</i> (Schummel, 1829)		x		
<i>heterogyna</i> (Bergroth, 1913)		+		
<i>longicornis long.</i> (Schummel, 1829)		x		
<i>nervosa</i> (Schummel, 1829)		+		
<i>squalens squ.</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<b><i>Pilaria</i> Sintenis, 1889</b>				
<i>discicollis disc.</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>fuscipennis</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>meridiana</i> (Staeger, 1840)		+		
<i>scutellata</i> (Staeger, 1840)		+		
<b><i>Pseudolimmophila</i> Alexander, 1919</b>				
<i>lucorum</i> (Meigen, 1818)	o	+		
<i>sepium</i> (Verrall, 1886)		+		
<b><i>Rhipidia</i> Meigen, 1818</b>				<i>Eurhipidia</i>
<i>maculata</i> Meigen, 1818		+		
<b><i>Rhypholophus</i> Kolenati, 1860</b>				<i>Dasyptera</i>
<i>haemorrhoidalis</i> (Zett., 1838)		+		
<i>varius</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Scleroprocta</i> Edwards, 1938</b>				
<i>pentagonalis</i> (Loew, 1873)			x	
<b><i>Symplecta</i> Meigen, 1830</b>				<i>Psiloconopa, Helobia, Kowarzia, Trimicra, Podoneura, Hoploerioptera</i>
<i>hybrida</i> (Meigen, 1804)	o	+		
<i>stictica</i> (Meigen, 1818)		x		
<b><i>Tasiocera</i> Skuse, 1890</b>				<i>Dasymolophilus</i>
<i>murina</i> (Meigen, 1818)		x		
<b><i>Thaumastoptera</i> Mik, 1866</b>				
<i>calceata</i> Mik, 1866		+		
<b><i>Trimicra</i> Osten-Sacken, 1861</b>				
<i>pilipes</i> (Fabricius, 1787)		+	x	
<b>MYCETOPHILIDAE Pilzmücken [<i>Fungivoridae, Manotidae</i>]</b>				<b>BB: 59 / Dt.: 573 / Eur.: 942 / Ww: 4.000 Arten</b>
<b><i>Acnemia</i> Winnertz, 1863</b>				<i>Agaricobia</i>
<i>nitidicollis</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Allodia</i> Winnertz, 1863</b>				<i>Brachycampta, Parallodia</i>
<i>ornaticollis</i> (Meigen, 1818)	o			
<b><i>Allodiopsis</i> Tuomikoski, 1966</b>				<i>Myrosia, Notolopha, Anatella, Gymnogonia, Rhymosia</i>
<i>domestica</i> (Meigen, 1830)		+		
<b><i>Boletina</i> Staeger, 1840</b>				
<i>dubia</i> (Meigen, 1804)		+		
<i>nigricoxa</i> Staeger, 1840		+		
<i>sciarina</i> Staeger, 1840		+		



<i>trivittata</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Brevicornu</i> Marshall, 1896</b>				<i>Stigmatomeria</i>
<i>sericoma</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<b><i>Coelosia</i> Winnertz, 1863</b>				<i>Boletina</i>
<i>flava</i> (Staeger, 1840)		+		
<i>tenella</i> (Zetterstedt, 1852)		+		
<b><i>Cordyla</i> Meigen, 1803</b>				<i>Polyxena, Pachypalpus</i>
<i>brevicornis</i> (Staeger, 1840)		+		
<i>crassicornis</i> Meigen, 1818	o			
<i>fasciata</i> Meigen, 1830	x			Locus typicus: bei Berlin
<i>fusca</i> Meigen, 1804		x		
<i>nitens</i> Winnertz, 1863		+		
<b><i>Docosia</i> Winnertz, 1863</b>				
<i>gilvipes</i> (Walker, 1856)			x	
<i>nigra</i> Landrock, 1928		+		
<i>sciarina</i> (Meigen, 1830)		+		
<b><i>Dynatosoma</i> Winnertz, 1863</b>				
<i>cochleare</i> Strobl, 1895		+		
<i>fuscicorne</i> (Meigen, 1818)	o	+		
<i>thoracicum</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<b><i>Exechia</i> Winnertz, 1863</b>				<i>Parexechia</i>
<i>fusca</i> (Meigen, 1804)	o	+	x	
<i>repandoides</i> Caspers, 1984			x	
<i>separata</i> Lundström, 1912		+		
<i>seriata</i> (Meigen, 1830)	o			Locus typicus: bei Berlin
<i>spinuligera</i> Lundström, 1912			x	
<b><i>Exechiopsis</i> Tuomikoski, 1966</b>				<i>Xenexechia</i>
<i>intersecta</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>leptura</i> (Meigen, 1830)		+		
<b><i>Leia</i> Meigen, 1818</b>				<i>Lejomya, Lejosoma, Neoglaphyoptera, Leja</i>
<i>fascipennis</i> Meigen, 1818		+		
<b><i>Mycetophila</i> Meigen, 1803</b>				<i>Fungivora, Mycetina, Mycozetaea, Mycothera, Ophistoloba</i>
<i>biusta</i> Meigen, 1818	x			Locus typicus: bei Berlin
<i>distigma</i> Meigen, 1830	o			
<i>flavolineata</i> (Bukowski, 1934)		+		
<i>fungorum</i> (De Geer, 1776)		+	x	
<i>gratiosa</i> Winnertz, 1863	x			Locus typicus f. <i>M. maculipennis</i> Winn.: b. Berlin
<i>hamata</i> Winnertz, 1863	x			Locus typicus: ? bei Berlin
<i>luctuosa</i> Meigen, 1830			x	
<i>lunata</i> Meigen, 1804	o		x	
<i>marginata</i> Winnertz, 1863		+		
<i>ocellus</i> Walker, 1848			x	
<i>unipunctata</i> Meigen, 1818		+		
<i>zetterstedti</i> Lundström, 1906		+		
<b><i>Mycomya</i> Rondani, 1856</b>				<i>Calomycomya, Lycomya, Cymomya, Mycoma, Mycomyopsis, Cnephaeophila</i>
<i>marginata</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>punctata</i> (Meigen, 1804)	o	+		
<i>tenuis</i> (Walker, 1856)		+		
<b><i>Neoempheria</i> Osten-Sacken, 1878</b>				<i>Empheria, Mycomya</i>
<i>lineola</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>striata</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Phronia</i> Winnertz, 1863</b>				<i>Telmaphilus</i>

<i>austriaca</i> Winnertz, 1863		+		
<i>exigua</i> (Zetterstedt, 1852)		+		
<i>tenuis</i> Winnertz, 1863		+		
<i>triangularis</i> Winnertz, 1863		+		
<b><i>Phthinia</i> Winnertz, 1863</b>				
<i>winnertzi</i> Mik, 1869		+		
<b><i>Sciophila</i> Meigen, 1818</b>				<i>Lasioma</i>
<i>dziedzickii</i> Edwards, 1924			x	
<i>hirta</i> Meigen, 1818	o			
<i>lutea</i> Macquart, 1826		+	x	
<i>rufa</i> Meigen, 1830		+		
<b><i>Synplasta</i> Skuse, 1890</b>				
<i>gracilis</i> (Winnertz, 1863)	x	+		Locus typicus: ? bei Berlin
<b><i>Trichonta</i> Winnertz, 1863</b>				
<i>terminalis</i> (Walker, 1856)			x	
<b><i>Zygomia</i> Winnertz, 1863</b>				<i>Bolithomyza</i>
<i>humeralis</i> (Wiedemann, 1817)	x			Locus typicus für <i>M. pusilla</i> Meigen: bei Berlin
<b>PEDICIIDAE Sumpfmücken [ehem. zu Limoniidae]</b>				<b>BB: 9 / Dt.: 36 / Eur.: 63 / Ww: 2.000 Arten</b>
<b><i>Dicranota</i> Zetterstedt, 1838</b>				<i>Amalopina, Eudicranota, Paradicranota, Ludicia, Rhaphidolabis, Rhaphidolabina, Plectromyia, Dicranotella, Astrolabis</i>
<i>bimaculata</i> (Schummel, 1829)		+		
<i>pavida</i> (Haliday, 1833)		+		
<i>robusta</i> Lundström, 1912			x	
<i>subtilis</i> Loew, 1871		+		
<b><i>Pedicia</i> Latreille, 1809</b>				<i>Amalopis, Crunobia, Daimiotipula, Olecranopelma</i>
<i>rivosa rivosa</i> (Linnaeus, 1758)		+		
<i>straminea</i> (Meigen, 1838)		x		
<b><i>Tricyphona</i> Zetterstedt, 1837</b>				<i>Bophrosia, Trifurcaria, Tricyphona</i>
<i>immaculata</i> (Meigen, 1804)	o	+		
<b><i>Ula</i> Haliday, 1833</b>				<i>Macroptera</i>
<i>mollissima</i> Haliday, 1833		x		
<i>sylvatica</i> (Meigen, 1818)		x		
<b>PLECIIDAE Pleciiden</b>				<b>BB: 2 / Dt.: 2 / Eur.: 2 / Ww: 280 Arten</b>
<b><i>Penthetria</i> Meigen, 1803</b>				<i>Amasia, Eupeitenus, Crapitula, Pleciomyia</i>
<i>funnebris</i> Meigen, 1804	o	+		
<i>heteroptera</i> (Say, 1823)			x	
<b>PSYCHODIDAE Schmetterlingsmücken [Trichomyiidae, Nemopalpidae]</b>				<b>BB: 20 / Dt.: 143 / Eur.: 493 / Ww: 3.000 Arten</b>
<b><i>Clogmia</i> Enderlein, 1937</b>				
<i>albipunctata</i> (Willistom, 1893)		+	x	
<i>tristis</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<b><i>Clytocerus</i> Eaton, 1904</b>				
<i>ocellaris</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Pericoma</i> Walker, 1856</b>				<i>Pachypericoma, Botosaneanuiella</i>
<i>trifasciata</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Peripsychoda</i> Enderlein, 1935</b>				
<i>auriculata</i> (Curtis, 1839)		+		
<i>nigritarsis</i> Enderlein, 1937		+		Locus typicus: Berlin
<b><i>Philosepedon</i> Eaton, 1904</b>				
<i>humeralis</i> (Meigen, 1818)		+		
<b><i>Psychoda</i> Latreille, 1796</b>				
<i>albipennis</i> Zetterstedt, 1850		+	x	
<i>cinerea</i> Banks, 1894		+	x	
<i>parthenogenetica</i> Tonnoir, 1940			x	

<i>phalaenoides</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>trinodulosa</i> (Tonnoir, 1922)			x	
<b><i>Satchelliella</i></b> Vaillant, 1979				
<i>canescens</i> (Meigen, 1818)		+		
<i>nubila</i> (Meigen, 1818)	o	+		
<i>palustris</i> (Meigen, 1804)		+		
<i>trivialis</i> (Eaton, 1893)			x	
<b><i>Tinearia</i></b> Schellenberg, 1803				
<i>alternata</i> (Say, 1824)		+	x	
<b><i>Trichomyia</i></b> Haliday in Curtis, 1839				
<i>urbica</i> Haliday, 1839		+		
<b><i>Ulomyia</i></b> Walker, 1856				<i>Colopopteryx, Tinearia, Marsypia, Pericomina</i>
<i>fuliginosa</i> (Meigen, 1804)		+		
<i>undulata</i> (Tonnoir, 1919)		+		
<b>PTYCHOPTERIDAE Faltenmücken [<i>Liriopeidae</i>]</b>				<b>BB: 6 / Dt.: 8 / Eur.: 14 / Ww: 66 Arten</b>
<b><i>Ptychoptera</i></b> Meigen, 1803				<i>Liriope, Paraptychoptera</i>
<i>albimana</i> (Fabricius, 1787)		+		
<i>contaminata</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>lacustris</i> Meigen, 1830		+		
<i>minuta</i> Tonnoir, 1919		+		
<i>obscura</i> (Peus, 1958)			x	Locus typicus: Berlin
<i>paludosa</i> Meigen, 1804		+		
<b>SCATOPSIDAE Dungmücken</b>				<b>BB: 15 / Dt.: 47 / Eur.: 100 / Ww: 350 Arten</b>
<b><i>Anapausis</i></b> Enderlein, 1912				<i>Orthanapausis</i>
<i>inermis</i> (Ruthé, 1831)	o	+		Locus typicus: Berlin
<i>rectinervis</i> Duda, 1928	+	#		Locus typicus: bei Berlin
<b><i>Apiloscatopse</i></b> Cook, 1974				
<i>flavicollis</i> (Meigen, 1818)		+	+	
<i>picea</i> (Meigen, 1818)	x	+		Locus typicus: Berlin
<i>scutellata</i> (Loew, 1846)		+		
<b><i>Aspistes</i></b> Meigen, 1818				
<i>berolinensis</i> Meigen, 1818	+	+		Locus typicus: bei Berlin
<b><i>Coboldia</i></b> Melander, 1916				<i>Rhaeboza</i>
<i>fuscipes</i> (Meigen, 1830)		+	x	
<b><i>Colobostema</i></b> Enderlein, 1926				
<i>triste</i> (Zetterstedt, 1850)		#	x	Locus typicus für <i>C. oldenbergi</i> Enderlein: Berlin
<b><i>Ectaetia</i></b> Enderlein, 1912				
<i>clavipes</i> (Loew, 1846)		+	x	
<b><i>Ferneiella</i></b> Cook in Freeman, 1985				
<i>brevifurca</i> (Enderlein, 1912)		x		Locus typicus: in Brandenburg
<b><i>Reichertella</i></b> Enderlein, 1912				<i>Pharsoreichertella</i>
<i>nigra</i> (Meigen, 1804)		+	x	
<b><i>Scatopse</i></b> Geoffroy, 1762				<i>Ceria</i>
<i>notata</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<b><i>Swammerdamella</i></b> Enderlein, 1912				
<i>brevicornis</i> (Meigen, 1830)	o	+	+	
<b><i>Thripomorpha</i></b> Enderlein, 1905				<i>Aldrovandiella, Rhegmoclema</i>
<i>halteratum</i> (Meigen, 1838)		+		
<i>paludicola</i> Enderlein, 1905		+		Locus typicus: Berlin
<b>SCIARIDAE Trauermücken [<i>Lycoriidae</i>]</b>				<b>BB: 177 / Dt.: 342 / Eur.: 620 / Ww: 1.827 Arten</b>
<b><i>Bradysia</i></b> Winnertz, 1867				<i>Xenopygina, Neosciara, Fungivorides</i>
<i>albicola</i> (Winnertz, 1867)		+		
<i>amoena</i> (Winnertz, 1867)	o	+	+	
<i>angustipennis</i> (Winnertz, 1867)			x +	

<i>angustocularis</i> Mohrig & Kriv., 1989			x +	
<i>aprica</i> (Winnertz, 1867)			x +	
<i>bicolor</i> (Meigen, 1818)	o +	+		
<i>brevispina</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>brunnipes</i> (Meigen, 1804)			x	
<i>bulbostyla</i> Mohrig & Menzel, 1990			x +	
<i>cinerascens</i> (Grzegorzek, 1884)			x	
<i>confinis</i> (Winnertz, 1867)			x +	
<i>difformis</i> Frey, 1948			x	
<i>distincta</i> (Staeger, 1840)		+	x +	
<i>drakenbergensis</i> Hövemeyer, 1989			x +	
<i>excelsa</i> Menzel & Mohrig, 1998			x	
<i>fungicola</i> (Winnertz, 1867)			x +	
<i>giraudii</i> (Egger, 1862)		+	x	
<i>heydemanni</i> (Lengersdorf, 1955)			x +	
<i>inuitata</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>iridipennis</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>longicubitalis</i> (Lengersdorf, 1924)		+	x +	
<i>lutaria</i> (Winnertz, 1869)			x	
<i>meigeni</i> (Rübsaamen, 1894)			x +	Locus typicus für <i>B. flavohalterata</i> Mohrig & Menzel, 1990: in Brandenburg
<i>nitidicollis</i> (Meigen, 1818)	o	+	x	
<i>nocturna</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>ocellaris</i> (Comstock, 1882)			x	
<i>paupera</i> Tuomikoski, 1860			x	
<i>pauperata</i> (Winnertz, 1867)			+	
<i>pectoralis</i> (Staeger, 1840)		+	x +	Locus typicus für <i>B. castanea</i> Mohrig & Menzel, 1990: in Brandenburg
<i>placida</i> (Winnertz, 1867)			x +	
<i>polonica</i> (Lengersdorf, 1929)			x +	
<i>postrufescens</i> (Mohrig & Mnz., 1990)			x	
<i>praecox</i> (Meigen, 1818)			x +	
<i>pratincola</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>pseudodalmatina</i> Mohrig & Röschmann, 1993			x +	
<i>reflexa</i> Tuomikoski, 1960	+	+	x +	
<i>rufescens</i> (Zetterstedt, 1852)			+	
<i>scabricornis</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>strenua</i> (Winnertz, 1867)			x	
<i>subfungicola</i> Mohrig & Krv., 1989			x +	
<i>submoesta</i> Mohrig & Krivosh., 1989			x +	
<i>subrufescens</i> Mohrig & Kriv., 1989			x +	
<i>subscabricornis</i> Mohrig & Mz., 1990			x +	
<i>trivittata</i> (Staeger, 1840)			+	
<i>urticae</i> Mohrig & Menzel, 1992			x +	
<i>vagans</i> (Winnertz, 1868)			x	
<b><i>Bradysiopis</i> Tuomikoski, 1960</b>				
<i>vittata</i> (Meigen, 1830)			+	
<i>vittigera</i> (Zetterstedt, 1851)			x	
<b><i>Camptochaeta</i> Hippa &amp; Vilk., 1994</b>				
<i>camptochaeta</i> (Tuomikoski, 1960)			x	
<i>uniformis</i> (Mohrig & Menzel, 1990)			x +	
<i>vivax</i> (Frey, 1948)			x +	
<b><i>Corynoptera</i> Winnertz, 1867</b>				<i>Psilosciara, Geosciara, Sciarobezzia</i>
<i>abblanda</i> Freeman, 1983			x +	

<i>bicuspidata</i> (Lengersdorf, 1926)			x +	
<i>bistrispina</i> (Bukowski & Lgd., 1936)			x +	
<i>blanda</i> (Winnertz, 1867)			x +	
<i>boletiphaga</i> (Lengersdorf, 1940)			x +	
<i>cavipes</i> Mohrig, 1993			x +	
<i>clausa</i> Tuomikoski, 1960			x	
<i>compressa</i> (Walker, 1848)			x +	
<i>cuniculata</i> (Lengersdorf, 1942)			x +	
<i>dentata</i> (Bukowski & Lgdrf., 1936)			x +	
<i>dentiforceps</i> (Bukowski & Lg., 1936)			x	
<i>fera</i> Mohrig & Heller, 1992			x +	
<i>flavicauda</i> (Zetterstedt, 1855)		+	x +	
<i>forcipata</i> (Winnertz, 1867)			x +	
<i>fritzi</i> Mohrig & Rulik, 2001			x	
<i>furcata</i> (Hippra & Vilkamaa, 1994)			x +	
<i>furcifera</i> Mohrig & Mamaev, 1987			x +	
<i>globiformis</i> (Frey, 1945)			x +	
<i>heteroclausu</i> Rudzinski, 1991			x +	
<i>hypopygialis</i> (Lengersdorf, 1926)		+	x	
<i>inundata</i> Fritz, 1982			x +	
<i>irmgardis</i> (Lengersdorf, 1930)			x +	
<i>membranigera</i> (Kieffer, 1903)			x +	
<i>minima</i> (Meigen, 1918)			x +	
<i>nigrohalteralis</i> (Frey, 1948)			x +	
<i>obscuripila</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>perochaeta</i> (Mohrig & Menzel, 1990)			x +	
<i>perpusilla</i> Winnertz, 1867			+	
<i>postglobiformis</i> Mohrig, 1993			x +	
<i>praeforcipata</i> Mohrig & Mm., 1987			x +	
<i>saccata</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>saetistyla</i> Mohrig & Krivososh., 1985			x +	
<i>sedula</i> Mohrig & Krivosheina, 1985			x +	
<i>sphenoptera</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>spinifera</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>subdentata</i> Mohrig, 1985			x +	
<i>subparvula</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>subtilis</i> (Lengersdorf, 1929)			x +	
<i>tetrachaeta</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>trepida</i> (Winnertz, 1867)			x +	
<i>tridentata</i> Hondru, 1968			x +	
<i>verrucifera</i> (Lengersdorf, 1952)			x +	
<i>waltraudis</i> Mohrig & Mamaev, 1987			x +	
<i>winnertzi</i> Mohrig, 1993			x +	
<b><i>Cratyna</i> Winnertz, 1867</b>				<i>Diversicratyna, Peyerimhoffia, Spathobdella, Plastosciara, Termitosciara, Decembrina</i>
<i>ambigua</i> (Lengersdorf, 1934)			x +	
<i>colei</i> (Freeman, 1990)			x +	
<i>contracta</i> Mohrig & Röschrn., 1996			x +	
<i>falcifera</i> (Lengersdorf, 1933)			x +	
<i>nobilis</i> (Winnertz, 1867)			x	
<i>pernitida</i> (Edwards, 1915)		+	x	
<i>perplexa</i> (Winnertz, 1867)		+	+	
<i>uliginosa</i> (Lengersdorf, 1929)			x +	
<i>vagabunda</i> (Winnertz, 1867)			x +	

<b><i>Ctenosciara</i></b> Tuomikoski, 1960				
<i>hyalipennis</i> (Meigen, 1804)		+	x +	
<i>lutea</i> (Meigen, 1804)	+	+	x +	
<b><i>Epidapus</i></b> Haliday, 1851				<i>Pseudoaptanogyna, Atomaria, Aptanogyna, Vimmeria</i>
<i>absconditus</i> (Vimmer, 1926)			x +	
<i>atomarius</i> (De Geer, 1778)		+	x +	
<i>debilis</i> Menzel, 2003			x +	Locus typicus: in Brandenburg
<i>detriticola</i> (Kratochvil, 1936)			x +	
<i>gracilis</i> (Walker, 1848)			x +	
<i>gnotus</i> (Lengersdorf, 1942)			x +	
<i>microthorax</i> (Börner, 1903)			x	
<i>schillei</i> (Börner, 1903)			x +	
<b><i>Leptosciarella</i></b> Tuomikoski, 1960				<i>Hirtipennia</i>
<i>brevipalpa</i> (Mohrig & Menzel, 1992)			x	
<i>cerifera</i> Mohrig & Menzel, 1997			x +	
<i>fuscipalpa</i> (Mohrig & Mamaev, 1879)			x	
<i>hirtipennis</i> (Zetterstedt, 1838)			x	
<i>pilosa</i> (Staeger, 1840)			x	
<i>rejecta</i> (Winnertz, 1967)			x	
<i>scutellata</i> (Staeger, 1840)		+	x	
<i>subpilosa</i> (Edwards, 1925)			x +	
<i>trochanterata</i> (Zetterstedt, 1851)			x	
<i>viatica</i> (Winnertz, 1867)			x	
<b><i>Lycoriella</i></b> Frey, 1942				<i>Hemineurina, Bradysiopsis, Coelostylina</i>
<i>castanescens</i> (Lengersdorf, 1940)		+	+	
<i>cellaris</i> (Lengersdorf, 1934)			x +	
<i>conspicua</i> (Winnertz, 1867)			x	
<i>inconspicua</i> Tuomikoski, 1960			+	
<i>inflata</i> (Winnertz, 1867)			x	
<i>ingenua</i> (Dufour, 1839)	#	+	x +	locus typicus für <i>S. solani</i> Winnertz: Berlin
<i>lundstromi</i> (Frey, 1948)			x +	
<i>mali</i> (Fitch, 1856)			+	
<i>micria</i> Mohrig & Menzel, 1990			x #	Locus typicus: in Brandenburg
<i>modesta</i> (Staeger, 1840)			x +	
<i>subterranea</i> (Märkel, 1844)	o			Nachweis zweifelhaft
<i>thuringiensis</i> Menzel & Mohrig, 1991			x +	
<b><i>Phytosciara</i></b> Frey, 1942				<i>Dolichosciara, Prosciara</i>
<i>flavipes</i> (Meigen, 1804)			x	
<i>halterata</i> (Lengersdorf, 1926)		+	x	
<i>ornata</i> (Winnertz, 1867)			x	
<i>porrecta</i> (Lengersdorf, 1929)			x	
<i>producta</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<i>ungulata</i> (Winnertz, 1867)			x +	
<b><i>Pseudolycoriella</i></b> Menzel & Mr., 1998				
<i>brunnea</i> (Bukowski & Lgsd., 1936)			x +	
<i>subbruckii</i> Mohrig & Hövem., 1992)			x	
<b><i>Scatopsciara</i></b> Edwards, 1927				<i>Xenopyrginia, Diorychophthalma, Uddamania</i>
<i>atomaria</i> (Zetterstedt, 1851)			+	
<i>buccina</i> Mohrig & Mamaev, 1985			x	
<i>calamophila</i> Frey, 1948			+	
<i>curvilinea</i> (Lengersdorf, 1934)			x	
<i>dicuspidata</i> Mohrig & Antnv., 1978			x	
<i>edwardsi</i> Freeman, 1983			x +	

<i>fluviatiliformis</i> Mohrig & M., 1987			x +	
<i>fluviatilis</i> (Lengersdorf, 1940)			x +	
<i>fritzi</i> Mohrig & Menzel, 1992			x	
<i>multispina</i> (Bukowski & Lg., 1936)			+	
<i>nacta</i> (Johannsen, 1912)			x +	
<i>neglecta</i> Menzel & Mohrig, 1998			x +	Locus typicus: in Brandenburg
<i>tricuspidata</i> (Winnertz, 1867)		+	+	
<i>vitripennis</i> (Meigen, 1818)	o		x	
<b><i>Schwenckfeldina</i> Frey, 1942</b>				
<i>carbonaria</i> (Meigen, 1830)		+	x	
<b><i>Sciara</i> Meigen, 1803</b>				<i>Lycoria, Molobrus</i>
<i>hemerobioides</i> (Scopoli, 1763)		+	x	
<i>humeralis</i> Zetterstedt, 1851		+	x	
<i>ulrichi</i> Menzel & Mohrig, 1998			x	
<b><i>Scythropochroa</i> Enderlein, 1911</b>				<i>Sciaraneura</i>
<i>quercicola</i> (Winnertz, 1869)			x +	
<i>radialis</i> Lengersdorf, 1926			x +	
<b><i>Trichosia</i> Winnertz, 1867</b>				<i>Baeosciara, Mouffetina, Leptosciarella</i>
<i>acrotricha</i> Tuomikoski, 1960			x	
<i>confusa</i> Menzel & Mohrig, 1997			x	
<i>glabra</i> (Meigen, 1830)			x	
<i>morio</i> (Fabricius, 1794)	+		x	
<i>pulchricornis</i> (Edwards, 1925)			x	
<i>splendens</i> Winnertz. 1867		+	x	
<b><i>Xylosciara</i> Tuomikoski, 1957</b>				<i>Protoxylosciara, Trixylosciara</i>
<i>betulae</i> Tuomikoski, 1960		+	x	
<i>heptacantha</i> Tuomikoski, 1957			x +	
<i>lignicola</i> (Winnertz, 1867)			x +	
<i>microdon</i> (Frey, 1948)			x +	
<i>misella</i> (Frey, 1948)			x +	
<i>spectabilis</i> Rudzinski, 1992			x +	
<i>steleocera</i> Tuomikoski, 1960			x +	
<b>SIMULIIDAE Kriebelmücken [<i>Melusinidae</i>]</b>				<b>BB: 24 / Dt.: 50 / Eur.: 231 / Ww: 1.500 Arten</b>
<b><i>Simulium</i> Latreille, 1802</b>				<i>Boophthora, Byssodon, Hellichiella, Simulia, Nevermannia, Obuchovia, Wilhelmia, Cnetha, Hellichia, Odagmia, Discosphyria, Archae-, Argenti- und Stratiosimulium</i> als Subgen.
<i>angustipes</i> Edwards, 1915		+	x	
<i>angustitarse</i> (Lundström, 1911)		+	x	
<i>argyreatum</i> Meigen, 1838		+	+	
<i>aureum</i> Fries, 1824			x	
<i>colombaschense</i> (Fabricius, 1787)	o			Bestimmung sicher falsch. Bisher fehlt Nachweis in BB
<i>costatum</i> Friederichs, 1920		+	x	Locus typicus für <i>C. incornutum</i> Enderlein: in Brandenburg
<i>cryophilum</i> (Rubzov, 1959)			x	
<i>erythrocephalum</i> (DeGeer, 1776)		+	x	
<i>equinum</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	Locus typicus für <i>W. annulitibia</i> Enderlein: Berlin
<i>intermedium</i> Roubaud, 1906		+	x	
<i>lineatum</i> (Meigen, 1804)	o	+	x	Locus typicus für <i>W. falcata</i> Enderlein: Berlin
<i>lundstromi</i> (Enderlein, 1921)		+	x	
<i>maculatum</i> (Meigen, 1804)	o	+		??
<i>morsitans</i> Edwards, 1915		+	x	
<i>nigrum</i> (Meigen, 1804)		x	x	Loca typica f. <i>S. matthiesseni</i> End., <i>S. peetsi</i> End. u. <i>M. opalinipennis</i> Enderlein: in Brdgb.

<i>noelleri</i> Friederichs, 1920		+	x	Locus typicus f. <i>S. tenuimanus</i> Enderlein: b. Bln.
<i>ornatum</i> Meigen, 1818	o	+	x	
<i>paramorsitans</i> Rubzov, 1956		x		
<i>posticatum</i> Meigen, 1838		x		
<i>reptans</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>rostratum</i> (Lundström, 1911)			x	
<i>trifasciatum</i> Curtis, 1839		+		
<i>variegatum</i> Meigen, 1818	o	+		
<i>vernum</i> Macquart, 1826			x	
<b>THAUMALEIDAE Dunkelmücken</b>				<b>BB: 1 / Dt.: 15 / Eur.: 76 / Ww: 300 Arten</b>
<i>Thaumalea</i> Ruthé, 1831				<i>Androprosopa, Orphnephila, Ochnephila, Thaumalia, Chenesia</i>
<i>testacea</i> Ruthé, 1831	o	+		Locus typicus: in Brandenburg
<b>TIPULIDAE Schnaken</b>				<b>BB: 75 / Dt.: 123 / Eur.: 456 / Ww: 4.000 Arten</b>
<i>Ctenophora</i> Meigen, 1803				<i>Flabellifera, Cnemoncosis, Xiphuromorpha</i>
<i>elegans</i> Meigen, 1818		+	x	
<i>festiva</i> Meigen, 1804	o	+		
<i>flaveolata</i> (Fabricius, 1794)		x		
<i>ornata</i> Meigen, 1818		+	+	
<i>pectinicornis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>Dictenidia</i> Brullé, 1833				<i>Ceroctena, Dicera</i>
<i>bimaculata</i> (Linnaeus, 1761)	o	x		
<i>Dolichopeza</i> Curtis, 1825				<i>Oropeza, Nesopeza, Sinoropeza</i>
<i>albipes</i> (Ström, 1768)		+		
<i>Nephrotoma</i> Meigen, 1803				<i>Pales, Pachyrhina</i>
<i>aculeata</i> (Loew, 1871)		x	x	
<i>analís</i> (Schummel, 1838)		+		
<i>appendiculata</i> (Pierre, 1919)	o	x		
<i>cornicina</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>crocata</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>dorsalis</i> (Fabricius, 1782)	o	+		
<i>flavescens</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>guestfalica</i> (Westhoff, 1879)		+		
<i>lunulicornis</i> (Schummel, 1833)		+		
<i>pratensis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>quadrifaria</i> (Meigen, 1804)		+		
<i>quadristriata</i> (Schummel, 1833)		+		
<i>scalaris</i> (Meigen, 1818)	o	+		Locus typicus: bei Berlin
<i>scurra</i> (Meigen, 1818)	o	x		
<i>submaculosa</i> Edwards, 1928		+		
<i>Nigrotipula</i> Hutson & Vane-Wright, 1969				<i>Anomaloptera</i>
<i>nigra</i> (Linnaeus, 1758)		+		
<i>Prionocera</i> Loew, 1844				<i>Stygeropis</i>
<i>dimidiata</i> (Loew, 1866)	o		+	Locus typicus f. <i>P. absentiva</i> Mannh.: Berlin
<i>subserricornis</i> (Zetterstedt, 1851)		+		
<i>turcica</i> (Fabricius, 1787)	o	+		
<i>Tanyptera</i> Latreille, 1804				<i>Xiphura, Mesodictenidia</i>
<i>atrata</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>Tipula</i> Linnaeus, 1758				<i>Dendrotipula, Emodotipula, Lindneria, Lunatipula, Odonascia, Pterelachisus, Platytipula, Savtshenka, Schummelia, Vestiplex</i>
<i>affinis</i> Schummel, 1833		+		
<i>caesia</i> Schummel, 1833		+		
<i>cava</i> Riedel, 1913		+		
<i>coerulescens</i> Lackschewitz, 1923		+		



<i>falcata</i> Riedel, 1913		+		
<i>fascipennis</i> Meigen, 1818	o	+		
<i>flavolineata</i> Meigen, 1804		x		
<i>fulvipennis</i> De Geer, 1776		+		
<i>griseus</i> Zetterstedt, 1851		+		
<i>helvola</i> Loew, 1873		+		
<i>hortorum</i> Linnaeus, 1758		+		
<i>irrorata</i> Macquart, 1826		+		
<i>laetabilis</i> Zetterstedt, 1838		+		
<i>lateralis</i> Meigen, 1804		+		
<i>livida</i> van der Wulp, 1858		+		
<i>luna</i> Westhoff, 1879		x		
<i>lunata</i> Linnaeus, 1758	o	+		
<i>luteipennis</i> Meigen, 1830		+		
<i>marginella</i> Theowald, 1980	o	+		
<i>maxima</i> Poda, 1761		+		
<i>melleae</i> Schummel, 1833		+		
<i>montium</i> Egger, 1863		+		
<i>nodicornis</i> Meigen, 1818	+	+		Locus typicus für <i>T. juncea</i> Meigen: Berlin
<i>nubeculosa</i> Meigen, 1804	o	+		
<i>obsoleta</i> Meigen, 1818		+		
<i>oleracea</i> Linnaeus, 1758	o	+		
<i>pabulina</i> Meigen, 1818		+		
<i>pagana</i> Meigen, 1818		+		
<i>paludosa</i> Meigen, 1830	o	+		
<i>pelio stigma</i> Schummel, 1833		x		
<i>pierrei</i> Tonnoir, 1921		+		
<i>pruinosa</i> Wiedemann, 1817	o	+		
<i>pseudovariipennis</i> Czizek, 1912	o	+		
<i>pustulata</i> Pierre, 1920		+		
<i>scripta</i> Meigen, 1830		+		
<i>selene</i> Meigen, 1830	o	+		
<i>signata</i> Staeger, 1840		+		
<i>staegeri</i> Nielsen, 1922		+		
<i>stigmatella</i> Schummel, 1833		+		
<i>subcunctans</i> Alexander, 1921		+		
<i>submarmorata</i> Schummel, 1833		+		
<i>subnodicornis</i> Zetterstedt, 1838		+		
<i>truncorum</i> Meigen, 1830		+		
<i>unca</i> Wiedemann, 1817		+		
<i>variicornis</i> Schummel, 1833		+		
<i>varipennis</i> Meigen, 1818	o	+		
<i>vernalis</i> Meigen, 1804		+		
<i>vittata</i> Meigen, 1804		+		
<b>TRICHO CERIDAE Wintermücken [<i>Petauristidae</i>]</b>				<b>BB: 11 / Dt.: 18 / Eur.: 50 / Ww: 116 Arten</b>
<i>Diazosma</i> Bergroth, 1913				<i>Diazosma, Trichoptera</i>
<i>hirtipenne</i> (Siebke, 1863)		+		
<i>Trichocera</i> Meigen, 1803				<i>Metatrachocera, Petaurista, Melusina, Atractocera, Palaeopetaurista</i>
<i>annulata</i> Meigen, 1818		x		
<i>hiemalis</i> (De Geer, 1776)	o	+		
<i>implicata</i> Dahl, 1976			x	
<i>japonica</i> Matsumara, 1915			x	
<i>maculipennis</i> Meigen, 1818		x		

<i>major</i> Edwards, 1921			x	
<i>regelationis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>rufescens</i> Edwards, 1921		+		
<i>saltator</i> (Harris, 1776)			x	