

Liste der in Berlin und Brandenburg nachgewiesenen Dipteren

erstellt auf der Basis der Sammlungsbestände des Museums für Naturkunde Berlin und der in der Fachliteratur publizierten Daten

von Hubert Schumann

Fliegen

FAMILIE / <i>Gattung</i> / Art / Autor	- 1900	1901- 1949	1950 -	Anmerkungen/Synonyma / Subgenera
ACARTOPHTALMIDAE Acartophtalminen				BB: 2 / Dt.: 2 / Eur.: 3 / Ww: 5 Arten
<i>Acartophthalmus</i> Czerny, 1902				<i>Anthophilina</i>
<i>bicolor</i> Oldenberg, 1910		x		Locus typicus: bei Berlin
<i>nigrinus</i> (Zetterstedt, 1848)		+		
ACROCERIDAE Spinnen-, Kugelfliegen [Cyrtidae, Ogodidae]				BB: 6 / Dt.: 11 / Eur.: 34 / Ww: 520 Arten
<i>Acrocera</i> Meigen, 1803				<i>Paracrocera, Acrocerina</i>
<i>orbicula</i> (Fabricius, 1787)	x	+		
<i>Ogcodes</i> Latreille, 1796				<i>Oncodes, Henops</i>
<i>fumatus</i> (Erichson, 1846)		+	x	
<i>gibbosus</i> (Linnaeus, 1758)		+		
<i>reginae</i> (Trojan, 1956)			x	
<i>varius</i> Latreille in Olivier, 1812	x	+		
<i>zonatus</i> Erichson, 1840	x	+		
AGROMYZIDAE Minierfliegen				BB: 222 / Dt.: 522 / Eur.: 906 / Ww: 2.750 Arten
<i>Agromyza</i> Fallén, 1810				<i>Domomyza, Mesonerva, Stomacrypolus</i>
<i>abiens</i> Zetterstedt, 1848	o		+	
<i>albitarsis</i> Meigen, 1830		+		
<i>alnibetulae</i> Hendel, 1931		+		
<i>alnivora</i> Spencer, 1969		+		
<i>ambigua</i> Fallén, 1823		+		
<i>anthracina</i> Meigen, 1830	o	+		
<i>bicophaga</i> Hering, 1925		+		Locus typicus: bei Berlin
<i>bromi</i> Spencer, 1966			x	Locus typicus: Berlin
<i>cinerascens</i> Macquart, 1835		+		
<i>demeijerei</i> Hendel, 1920		+		
<i>felleri</i> Hering, 1941		x		Locus typicus: in Brandenburg
<i>ferruginosa</i> van der Wulp, 1871		+	x	
<i>flaviceps</i> Fallén, 1823		+		
<i>frontella</i> (Rondani, 1875)		+		
<i>igniceps</i> Hendel, 1920		+		Locus typicus: f. <i>A. humuli</i> Hering, 1930: b. Berlin
<i>intermittens</i> (Becker, 1907)		+	x	
<i>johannae</i> de Meijere, 1924		+		
<i>lathyri</i> Hendel, 1923		+		Locus typicus: Berlin
<i>lucida</i> Hendel, 1920		+		
<i>mobilis</i> Meigen, 1830	o			Nachweis fraglich
<i>myosotidis</i> Kaltenbach, 1864		+		
<i>nana</i> Meigen, 1830	o	+		
<i>nigripes</i> Meigen, 1830	o	+		
<i>nigrociliata</i> Hendel, 1931		+	+	
<i>orobi</i> Hendel, 1920		+		
<i>phragmitidis</i> Hendel, 1922		+		
<i>potentillae</i> (Kaltenbach, 1864)		+	+	

<i>reptans</i> Fallén, 1823	o	+		
<i>rondensis</i> Strobl, 1900		+	+	Locus typicus: für <i>A. veris</i> Hering, 1951: Berlin
<i>rufipes</i> Meigen, 1830		+		
<i>salicina</i> Hendel, 1922		+		Locus typicus: bei Berlin
<i>spiraeoidearum</i> Hering, 1954			x	
<i>vicifoliae</i> Hering, 1932		+		Locus typicus: bei Berlin
<i>Amauromyza</i> Hendel, 1931				<i>Catalpomyza, Cephalomyza</i>
<i>chenopodivora</i> Spencer, 1971			x	Locus typicus: Berlin
<i>flavifrons</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>gyrans</i> (Fallen, 1823)	o			Nachweis zweifelhaft
<i>lamii</i> (Kaltenbach, 1858)		+	+	
<i>leonuri</i> Spencer, 1971			x	Locus typicus: Berlin
<i>morionella</i> (Zetterstedt, 1848)		+		
<i>verbasci</i> (Bouché, 1847)		+		
<i>Aulagromyza</i> Enderlein, 1936				<i>Phytagromyza, Pseudphytomyza, Rubiomyza</i>
<i>discrepans</i> (van der Wulp, 1871)		+		
<i>orphana</i> (Hendel, 1920)		+		
<i>populi</i> (Kaltenbach, 1864)		+		
<i>populicola</i> (Walker, 1853)		x		
<i>similis</i> (Brischke, 1880)		+		
<i>sisymbrii</i> (Hering, 1962)			x	Locus typicus: Berlin
<i>tremulae</i> (Hering, 1957)			+	Locus typicus: Berlin
<i>tridentata</i> (Loew, 1858)		+		
<i>trivittata</i> (Loew, 1873)		x		
<i>Calycomyza</i> Hendel, 1931				
<i>artemisiae</i> (Kaltenbach, 1856)		+	x	
<i>humeralis</i> (von Roser, 1840)		+		
<i>Cerodontha</i> Rondani, 1861				<i>Cerodonta, Butomomyza, Dizygomyza, Icteromyza, Poemyza, Xenophytomyza</i>
<i>affinis</i> (Fallén, 1823)		+		
<i>angulata</i> (Loew, 1869)		+		
<i>atra</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>bimaculata</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>biseta</i> (Hendel, 1920)		+		Locus typicus: für <i>C. uniformis</i> Hering: Berlin
<i>capitata</i> (Zetterstedt, 1848)	o			Nachweis fraglich
<i>caricicola</i> (Hering, 1926)		+		Locus typicus: Berlin
<i>chaixiana</i> (Hering, 1956)			x	
<i>crassiseta</i> (Strobl, 1900)		+		
<i>denticornis</i> (Panzer, 1806)	o	+	x	Locus typicus: für <i>A. nigratarsis</i> Meigen: Berlin
<i>fasciata</i> (Strobl, 1880)		+		
<i>fulvipes</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>imbuta</i> (Meigen, 1830)	o			Nachweis fraglich
<i>incisa</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>ireos</i> (Robineau-Desv., 1851)		+		
<i>lateralis</i> (Macquart, 1835)	o		x	
<i>luctuosa</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>luzulae</i> (Groschke, 1957)		+	+	
<i>morosa</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>muscina</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>pygmaea</i> (Meigen, 1830)		+	+	
<i>Chromatomyia</i> Hardy, 1849				
<i>aprilina</i> (Goureau, 1851)		+	x	
<i>farfarella</i> (Hendel, 1935)		+		
<i>fuscula</i> (Zetterstedt, 1838)		+		

<i>horticola</i> (Goureau, 1851)	o	+	+	
<i>lonicerae</i> (Rob.-Desv., 1851)		+	+	
<i>luzulae</i> (Hering, 1924)		+		Locus typicus: Berlin
<i>milii</i> (Kaltenbach, 1864)		+		
<i>nigra</i> (Meigen, 1830)	o	+	x	
<i>periclymeni</i> (Hendel, 1922)		+		
<i>primulae</i> (Robin.-Desv., 1851)		+		
<i>ramosa</i> (Hendel, 1923)		+		Locus typicus: für <i>P. olgae</i> Hering: bei Berlin
<i>succisae</i> (Hering, 1922)		+		Locus typicus: bei Berlin
<i>syngenesiae</i> Hardy, 1849		+		
<i>Gymnophytomyza</i> Hendel, 1936				
<i>heteroneura</i> (Hendel, 1920)		+		
<i>Hexomyza</i> Enderlein, 1936				
<i>cecidogena</i> (Hering, 1927)		+		Locus typicus: Berlin
<i>Liriomyza</i> Mik, 1894				<i>Agrophila, Antineura, Haplomyza, Triticomyza, Praspedomyza</i>
<i>amoena</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>approximata</i> (Hendel, 1920)		+		
<i>artemiscicola</i> de Meijere 1924		+	x	Locus typicus: f. <i>L. brunneicornis</i> Hering: Berlin
<i>bryoniae</i> (Kaltenbach, 1858)		+	+	
<i>centaureae</i> Hering, 1927		x		
<i>cicerina</i> (Rondani, 1875)		x		
<i>congesta</i> (Becker, 1903)		+		
<i>demeijerei</i> Hering, 1930		+		Locus typicus: bei Berlin
<i>dracunculi</i> Hering, 1932		x		
<i>eupatoriana</i> Spencer, 1954			x	
<i>eupatorii</i> (Kaltenbach, 1873)		+	x	
<i>flaveola</i> (Fallén, 1823)	o	+		
<i>graminivora</i> Hering, 1949		+		Locus typicus: Berlin
<i>limpida</i> Hering, 1933		x		Locus typicus: Berlin
<i>lutea</i> (Meigen, 1830)	o	+		Nachweis fraglich
<i>occipitalis</i> Hendel, 1931		x	x	Locus typicus: für <i>L. bruscae</i> Hering: Berlin
<i>oldenbergi</i> Hering, 1933		+		Locus typicus: bei Berlin
<i>pascuum</i> (Meigen, 1838)		+		
<i>pereziae</i> Hering, 1963			x	Locus typicus: Berlin
<i>phryne</i> Hendel, 1931			x	
<i>pisivora</i> Hering, 1954		+		Locus typicus: Berlin
<i>pseudopygmina</i> (Hering, 1933)		+	x	Locus typicus Berlin
<i>ptarmicae</i> de Meijere, 1925		x		Locus typicus: f. <i>L. millefolii</i> Hering: Brdbg.
<i>puella</i> (Meigen, 1830)	o			Nachweis fraglich
<i>pusilla</i> (Meigen, 1830)	o	+	+	
<i>pusio</i> (Meigen, 1830)	o	+	x	
<i>sonchi</i> Hendel, 1931		+		
<i>soror</i> Hendel, 1931		+	+	
<i>strigata</i> (Meigen, 1830)	o	+	+	
<i>tanacetii</i> de Meijere, 1924		+		
<i>taraxaci</i> Hering, 1927		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>thalictri</i> Hering, 1932		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>urophorina</i> Mik, 1894			+	
<i>valerianae</i> Hendel, 1932		+		
<i>virgo</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>Melanagromyza</i> Hendel, 1920				<i>Limnoagromyza</i>
<i>aenea</i> (Meigen, 1830)		x		
<i>aeneoventris</i> (Fallén, 1823)	o	+		

<i>cunctans</i> (Meigen, 1830)		x		
<i>lappae</i> (Loew, 1850)		x		
<i>pubescens</i> Hendel, 1923		+		
<i>Metopomyza</i> Enderlein, 1936				
<i>flavonotata</i> (Haliday, 1833)		+		
<i>interfrontalis</i> (Melander, 1913)		+		
<i>scutellata</i> (Fallén, 1823)	o			Nachweis fraglich
<i>xanthaspis</i> (Loew, 1858)		+		
<i>Napomyza</i> Westwood, 1840				<i>Dinerva, Dineura</i>
<i>annulipes</i> (Meigen, 1830)	o			Nachweis fraglich
<i>elegans</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>lateralis</i> (Fallén, 1823)	o	+		
<i>Nemorimyza</i> Frey, 1946				<i>Annimyzella</i>
<i>posticata</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>Ophiomyia</i> Braznikov, 1897				<i>Tylomyza, Siridomyza, Siphonomyza, Stirops, Stiropomyza, Solenomyza, Aulomyza, Triopisopa</i>
<i>alliariae</i> Hering, 1954			x	Locus typicus: Berlin
<i>submaura</i> Hering, 1926			x	Locus typicus: in Brandenburg
<i>cunctata</i> (Hendel, 1920)		+		
<i>curvipalpis</i> (Zetterstedt, 1848)		+		
<i>heringi</i> Starý, 1930		+		
<i>labiatarum</i> Hering, 1937		+		
<i>maura</i> (Meigen, 1838)		+		
<i>nasuta</i> (Melander, 1913)		+		
<i>orbiculata</i> (Hendel, 1931)		+		Locus typicus: f. <i>M. nostradamus</i> Hering: b. Berlin
<i>pulicaria</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>Phytobia</i> Liroy, 1864				<i>Dendromyzina, Liomyzina, Shizukoa</i>
<i>errans</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>Phytoliriomyza</i> Hendel, 1931				<i>Xyraeomyia, Pteridomyza, Lemurimyza, Nesomyza</i>
<i>arctica</i> (Lundbeck, 1901)			x	
<i>hilarella</i> (Zetterstedt, 1848)		+		
<i>melampyga</i> (Loew, 1869)		+		
<i>ornata</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>pteridii</i> Spencer, 1973		+		
<i>variegata</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>Phytomyza</i> Fallén, 1810				<i>Phythomyza</i>
<i>abdominalis</i> Zetterstedt, 1848		+	+	
<i>achilleae</i> Hering, 1932		x		Locus typicus: Berlin
<i>aconiti</i> Hendel, 1920		+		
<i>aconitophila</i> Hendel, 1927		+	+	Locus typicus: für <i>P. aconiti</i> Hendel: Berlin
<i>actaeae</i> Hendel, 1922		+		
<i>adjuncta</i> Hering, 1928		+		
<i>affinis</i> Fallén, 1823	o	+		
<i>agromyzina</i> Meigen, 1830		+		
<i>albiceps</i> Meigen, 1830	o	+	+	
<i>albimargo</i> Hering, 1925		x	+	Locus typicus: Berlin
<i>albipennis</i> Fallén, 1823		+		
<i>anemones</i> Hering, 1925		+		Locus typicus: bei Berlin
<i>angelicae</i> Kaltenbach, 1862		+	+	
<i>angelicaevora</i> Hering, 1924		+		Locus typicus: bei Berlin
<i>aquilegiae</i> Hardy, 1849		+		
<i>artemisivora</i> Spencer, 1971			x	
<i>astrantiae</i> Hendel, 1924		+		
<i>aurei</i> Hering, 1931		x		

<i>calthae</i> Hering, 1924		x		
<i>chaerophylli</i> Kaltenbach, 1856		+	+	Locus typicus: Berlin für <i>P. aromatici</i> Hering; in Brandenburg für <i>P. daucivora</i> Hering
<i>cicutae</i> Hendel, 1922		+	+	Locus typicus: Berlin
<i>cirsii</i> Hendel, 1923		+		
<i>conii</i> Hering, 1931			x	
<i>continua</i> Hendel, 1920		+		
<i>conyzae</i> Hendel, 1920		+		
<i>crassiseta</i> Zetterstedt, 1860	o	+	x	
<i>cytisi</i> Brischke, 1880		+	+	
<i>enigmoides</i> Hering, 1937		+		Loc. typicus: f. <i>P. enigma</i> Hering (praeocc.): Bln.
<i>erigerophila</i> Hering, 1927		+		Locus typicus: Berlin
<i>exilis</i> Hering, 1936		+		Locus typicus: bei Berlin
<i>fallaciosa</i> Brischke, 1880		+		Locus typicus: für <i>P. auricomi</i> Hering und <i>P. mimica</i> Hering: bei Berlin
<i>flavicornis</i> Fallén, 1823		+		
<i>flavofemorata</i> Strobl, 1893		+		
<i>gymnostoma</i> (Loew, 1858)		+		Locus typicus: für <i>A. phytomyzina</i> Hering: Berlin
<i>hellebori</i> Kaltenbach, 1872			+	
<i>hendeli</i> Hering, 1923		+		Locus typicus: bei Berlin
<i>heracleana</i> Hering, 1937		x	+	
<i>heringiana</i> Hendel, 1922		+		
<i>ilicis</i> Curtis, 1846		+		
<i>lappae</i> Goureau, 1851		+		
<i>leucanthemi</i> Hering, 1935		+		Locus typicus: Berlin
<i>lycopi</i> Nowakowski, 1959			x	
<i>marginella</i> Fallén, 1823		+	+	Locus typicus: für <i>P. mulgedii</i> Hering: Berlin
<i>medicaginis</i> Hering, 1925		+	+	
<i>minuscula</i> Goureau, 1851			+	
<i>mylini</i> Hering, 1954			+	Locus typicus: Berlin
<i>nepetae</i> Hendel, 1922		+	x	Locus typicus: in Brandenburg
<i>nigricoxa</i> Hendel, 1935		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>nigrifemur</i> Hering, 1934		x		
<i>nigripennis</i> Fallén, 1823	o	+		
<i>notata</i> Meigen, 1830	o			Nachweis fraglich
<i>obscura</i> Hendel, 1920		+		
<i>obscurella</i> Fallén, 1823	o	+		
<i>origani</i> Hering, 1931		+		
<i>pastinacae</i> Hendel, 1923		+		
<i>pauliloewi</i> Hendel, 1920		+		
<i>permutata</i> Hering, 1962			x	Locus typicus: Berlin
<i>petoei</i> Hering, 1924		+		
<i>pimpinellae</i> Hendel, 1924		+		
<i>plantaginis</i> Rob.-Desv., 1851		+	+	
<i>podagrariae</i> Hering, 1954			+	Locus typicus: Berlin
<i>ptarmicae</i> Hering, 1937			x	
<i>pubicornis</i> Hendel, 1920		+	+	
<i>pullula</i> Zetterstedt, 1848		+	x	
<i>pulsatillae</i> Hering, 1924		+		
<i>ranunculi</i> (Schrank, 1803)		+		
<i>rhabdophora</i> Griffiths, 1964			x	Locus typicus: in Brandenburg
<i>robustella</i> Hendel, 1936		+		
<i>rostrata</i> Hering, 1934		+		
<i>rufescens</i> von Roser, 1840		+		

<i>rufipes</i> Meigen, 1830		o	+	x	Locus typicus für <i>P. sulphuripes</i> Meigen: Berlin
<i>scotina</i> Hendel, 1920			+		
<i>socia</i> Brischke, 1880			+		
<i>solidaginis</i> Hendel, 1920			+		
<i>spondylii</i> Robineau-Desv., 1851			+		
<i>tanaceti</i> Hendel, 1923			+		
<i>tenella</i> Meigen, 1830		o	+		
<i>tetrasticha</i> Hendel, 1927			+		
<i>thalitricola</i> Hendel, 1925			+		Locus typicus: Berlin
<i>thyselini</i> Hendel, 1923			+		
<i>thyselinivora</i> Hering, 1924			x		Locus typicus: in Brandenburg
<i>veronicicola</i> Hering, 1925			+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>virgaureae</i> Hering, 1926			+		
<i>vitalbae</i> Kaltenbach, 1872			+		
<i>Pseudonapomyza</i> Hendel, 1920					
<i>atra</i> (Meigen, 1830)			+	x	
<i>Ptochomyza</i> Hering, 1942					
<i>asparagi</i> Hering, 1942			+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>Selachops</i> Wahlberg, 1844					<i>Enocoelocera</i>
<i>flavocinctus</i> Wahlberg, 1844			+		
ANTHOMYIIDAE Blumenfliegen					BB: 141 / Dt.: 227 / Eur.: 508 / Ww: 1.000 Arten
<i>Adia</i> Robineau-Desvoidy, 1830					<i>Nerina, Scategle</i>
<i>cinerella</i> (Fallén, 1825)		o	+	x	
<i>Alliopsis</i> Schnabl & Dziedzicki, 1911					<i>Prosalpia, Pseudochirosia, Prosalpiella</i>
<i>billbergi</i> (Zetterstedt, 1838)			+		
<i>dentiventris</i> (Ringdahl, 1918)			x		
<i>Anthomyia</i> Meigen, 1803					<i>Anthomyza, Cerochetus, Craspedochoeta, Cheilisia, Eriostyla, Ceratochaetus, Melinia</i>
<i>imbrida</i> Rondani, 1866			x		
<i>laturata</i> (Robineau-Desv., 1830)		o	+		
<i>monilis</i> (Meigen, 1826)		o	+		
<i>plurinotata</i> Brullé, 1832			x	x	
<i>pluvialis</i> (Linnaeus, 1758)		o	+	+	
<i>Botanophila</i> Lioy, 1864					<i>Egeria, Pegohylemyia, Thrixina, Collinomyia, Buccaria, Pseudomyopina, Atrichomyia</i>
<i>brunneilinea</i> (Zetterstedt, 1845)			+		
<i>dissecta</i> (Meigen, 1826)		o	+		
<i>flavisquama</i> (Stein, 1906)			+		
<i>fugax</i> (Meigen, 1826)		o	+		
<i>gnava</i> (Meigen, 1826)			+	x	
<i>latifrons</i> (Zetterstedt, 1845)			x		
<i>phrenione</i> Séguy, 1937)			x		
<i>silvatica</i> (Robineau-Desv., 1830)			+	x	
<i>sonchi</i> (Hardy, 1872)			+		
<i>striolata</i> (Fallén, 1824)			+		
<i>verticella</i> (Zetterstedt, 1838)			+		
<i>Calythea</i> Schnabl & Dziedzicki, 1911					<i>Anthomyiella</i>
<i>nigricans</i> (Robineau-Desv., 1830)		o	+		
<i>pratincola</i> (Panzer, 1809)		o	+		
<i>Chiastocheta</i> Pokorný, 1889					
<i>trollii</i> (Zetterstedt, 1845)			+	+	
<i>Chirosia</i> Rondani, 1856					<i>Pachystoma, Rhadinia, Pycnoglossa, Pogonomyza, Acrostilpna</i>
<i>albifrons</i> Tiensuu, 1938			x		
<i>albitarsis</i> (Zetterstedt, 1845)			+		

<i>cinerosa</i> (Zetterstedt, 1845)		x	+	
<i>crassiseta</i> Stein, 1908		x		
<i>flavipennis</i> (Fallén, 1823)		+		
<i>grossicauda</i> Strobl, 1899		x		
<i>histicina</i> (Rondani, 1866)		+		
<i>latipennis</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>Delia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Cimbotoma, Erioschia, Gastrolepta, Crinura, Trionostoma, Leptohylemyia, Flavena</i>
<i>albula</i> (Fallén, 1825)	o		x	
<i>antiqua</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>brunnescens</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>cardui</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>carduiformis</i> (Schnabl, 1911)		x +		
<i>coarctata</i> (Fallén, 1825)	o	+		
<i>criniventris</i> (Zetterstedt, 1860)		+		
<i>echinata</i> (Seguy, 1923)		+	x	
<i>floralis</i> (Fallén, 1824)	o	+		
<i>floricola</i> Robineau-Desv., 1830		+		
<i>florilega</i> (Zetterstedt, 1845)		+	+	
<i>frontella</i> (Zetterstedt, 1838)		x +	x	
<i>lamelliseta</i> (Stein, 1900)		+		
<i>lavata</i> (Boheman, 1864)		+		
<i>linearis</i> (Stein, 1898)		+		
<i>lineariventris</i> (Zetterstedt, 1845)		x		
<i>nuda</i> (Strobl, 1901)		+		
<i>pallipennis</i> (Zetterstedt, 1838)		+	x	
<i>platura</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>radicum</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>uniseriata</i> (Stein, 1914)		x +		Nachbestimmung notwendig
<i>Egle</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Xenophorbia</i>
<i>minuta</i> (Meigen, 1826)		x		
<i>parva</i> (Robineau-Desv., 1830)		+		
<i>rhinotmeta</i> (Pandellé, 1900)		x		
<i>Emmesomyia</i> Malloch, 1919				
<i>grisea</i> (Robineau-Desv., 1830)		x		
<i>socia</i> (Fallén, 1825)		+		
<i>Eustalomyia</i> Kowarz, 1873				<i>Dendrophila</i>
<i>festiva</i> (Zetterstedt, 1845)		x		
<i>hilaris</i> (Fallén, 1823)	o		+	
<i>histrion</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>vittipes</i> (Zetterstedt, 1845)		x		
<i>Eutrichota</i> Kowarz, 1893				<i>Arctopegomyia, Pegomyza, Eremomyia, Hervebazinia</i>
<i>inornata</i> (Loew, 1873)		+	x	
<i>longimana</i> (Pokorny, 1887)		x	x	
<i>praeptens</i> (Wiedemann, 1817)	o	+	x	
<i>Heterostylodes</i> Hennig, 1967				<i>Heterostylus</i>
<i>nominabilis</i> (Collin, 1947)		x		
<i>pratensis</i> (Meigen, 1826)	o	x		
<i>Hydrophoria</i> Robin.-Desv., 1830				
<i>lancifer</i> (Harris, 1780)	o	+	x	<i>Pegoplata virginea</i> (Meigen, 1826)
<i>linogrisea</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>ruralis</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>Hylemya</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Hylemyia, Musciosoma</i>

<i>latifrons</i> Schnabl & Dziedz., 1911		+		
<i>nigrimana</i> (Meigen, 1826)		+	x	
<i>vagans</i> (Panzer, 1798)	o	+	x	
<i>variata</i> (Fallén, 1823)		+	x	
<i>Hylemyza</i> Schnabl & Dziedz., 1911				
<i>partita</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>Lasiomma</i> Stein, 1916				<i>Crinurina, Monotrixia</i>
<i>anthomyinum</i> (Rondani, 1866)		x		
<i>octoguttatum</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>strigilatum</i> (Zetterstedt, 1835)		+		
<i>Leucophora</i> Rob.-Desvoidy, 1830				<i>Nevrorta, Ocromyia, Hammomyia, Hylephila</i>
<i>cinerea</i> Robineau-Desv., 1830	o	+		
<i>obtusa</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>personata</i> (Collin, 1922)		+		
<i>sericea</i> Robineau-Desv., 1830	o	x		
<i>sociata</i> (Meigen, 1826)	o	x		
<i>sponsa</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>unistriata</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>Mycophaga</i> Rondani, 1856				<i>Comostyla</i>
<i>testacea</i> (Gimmerthal, 1834)	o	+	x	
<i>Myopina</i> Robineau-Desv., 1830				
<i>myopina</i> (Fallén, 1824)	o	+		
<i>Paradelia</i> Ringdahl, 1933				<i>Pseudonupedia, Pegomyiella</i>
<i>brunneonigra</i> (Schnabl, 1911)		+		
<i>ignotaeformis</i> (Schnabl, 1911)		x		
<i>intersecta</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>lunatifrons</i> (Zetterstedt, 1846)		x		Locus typicus: für <i>P. minima</i> Stein: Berlin
<i>Parapegomyia</i> Griffiths, 1984				
<i>schineri</i> (Schnabl, 1911)		x		
<i>Paregle</i> Schnabl, 1911				<i>Chionomyia, Chinomyia</i>
<i>audacula</i> (Harris, 1780)	o			Nachweis fraglich
<i>pilipes</i> (Stein, 1916)		+		
<i>vetula</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>Pegomya</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Pegomyia, Chlorina, Phoraea, Phyllis, Zabia</i>
<i>bicolor</i> Hoffmannsegg, 1817 in Wiedemann	o	+	x	
<i>caesia</i> Stein, 1906		x	x	
<i>calyptrata</i> (Zetterstedt, 1846)		+	x	Locus typicus für <i>P. iniqua</i> Stein: Berlin
<i>conformis</i> (Fallén, 1825)	o	+		
<i>deprimata</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>exilis</i> (Meigen, 1826)	o			Nachweis fraglich
<i>flavifrons</i> (Walker, 1849)		+	x	
<i>fulgens</i> (Meigen, 1826)	o			Nachweis fraglich
<i>geniculata</i> (Bouché, 1834)		+		Locus typicus: Berlin
<i>haemorrhoum</i> (Zetterstedt, 1838)	o	+	x	
<i>holostea</i> (Hering, 1924)		+	x	Locus typicus: bei Berlin
<i>hyoscyami</i> (Panzer, 1909)		+	x	
<i>interruptella</i> (Zetterstedt, 1855)		+		
<i>laticornis</i> (Fallén, 1825)		+		
<i>meridiana</i> (Villeneuve, 1923)		+		Locus typicus für <i>Ch. nigrifrons</i> Karl: in Brdbg.
<i>nigrisquama</i> (Stein, 1888)		+		
<i>pulchripes</i> (Loew, 1857)		+		
<i>rubivora</i> (Coquillett, 1897 in Slingerland)		x		
<i>rufina</i> (Fallén, 1825)		+	x	Locus typicus: Berlin für <i>P. squamifera</i> Stein
<i>seitenstettensis</i> (Strobl, 1880)		+		

<i>setaria</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>silacea</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>solennis</i> (Meigen, 1826)		+	x	Locus typicus: für <i>A. rumicis</i> Bouché: Berlin
<i>steini</i> (Hendel, 1925)		x		
<i>tabida</i> (Meigen, 1826)		x		
<i>transversa</i> (Fallén, 1825)		x		
<i>versicolor</i> (Meigen, 1826)	o	x		
<i>vittigera</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>winthemi</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>zonata</i> (Zetterstedt, 1838)				
<i>Pegoplata</i> Schnabl & Dziedzicki, 1911				<i>Gymnogaster, Nupedia, Psiloplastinx, Nudaria</i>
<i>aestiva</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>debilis</i> (Stein, 1916)		+		
<i>palposa</i> (Stein, 1897)		x		
<i>virginea</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>Phorbia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Chortophila</i>
<i>atrogrisea</i> Tiensuu, 1936		x		
<i>curvicauda</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>fumigata</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>genitalis</i> (Schnabl, 1911)		+		
<i>longipalpis</i> (Pandellé, 1900)		x	x	
<i>moliniaris</i> (Karl, 1917)		+		
<i>nuceicornis</i> (Pandellé, 1900)		+		
<i>penicillaris</i> (Stein, 1916)		+	x	
<i>sepia</i> (Meigen, 1926)	o	+	x	
<i>unipila</i> (Karl, 1917)		+		
<i>Subhylemyia</i> Ringdahl, 1933				
<i>longula</i> (Fallén, 1824)		+	x	
<i>Zaphne</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Acroptena</i>
<i>ambigua</i> (Fallén, 1823)		+		
<i>caudata</i> (Zetterstedt, 1855)		+		
<i>divisa</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>wierzejskii</i> (Mik, 1867)		+	x	
ANTHOMYZIDAE Anthomyziden				BB: 7 / Dt.: 14 / Eur.: 28 / Ww: 53 Arten
<i>Anagnota</i> Becker, 1902				
<i>bicolor</i> (Meigen, 1838)		x		
<i>Anthomyza</i> Fallén, 1810				<i>Leptomyza, Anthophilina, Pentotaenia</i>
<i>albimana</i> (Meigen, 1830)	o			Bestimmung fraglich
<i>gracilis</i> Fallén, 1823	o	+	x	
<i>pallida</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>pleuralis</i> Czerny, 1928		x		Locus typicus: Berlin
<i>Paranthomyza</i> Czerny, 1902				<i>Anthophilina</i>
<i>nitida</i> (Meigen, 1838)			x	
<i>Stiphrosoma</i> Czerny, 1928				<i>Ptenotaenia</i>
<i>sabulosum</i> (Haliday, 1837)	o	x	+	Locus typicus für <i>S. oldenbergi</i> Czerny: Berlin
ASILIDAE Raubfliegen [<i>Leptogastridae</i>]				BB: 51 / Dt.: 81 / Eur.: 524 / Ww: 6.440 Arten
<i>Andrenosoma</i> Rondani, 1856				<i>Elaeotoma</i>
<i>atra</i> (Linnaeus, 1758)	x	+	x	
<i>Anemochtherus</i> Lehr, 1996				
<i>flavicornis</i> (Ruthé, 1831)	x			Locus typicus: In Brandenbg.
<i>Antipalus</i> Loew, 1849				
<i>varipes</i> (Meigen, 1820)	x	+	x	Loci typici v. <i>A. aurifluus</i> u. <i>A. tenax</i> in Brdgb.
<i>Asilus</i> Linnaeus, 1758				
<i>crabroniformis</i> Linnaeus, 1758	x	+	x	

<i>Choerades</i> Walker, 1851				
<i>dioctriaeformis</i> (Meigen, 1820)		x		
<i>femorata</i> (Meigen, 1804)		+	x	
<i>fimbriata</i> (Meigen, 1820)			x	
<i>gilva</i> (Linnaeus, 1758)	x	+	x	
<i>ignea</i> (Meigen, 1820)	x	+	x	
<i>marginata</i> (Linnaeus, 1758)		+	+	
<i>Dasyopogon</i> Meigen, 1803				<i>Cheilopogon, Seilopogon, Selidopogon</i>
<i>diadema</i> (Fabricius, 1781)	x	+	x	
<i>Dioctria</i> Meigen, 1803				<i>Methylla, Nanmodioctria</i>
<i>atricapilla</i> Meigen, 1804	x	+	+	
<i>cothurnata</i> Meigen, 1820	x	+	x	
<i>flavipennis</i> Meigen, 1820		+		
<i>hyalipennis</i> (Fabricius, 1794)		+	+	
<i>lateralis</i> Meigen, 1804		+	x	
<i>linearis</i> (Fabricius, 1787)	x	+	x	
<i>oelandica</i> (Linnaeus, 1758)	x	+	x	
<i>rufipes</i> (De Geer, 1776)	x	+	+	
<i>Dysmachus</i> Loew, 1860				
<i>trigonus</i> (Meigen, 1804)	x	+	x	Locus typicus von <i>D. hispidus</i> : in Brandenburg
<i>Echthistus</i> Loew, 1849				
<i>rufinervis</i> (Meigen, 1820)	x	+	x	
<i>Erax</i> Scopoli, 1763				<i>Protophanes</i>
<i>barbatus</i> Scopoli, 1763		+		
<i>Eutolmus</i> Loew, 1848				
<i>rufibarbis</i> (Meigen, 1820)	x	+	x	
<i>Holopogon</i> Loew, 1847				<i>Ceraturgus, Pseudoholopogon</i>
<i>fumipennis</i> (Meigen, 1820)		+		
<i>priscus</i> (Meigen, 1820)			x	
<i>Laphria</i> Meigen, 1803				<i>Lapria</i>
<i>ephippium</i> (Fabricius, 1781)	+	+		
<i>flava</i> (Linnaeus, 1761)	x	+	+	
<i>gibbosa</i> (Linnaeus, 1758)	x	+	x	
<i>Lasiopogon</i> Loew, 1847				<i>Daulopogon</i>
<i>cinctus</i> (Fabricius, 1781)	x	+	+	
<i>Leptarthrus</i> Stephens, 1829				<i>Isopogon</i>
<i>brevirostris</i> (Meigen, 1804)	x	+		
<i>Leptogaster</i> Meigen, 1803				<i>Gonipes</i>
<i>cylindrica</i> (De Geer, 1776)	x	+	x	
<i>guttiventris</i> Zetterstedt, 1842		+	x	
<i>subtilis</i> Loew, 1847			+	
<i>Machimus</i> Loew, 1849				<i>Allomachimus</i>
<i>arthriticus</i> (Zeller, 1840)	x	+	x	
<i>chrysitis</i> (Meigen, 1820)		+	x	
<i>cyanopus</i> (Loew, 1849)		+		
<i>gonatistes</i> (Zeller, 1840)	x	+	x	
<i>rusticus</i> (Meigen, 1820)	x	+	x	
<i>Neopitriptus</i> Lehr, 1992				
<i>setosulus</i> (Zeller, 1840)	x	+	x	Locus typicus: in Brandenburg
<i>Neoitamus</i> Osten-Sacken, 1878				<i>Itamus</i>
<i>cothurnatus</i> (Meigen, 1820)	x	+	+	
<i>cyanurus</i> (Loew, 1849)		+	+	
<i>socius</i> (Loew, 1871)		+	x	
<i>Neomochtherus</i> Osten-Sck., 1878				<i>Paritamus, Mochtherus</i>

<i>geniculatus</i> (Meigen, 1820)		+	x	
<i>pallipes</i> (Meigen, 1820)	x	+	x	
<i>Pamponerus</i> Loew, 1849				
<i>germanicus</i> (Linnaeus, 1758)	x	+	+	
<i>Philonicus</i> Loew, 1849				<i>Philonotus</i>
<i>albiceps</i> (Meigen, 1820)	x	+	+	
<i>Rhadiurgus</i> Loew, 1849				
<i>variabilis</i> (Zetterstedt, 1838)	x	+	x	
<i>Tolmerus</i> Loew, 1849				<i>Epitriptus</i>
<i>atricapillus</i> (Fallén, 1814)	x	+	+	
<i>cingulatus</i> (Fabricius, 1781)	x	+	+	
<i>pyragra</i> (Zeller, 1840)	x	+	x	
<i>strandii</i> (Duda, 1940)		+	x	
ASTEIIDAE Feinfliegen [Astiidae]				BB: 4 / Dt.: 7 / Eur.: 18 / Ww: 130 Arten
<i>Asteia</i> Meigen, 1830				<i>Astia, Plocastia, Subanarista, Eisentrautius</i>
<i>amoena</i> Meigen, 1830	o	+		Locus typicus: Berlin
<i>concinna</i> Meigen, 1830	o	+		
<i>elegantula</i> Zetterstedt, 1847		+		
<i>Leiomyza</i> Macquart, 1835				<i>Liomyza</i>
<i>laevigata</i> (Meigen, 1830)		x	+	
ATELESTIDAE Zwergtanzfliegen [ehem. zu Empididae]				BB: 1 / Dt.: 3 / Eur.: 3 / Ww: 8 Arten
<i>Atelestus</i> Walker, 1837				<i>Platycnema</i>
<i>pulicarius</i> (Fallén, 1816)		+		
ATHERICIDAE Ibisfliegen [ehem. zu Rhagionidae]				BB: 2 / Dt.: 5 / Eur.: 10 / Ww: 85 Arten
<i>Atherix</i> Meigen, 1803				<i>Ibisa</i>
<i>ibis</i> (Fabricius, 1798)		+		
<i>Ibisia</i> Rondani, 1856				
<i>marginata</i> (Fabricius, 1781)	x	+		
AULACIGASTRIDAE Aulacigastriden				BB: 1 / Dt.: 1 / Eur.: 1 / Ww: 12 Arten
<i>Aulacigaster</i> Macquart, 1835				<i>Apotomella, Ampycophora, Aulacogaster</i>
<i>leucopeza</i> (Meigen, 1830)		+		
BOMBYLIIDAE Woll- Trauerschweber [Systropodidae, Usiidae]				BB: 27 / Dt.: 40 / Eur.: 335 / Ww: 4.000 Arten
<i>Anastoechus</i> Osten-Sacken, 1877				
<i>nitidulus</i> (Fabricius, 1794)	+			
<i>Bombylius</i> Linnaeus, 1758				
<i>ater</i> Scopoli, 1763	o x	+		
<i>canescens</i> Mikan, 1796		+		
<i>discolor</i> Mikan, 1796		+		
<i>major</i> Linnaeus, 1758		+	+	
<i>medius</i> Linnaeus, 1758	o x			
<i>undatus</i> Mikan, 1796		+		
<i>venosus</i> Mikan, 1796		+		
<i>vulpinus</i> Wied. in Meigen, 1820		+		
<i>Conophorus</i> Meigen, 1803				<i>Ploas, Codionus</i>
<i>virescens</i> (Fabricius, 1787)		+		
<i>Exhyalanthrax</i> Becker, 1916				<i>Oriellus</i>
<i>ofer</i> (Fabricius, 1794)	o			
<i>Exoprosopa</i> Macquart, 1840				<i>Argyrospyla, Trinaria, Defilippia, Exoptata</i>
<i>capucina</i> (Fabricius, 1781)		+		
<i>Hemipenthes</i> Loew, 1869				
<i>maurus</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>morio</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>Lomatia</i> Meigen, 1822				<i>Stygia</i>
<i>lateralis</i> (Meigen, 1820)	o	+		

<i>Phthiria</i> Meigen, 1803				<i>Cyclorhynchius, Phtyria</i>
<i>canescens</i> Loew, 1846		+		
<i>pulicaria</i> (Mikan, 1796)	o	+		
<i>Systoechus</i> Loew, 1855				
<i>ctenopterus</i> (Mikan, 1796)	+	+		
<i>Thyridanthrax</i> Osten-Sack., 1886				
<i>fenestratus</i> (Fallén, 1814)	o	+		
<i>Villa</i> Liroy, 1864				<i>Anthrax</i>
<i>cingulata</i> (Meigen, 1804)	o +	+		
<i>hottentotta</i> (Linnaeus, 1758)		+	+	
<i>humilis</i> (Ruthe, 1831)	o +	+		Locus typicus: Berlin
<i>modesta</i> (Meigen, 1820)		+		Locus typicus: Berlin
<i>occulta</i> (Wied. in Meigen, 1820)		+		Locus typicus: Berlin
<i>paniscus</i> (Rossi, 1790)		+		
BRAULIDAE Bienenläuse				BB: 1 / Dt.: 1 / Eur.: 3 / Ww: 7 Arten
<i>Braula</i> Nitzsch, 1818				<i>Entombia, Melittomyia</i>
<i>coeca</i> Nitzsch, 1818	o	+	x	
CALLIPHORIDAE Schmeißfliegen				BB: 43 / Dt.: 62 / Eur.: 114 / Ww: 1.100 Arten
<i>Angioneura</i> Br. & Bergenst., 1893				<i>Angioneurilla</i>
<i>acerba</i> (Meigen, 1838)		+		Locus typicus für <i>A. vetusta</i> (Zett.): Brandenbg.
<i>cyrtoneurina</i> (Zetterstedt, 1859)		+	+	Locus typicus f. <i>A. enigmatica</i> Villeneuve: Bln.
<i>fimbriata</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>Bellardia</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Miaspia, Maravigna, Ambodicria</i>
<i>bayeri</i> (Jacentkovský, 1937)			x	
<i>obsoleta</i> (Meigen, 1824)		x		
<i>pandia</i> (Walker, 1849)		+	+	
<i>polita</i> (Mik, 1884)		+	x	
<i>stricta</i> (Villeneuve, 1926)		+	x	
<i>vespillo</i> (Fabricius, 1794)		+		
<i>viarum</i> (Robineau-Desv., 1830)		+	x	
<i>vulgaris</i> (Robineau-Desv., 1830)	o	+	x	
<i>Calliphora</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Abonesia, Acrophaga, Stobbeola</i>
<i>uralensis</i> Villeneuve, 1922		+	+	
<i>vicina</i> Robineau-Desvoidy, 1830	o	+	+	
<i>vomitoria</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>Cynomya</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Cynophaga, Cynomyopsis</i>
<i>mortuorum</i> (Linnaeus, 1761)	o	+	+	
<i>Eggisops</i> Rondani, 1862				<i>Engyzops</i>
<i>pecchiolii</i> Rondani, 1862				Nachweis fraglich
<i>Eurychaeta</i> Br. & Bergenst., 1891				<i>Theria, Helicibosca</i>
<i>muscaria</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>palpalis</i> (Robineau-Desv., 1830)		+		
<i>Lucilia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Bufolucilia, Phaenicia, Acrophagella, Chaetophaenicia, Caesariceps, Francilia</i>
<i>ampullacea</i> Villeneuve, 1922		+	+	
<i>bufonivora</i> Moniez, 1876		+	x	
<i>caesar</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>illustris</i> (Meigen, 1826)	o	+	+	
<i>regalis</i> (Meigen, 1826)		+	+	
<i>richardsi</i> Collin, 1926		+	x	
<i>sericata</i> (Meigen, 1826)	o	+	+	
<i>silvarum</i> (Meigen, 1826)		+	+	
<i>Melanomya</i> Rondani, 1856				<i>Melanomyia</i>
<i>nana</i> (Meigen, 1826)		+	x	

Melinda Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Xerophilophaga</i>
<i>gentilis</i> (Robineau-Desv., 1830)	o	+	+	
<i>viridicyanea</i> (Rob.-Desv., 1830)		+	+	
Morinia Robineau-Desvoidy, 1820				<i>Anthracomyia, Calobatemyia, Disticheria</i>
<i>melanoptera</i> (Fallén, 1817)		+		
Onesia Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Macrophallus, Onesioides</i>
<i>floralis</i> Robineau-Desv., 1830	o	+	+	
Phormia Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>regina</i> (Meigen, 1826)	o	+		
Pollenia Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Nitellia, Bureschiella</i>
<i>amentaria</i> (Scopoli, 1763)	o	+	+	
<i>angustigena</i> Wainwright, 1940		+	+	
<i>atramentaria</i> (Meigen, 1826)		+	+	
<i>griseotomentosa</i> (Jacentk., 1944)		+		
<i>labialis</i> Robineau-Desv., 1863		+	+	
<i>mayeri</i> Jacentkovský, 1941			+	
<i>pediculata</i> Macquart, 1834	o	+	+	
<i>rudis</i> (Fabricius, 1794)	o	+	+	
<i>vagabunda</i> (Meigen, 1826)			+	
Protocalliphora Hough, 1899				<i>Avihospita, Orneocalliphora</i>
<i>azurea</i> (Fallén, 1817)	o	+	+	
<i>peusi</i> Gregor & Povolný, 1959		+		
Protophormia Townsend, 1908				
<i>terraenovae</i> (Rob.-Desv., 1830)		+	+	
CAMILLIDAE Camilliden				BB: 1 / Dt.: 4 / Eur.: 8 / Ww: 65 Arten
Camilla Haliday, 1838				<i>Ambacis, Noterophila, Noteromya, Ambacis</i>
<i>glabra</i> (Fallén, 1823)	o	+		
CAMPICHOETIDAE Campichoetiden [ehem. zu Diastatidae]				BB: 2 / Dt.: 3 / Eur.: 7 / Ww: 10 Arten
Campichoeta Macquart, 1835				
<i>obscuripennis</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>punctum</i> (Meigen, 1830)	o	+		
CANACIDAE Canaciden				BB: 0 / Dt.: 2 / Eur.: 4 / Ww: 10 Arten
CARNIDAE Gefiederfliegen				BB: 7 / Dt.: 11 / Eur.: 39 / Ww: 75 Arten
Meoneura Rondani, 1856				<i>Anisonevra, Agrobria, Psalidotus</i>
<i>flavifacies</i> Collin, 1930		x		
<i>lamellata</i> Collin, 1930		x		
<i>neglecta</i> Collin, 1930		x		
<i>neottiophila</i> Collin, 1930		x		
<i>obscurella</i> (Fallén, 1823)		x		
<i>triangularis</i> Collin, 1930		x		
<i>vagans</i> (Fallén, 1823)		x		
CHAMAEMYIIDAE Blattlausfliegen [<i>Ochthiphilidae</i>]				BB: 14 / Dt.: 29 / Eur.: 107 / Ww: 160 Arten
Acrometopia Schiner, 1862				
<i>wahlbergi</i> (Zetterstedt, 1846)	o	+		
Chamaemyia Meigen, 1813				
<i>aridella</i> (Fallén, 1823)	o	+		
<i>elegans</i> (Panzer, 1809)	o	+		
<i>flavicornis</i> (Strobl, 1902)		+	x	
<i>geniculata</i> (Zetterstedt, 1838)	o	+		
<i>juncorum</i> (Fallén, 1823)	o	+	x	
<i>polystigma</i> (Meigen, 1830)	o	+		
Leucopis Meigen, 1830				
<i>annulipes</i> Zetterstedt, 1848	o	x		
<i>griseola</i> (Fallén, 1823)	o			Bestimmung fraglich

<i>puncticornis</i> Meigen, 1830	o	+		
<i>riedeli</i> Czerny, 1936				Nachweis fraglich
<i>Leucopomyia</i> Malloch, 1921				
<i>silesiaca</i> (Egger, 1862)		+		
<i>Neoleucopis</i> Malloch, 1921				
<i>atratura</i> (Ratzeburg, 1844)	o			Nachweis fraglich
<i>Parochthiphila</i> Czerny, 1904				<i>Euestelia</i>
<i>coronata</i> (Loew, 1858)		+		
CHLOROPIDAE Halmfliegen				BB: 132 / Dt.: 198 / Eur.: 394 / Ww: 2.863 Arten
<i>Aphanotrigonum</i> Duda, 1932				
<i>trilineatum</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>Apotropina</i> Hendel, 1907				<i>Lasiopleura</i>
<i>brevivenosa</i> (Dely-Draskovits, 1977)			x	
<i>Calamoncosis</i> Enderlein, 1911				<i>Rhaphiopyga, Stizambia</i>
<i>apistylina</i> Duda, 1935			x	Nachweis fraglich
<i>glyceriae</i> Nartshuk, 1985			x	Nachweis fraglich
<i>minima</i> (Strobl, 1893)		x	x	Locus typicus für <i>C. colligata</i> Duda: Berlin
<i>oscinella</i> (Becker, 1910)		x	x	Locus typicus: Berlin
<i>rhenana</i> Wendt, 1994			x	Nachweis fraglich
<i>Centorisoma</i> Becker, 1910				
<i>elegantulum</i> Becker, 1910				Nachweis fraglich
<i>Cetema</i> Hendel, 1907				<i>Centor, Centorella, Archedetema, Centema</i>
<i>cerere</i> (Fallén, 1820)	o		x	
<i>elongata</i> (Meigen, 1830)			x	
<i>myopinum</i> (Loew, 1866)			x	
<i>Chlorops</i> Meigen, 1803				<i>Oscinis, Cotilea, Anthracophaga</i>
<i>calceatus</i> Meigen, 1830	o		x	
<i>dasycerus</i> Loew, 1866			x	
<i>fasciatus</i> Meigen, 1830			x	
<i>finitimus</i> Becker, 1910			x	
<i>geminatus</i> Meigen, 1830	o			Bestimmung fraglich
<i>gracilis</i> Meigen, 1930	o		x	
<i>hypostigma</i> Meigen, 1830	o		x	
<i>laetus</i> Meigen, 1830	o			Bestimmung fraglich
<i>novakii</i> Strobl, 1902				Nachweis fraglich
<i>planifrons</i> Loew, 1866			x	
<i>pumilionis</i> (Bjerkander, 1778)			x	
<i>ringens</i> Loew, 1866			x	
<i>rufinus</i> (Zetterstedt, 1848)			x	
<i>scalaris</i> Meigen, 1830	o		x	
<i>serenus</i> Loew, 1866			x	
<i>speciosus</i> Meigen, 1830			x	
<i>strigulus</i> (Fabricius, 1794)	o	x		Bestimmung fraglich
<i>triangularis</i> Becker, 1910			x	
<i>troglydites</i> (Zetterstedt, 1848)			x	
<i>varsoviensis</i> Becker, 1910		x	x	Loci typici für <i>C. berlinensis</i> Becker und <i>C. adspersa</i> Oldenberg: Berlin
<i>Conioscinella</i> Duda, 1929				
<i>frontella</i> (Fallén, 1820)	o		x	
<i>sordidella</i> (Zetterstedt, 1848)			x	
<i>zetterstedti</i> Andersson, 1966			x	
<i>Cryptonevra</i> Lioy, 1864				<i>Haplegis, Neohaplegis, Cryptoneura</i>
<i>consimilis</i> Collin, 1932			x	
<i>flavitaris</i> (Meigen, 1830)	o		x	

<i>glabra</i> (Duda, 1939)			x	
<i>nigritarsis</i> (Duda, 1933)			x	
<i>tarsata</i> (Fallén, 1820)	o		x	
<i>Dasyopa</i> Malloch, 1918				<i>Trachysiphonella</i>
<i>pygmaea</i> (Meigen, 1838)	o		x	
<i>Dicraeus</i> Loew, 1873				<i>Oedesiella, Paroedesiella, Oxyapium, Dicraeinus, Parasita</i>
<i>fennicus</i> Duda, 1933			x	
<i>vagans</i> (Meigen, 1838)			x	
<i>Diplotaxa</i> Loew, 1863				<i>Anthobia, Diplotoxoides</i>
<i>messoria</i> (Fallén, 1820)	o		x	
<i>Elachiptera</i> Macquart, 1835				<i>Crassiseta, Pachychaeta, Macrochetum, Myrmecomorpha</i>
<i>austriaca</i> Duda, 1932			x	
<i>brevipennis</i> (Meigen, 1830)	o	x	x	
<i>cornuta</i> (Fallén, 1820)	o		x	
<i>diastema</i> Collin, 1946			x	
<i>megaspis</i> (Loew, 1858)			x	
<i>scrobiculata</i> (Strobl, 1901)			x	
<i>tuberculifera</i> (Corti, 1909)			x	
<i>Eribolus</i> Becker, 1910				<i>Epilobus</i>
<i>gracilior</i> (de Meijere, 1916)			x	
<i>hungaricus</i> Becker, 1910			x	
<i>nanus</i> (Zetterstedt, 1838)			x	
<i>Eutropha</i> Loew, 1866				<i>Pseudoformosina</i>
<i>fulvifrons</i> (Haliday, 1833)			x	
<i>variegata</i> Loew, 1866			x	
<i>Gaurax</i> Loew, 1863				<i>Botanobia</i>
<i>niger</i> Czerny, 1906			x	
<i>Incertella</i> Sabrosky, 1980				<i>Tropidoscinis</i>
<i>albipalpis</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>Lasiambia</i> Sabrosky, 1941				<i>Fiebrigella, Goniopsita</i>
<i>coxalis</i> (von Roser, 1840)		x	x	Locus typicus für <i>G. oophila</i> Hennig: Berlin
<i>palposa</i> (Fallén, 1820)			x	
<i>Lasiosina</i> Becker, 1910				
<i>cinctipes</i> (Meigen, 1830)			x	
<i>immaculata</i> Becker, 1912			x	
<i>Lipara</i> Meigen, 1830				<i>Gymnopoda</i>
<i>lucens</i> Meigen, 1830	o		x	
<i>rufitarsis</i> Loew, 1858			x	
<i>similis</i> Schiner, 1854	o		x	
<i>Melanochaeta</i> Bezzi, 1906				<i>Pachychoeta, Pachychaetina, Lasiochaeta</i>
<i>opaca</i> (Duda, 1932)		x	x	Locus typicus: Berlin
<i>Meromyza</i> Meigen, 1830				<i>Meromyia</i>
<i>coronoseta</i> Hubicka, 1969			x	
<i>curvinervis</i> (Zetterstedt, 1848)			x	
<i>laeta</i> Meigen, 1830	o			Bestimmung fraglich
<i>nigriventris</i> Macquart, 1835	o		x	
<i>pallida</i> Fedosejeva, 1960			x	
<i>palposa</i> Fedosejeva, 1960			x	
<i>pluriseta</i> Peterfi, 1961			x	
<i>pratorum</i> Meigen, 1830	o			Bestimmung fraglich
<i>saltatrix</i> (Linnaeus, 1761)	o		x	Bestimmung fraglich
<i>variegata</i> Meigen, 1830	o			Bestimmung fraglich

<i>virescens</i> von Roser, 1840			x	
<i>Microceris</i> Beschovski, 1978				
<i>trigonella</i> (Duda, 1933)			x	
<i>Oscinella</i> Becker, 1909				<i>Oscinis, Cyclocercula, Microcercis</i>
<i>angustipennis</i> Duda, 1933			x	
<i>cariciphila</i> Collin, 1946			x	
<i>frit</i> (Linnaeus, 1758)	o		x	
<i>hortensis</i> Collin, 1946			x	
<i>maura</i> (Fallén, 1820)	o		x	
<i>nigerrima</i> (Macquart, 1835)			x	
<i>nitidissima</i> (Meigen, 1838)			x	
<i>pusilla</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>vastator</i> (Curtis, 1845)			x	
<i>Oscinimorpha</i> Lioy, 1864				
<i>arcuata</i> (Duda, 1932)			x	
<i>minutissima</i> (Strobl, 1893)			x	
<i>Oscinisoma</i> Lioy, 1864				<i>Oscinosoma</i>
<i>cognata</i> (Meigen, 1830)	o	x	x	Locus typicus für <i>O. rugulosa</i> Dahl: in Brdbrg.
<i>Parectecephala</i> Becker, 1910				
<i>longicornis</i> (Fallén, 1820)			x	
<i>Platycephala</i> Fallén, 1820				<i>Phlyarus</i>
<i>planifrons</i> (Fabricius, 1798)	o			Bestimmung fraglich
<i>umbraculata</i> (Fabricius, 1794)	o		x	
<i>Polyodaspis</i> Duda, 1933				<i>Macrothorax</i>
<i>sulcicollis</i> (Meigen, 1838)			x	
<i>Pseudoparychaeta</i> Strobl, 1902				
<i>approximatonervis</i> (Zett., 1848)			x	
<i>Rhodesiella</i> Adams, 1905				<i>Macrostyla, Rhodesia, Apistyla</i>
<i>plumiger</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>Rhopalopterum</i> Duda, 1929				<i>Lioscinella</i>
<i>anthracinum</i> (Meigen, 1830)	o			Bestimmung fraglich
<i>atricillum</i> (Zetterstedt, 1838)			x	
<i>fasciolum</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>femorale</i> (Collin, 1946)			x	
<i>Siphunculina</i> Rondani, 1856				<i>Microneurum</i>
<i>aenea</i> (Macquart, 1835)			x	
<i>Thaumatomyia</i> Zenker, 1833				<i>Chloropisca</i>
<i>glabra</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>hallandica</i> Andersson, 1966			x	
<i>notata</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>rufa</i> (Macquart, 1835)			x	
<i>trifasciata</i> (Zetterstedt, 1845)			x	
<i>Trichieurina</i> Duda, 1933				
<i>pubescens</i> (Meigen, 1830)	o			Bestimmung fraglich
<i>Tricimba</i> Lioy, 1864				<i>Crassivenula, Notonaulax, Nartschukiella, Schumanniella, Trycimba</i>
<i>cincta</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>humeralis</i> (Loew, 1858)			x	
<i>lineella</i> (Fallén, 1820)	o			Bestimmung fraglich
CHYROMYIDAE Chyromyiden				BB: 4 / Dt.: 6 / Eur.: 20 / Ww: 33 Arten
<i>Chyromya</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Lisella, Scyphyrella, Thyrimyia, Chiromyia</i>
<i>femorella</i> (Fallén, 1820)	o			Bestimmung fraglich
<i>flava</i> (Linnaeus, 1758)			+	
<i>oppidana</i> (Scopoli, 1763)	o	+		

<i>Gymnochiromyia</i> Hendel, 1933				<i>Peletophila</i>
<i>flavella</i> (Zetterstedt, 1848)		+		
CLUSIIDAE Clusiiden [<i>Heteroneuridae</i>]				BB: 5 / Dt.: 9 / Eur.: 14 / Ww: 240 Arten
<i>Clusia</i> Haliday, 1830				<i>Stomphastica, Macrochira, Peratochetus, Stomphastica</i>
<i>flava</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>Clusiodes</i> Coquillett, 1904				<i>Heteroneura, Clusiaria, Columbiella</i>
<i>albimanus</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>caledonicus</i> (Collin, 1912)		+		
<i>ruficollis</i> (Meigen, 1830)		+	x	
<i>Paraclusia</i> Czerny, 1903				<i>Helomyza</i>
<i>tigrina</i> (Fallén, 1820)		+		
COELOPIDAE Tangfliegen				BB: 0 / Dt.: 2 / Eur.: 3 / Ww: 25 Arten
COENOMYIIDAE Stinkfliegen [ehem. zu Xylophagidae]				BB: 1 / Dt.: 1 / Eur.: 1 / Ww: 23 Arten
<i>Coenomyia</i> Latreille, 1796				<i>Caenomyia</i>
<i>ferruginea</i> (Scopoli, 1763)	o	+		
CONOPIDAE Dickkopffliegen				BB: 30 / Dt.: 52 / Eur.: 84 / Ww: 800 Arten
<i>Abrachyglossum</i> Kröber, 1919				
<i>capitatum</i> (Loew, 1847)		+	x	
<i>Conops</i> Linnaeus, 1758				<i>Conopaejus, Conopilla, Sphixosoma, Bombidia</i>
<i>flavipes</i> Linnaeus, 1758	o	+		
<i>quadrifasciatus</i> De Geer, 1776	o	+	+	
<i>scutellatus</i> Meigen, 1804		+		
<i>vesicularis</i> Linnaeus, 1763		+	+	
<i>Dalmannia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Stachynia</i>
<i>dorsalis</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>marginata</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>punctata</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>Leopoldius</i> Rondani, 1843				<i>Brachyglossum, Brachiglossum</i>
<i>signatus</i> (Wied. in Meigen, 1824)	o			Bestimmung fraglich
<i>Melanosoma</i> Robineau-Desv., 1830				
<i>bicolor</i> (Meigen, 1824)	o			Bestimmung fraglich
<i>Myopa</i> Fabricius, 1775				<i>Pictinia, Myopella, Phorosia, Fairmairia, Arpagita, Myopina, Glossigona, Gonirhynchus, Haustellia</i>
<i>buccata</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>dorsalis</i> Fabricius, 1794	o	+		
<i>fasciata</i> Meigen, 1804	o	+		
<i>occulta</i> Wied. in Meigen, 1804	o	+	x	
<i>picta</i> Panzer, 1798		+		
<i>polystigma</i> Rondani, 1857		+	+	
<i>strandii</i> Duda, 1940		+	x	
<i>tesselatipennis</i> Motschulsky, 1859		+	x	
<i>testacea</i> (Linnaeus, 1767)	o	+	x	
<i>variegata</i> Meigen, 1804	o	+		
<i>vicaria</i> Walker, 1849			x	
<i>Myopotta</i> Zimina, 1969				
<i>pallipes</i> (Wied. in Meigen, 1824)	o	+		
<i>Physocephala</i> Schiner, 1861				
<i>chrysorrhoea</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>rufipes</i> (Fabricius, 1781)	o	+	+	
<i>vittata</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>Sicus</i> Scopoli, 1763				<i>Cylindrogaster</i>
<i>ferrugineus</i> (Linnaeus, 1761)	o	+	x	
<i>Thecophora</i> Rondani, 1845				<i>Occemyia, Occemya</i>

<i>atra</i> (Fabricius, 1775)	o	+	x	
<i>distincta</i> (Wied. in Meigen, 1824)		+	x	
<i>fulvipes</i> (Robineau-Desv., 1830)		+		
<i>pusilla</i> (Meigen, 1824)		+	x	
<i>Zodion</i> Latreille, 1796				
<i>carceli</i> Robineau-Desv., 1830		+		
<i>cinereum</i> (Fabricius, 1794)	o	+	x	
<i>notatum</i> (Meigen, 1804)	o			Bestimmung fraglich
CREMIFANIIDAE Cremifaniiden [ehem. zu Chamaemyiidae]				BB: 0 / Dt.: 1 / Eur.: 1 / Ww: 3 Arten
CRYPTOCHETIDAE Schildlausfliegen [<i>Cryptochaetidae</i>]				BB: 1 / Dt.: 1 / Eur.: 2 / Ww: 30 Arten
<i>Cryptochetum</i> Rondani, 1875				<i>Cryptochaetum, Lestophonus</i>
<i>buccatum</i> Hendel, 1933		x		Locus typicus: Berlin
DIASTATIDAE Diastatiden				BB: 4 / Dt.: 6 / Eur.: 17 / Ww: 49 Arten
<i>Diastata</i> Meigen, 1830				
<i>adusta</i> Meigen, 1830		+		
<i>costata</i> Meigen, 1830	o			
<i>fuscata</i> (Fallén, 1823)		+		
<i>nebulosa</i> (Fallén, 1823)		+	x	
DOLICHOPODIDAE Langbeinfliegen				BB: 161 / Dt.: 356 / Eur.: 773 / Ww: 6.200 Arten
<i>Achalcus</i> Loew, 1857				
<i>cinereus</i> (Haliday in Walker, 1851)		+		
<i>thalhammeri</i> Lichtwardt, 1913			?	
<i>Anepsiomyia</i> Bezzi, 1902				<i>Anepsius</i>
<i>flaviventris</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>Argyra</i> Macquart, 1834				<i>Porphyrops, Leucostola</i>
<i>argentata</i> (Macquart, 1834)	o			
<i>argentina</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>argyria</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>diaphana</i> (Fabricius, 1775)	o	+		
<i>discedens</i> Becker, 1907		+		
<i>ilonae</i> Gosseries, 1989		+		
<i>leucocephala</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>magnicornis</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>vestita</i> (Wiedemann, 1817)	o	+		
<i>Campsicnemus</i> Haliday, 1851				<i>Camptosceles, Ectomus</i>
<i>alpinus</i> (Haliday, 1833)		x		
<i>curvipes</i> (Fallén, 1823)	o +	+		
<i>dasygnemus</i> Loew, 1857		x		
<i>scambus</i> (Fallén, 1823)	o +	+		
<i>Chrysotimus</i> Loew, 1857				
<i>molliculus</i> (Fallén, 1823)	+	+		
<i>Chrysotus</i> Meigen, 1824				
<i>angulicornis</i> Kowarz, 1874		+		
<i>cilipes</i> Meigen, 1824	o			
<i>femoratus</i> Zetterstedt, 1843		+		
<i>gramineus</i> (Fallén, 1823)	o +	+		Locus typicus v. <i>C. facialis</i> Gerstäcker, 1864: Bln.
<i>laesus</i> (Wiedemann, 1817)	o	+		
<i>neglectus</i> (Wiedemann, 1917)	o	+		
<i>pulchellus</i> Kowarz, 1874		+		
<i>suavis</i> Loew, 1857		+		
<i>Diaphorus</i> Meigen, 1824				<i>Brachypus, Diaphora</i>
<i>hoffmannseggii</i> Meigen, 1830	+	+		
<i>nigricans</i> Meigen, 1824	o			
<i>oculatus</i> (Fallén, 1823)	o +	+		

<i>Dolichopus</i> Latreille, 1796				<i>Hygroceleuthus, Macrodolichopus, Ragheneura</i>
<i>acuticornis</i> (Wiedemann, 1817)	o +	+	x	
<i>agilis</i> Meigen, 1824	o	+	x	
<i>annulipes</i> Zetterstedt, 1838	x	+	x	
<i>atratus</i> Meigen, 1824		+		
<i>atripes</i> Meigen, 1824	o +	+		
<i>brevipennis</i> Meigen, 1824	o +			
<i>campestris</i> Meigen, 1824	o +			
<i>cilifemoratus</i> Macquart, 1827	+	+		
<i>claviger</i> Stannius, 1831	+	+		
<i>eurypterus</i> Gerstäcker, 1864	+			Locus typicus: Berlin
<i>excisus</i> Loew, 1859		+		
<i>flavipes</i> Stannius, 1831			+	
<i>griseipennis</i> Stannius, 1831		+		
<i>latilimbatus</i> Macquart, 1827		+		
<i>lepidus</i> Staeger, 1842	x	+	+	
<i>linearis</i> Meigen, 1824	o +			
<i>lineatocornis</i> Zetterstedt, 1843	+			Locus typicus von <i>D. fallaciosus</i> Gerstäcker, 1864: in Brandenburg
<i>longicornis</i> Stannius, 1831	o +	+		
<i>longitarsis</i> Stannius, 1831		+		
<i>melanopus</i> Meigen, 1824	o			
<i>migrans</i> Zetterstedt, 1843	+			
<i>nigricornis</i> Meigen, 1824	o +	+	+	
<i>nigripes</i> Fallén, 1823	+			
<i>nitidus</i> Fallén, 1823	o +	+		
<i>notatus</i> Staeger, 1842	+			
<i>nubilus</i> Meigen, 1824	o +	+		
<i>pennatus</i> Meigen, 1824		+	x	
<i>picipes</i> Meigen, 1824	+	+		
<i>planitarsis</i> Fallén, 1823	o +	+		
<i>plumipes</i> (Scopoli, 1763)	o +	+	x	
<i>popularis</i> Wiedemann, 1817	o +			
<i>punctum</i> Meigen, 1824	x	+		Locus typicus: Berlin
<i>ruthei</i> Loew, 1847	+	+		Locus typicus: Berlin
<i>signatus</i> Meigen, 1824	o +			
<i>simplex</i> Meigen, 1824		+	x	
<i>ungulatus</i> (Linnaeus, 1758)	o +	+	x	
<i>vitripennis</i> Meigen, 1824	+			
<i>Hercostomus</i> Loew, 1857				<i>Archaanthipodus, Gymnopternus, Platyopsis, Dasyarthrus, Poecilobothrus</i>
<i>aerosus</i> (Fallén, 1823)	o +	+		
<i>assimilis</i> (Staeger, 1842)	+	+		
<i>bicolor</i> (Macquart, 1827)		+		
<i>celer</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>chalybeus</i> (Wiedemann, 1817)		+		
<i>chetifer</i> Haliday in Walker, 1849)	+			
<i>chrysozygos</i> (Wiedem., 1817)	+	+		
<i>cupreus</i> (Fallén, 1823)	o +			
<i>germanus</i> (Wiedemann, 1817)	o +	+		
<i>longiventris</i> (Loew, 1857)		+		
<i>metallicus</i> (Stannius, 1831)	+	+		
<i>nigrilamellatus</i> (Macquart, 1827)		+		
<i>nigripennis</i> (Fallén, 1823)	o +			

<i>nigriplantis</i> (Stannius, 1831)	+	+		Locus typicus: Berlin
<i>pilifer</i> (Loew, 1859)		+		Locus typicus v. <i>H. pilifer</i> Gerst., 1864: bei Bln.
<i>plagiatus</i> (Loew, 1857)		+		
<i>rusticus</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>vivax</i> (Loew, 1857)		+		
<i>Hydrophorus</i> Fallén, 1823				<i>Aphozeta</i>
<i>balticus</i> (Meigen, 1824)	o			
<i>bipunctatus</i> (Lehmann, 1822)	o	+		
<i>litoreus</i> Fallén, 1823	o +	+		
<i>nebulosus</i> Fallén, 1823	o +			
<i>praecox</i> (Lehmann, 1822)	o	+		
<i>rufibarbis</i> Gerstäcker, 1864	o			Locus typicus: Berlin
<i>viridis</i> (Meigen, 1824)	o			
<i>Hypophyllus</i> Haliday, 1832				<i>Spathitarsus</i>
<i>crinipes</i> (Staeger, 1842)	+	+		
<i>discipes</i> (Germar, 1817)	o +	+		
<i>obscurellus</i> (Fallén, 1823)		+		
<i>Liancalus</i> Loew 1857				<i>Anoplomerus, Anoplopus</i>
<i>virens</i> (Scopoli, 1763)		+		
<i>Medetera</i> Fischer v. Waldheim, 1819				<i>Medeterium, Taechobates, Asioligochaetus, Orthobates, Anorthus, Oligochaetus, Lorea</i>
<i>ambigua</i> (Zetterstedt, 1843)	+			
<i>apicalis</i> (Zetterstedt, 1843)	+	+		
<i>chrysotimiformis</i> Kowarz, 1868		+		
<i>dendrobaena</i> Kowarz, 1877		+		
<i>diadema</i> (Linnaeus, 1767)	o +			
<i>infumata</i> Loew, 1857		+		
<i>jacula</i> (Fallén, 1823)	o	+		
<i>micacea</i> Loew, 1857		+		
<i>muralis</i> Meigen, 1824	#			Locus typicus v. <i>M. tertia</i> Becker, 1917 in Berlin
<i>obscura</i> (Zetterstedt, 1838)	+	+		
<i>pallipes</i> (Zetterstedt, 1843)		+	x	
<i>petrophila</i> Kowarz, 1877		+		
<i>plumbella</i> Meigen, 1824	o +	+		Locus typicus: Berlin
<i>tristis</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>truncorum</i> Meigen, 1824		+	x	
<i>vagans</i> Becker, 1917		+ #		Locus typicus: bei Berlin
<i>Nematoproctus</i> Loew, 1857				
<i>distendens</i> (Meigen, 1824)	o			
<i>longifilus</i> Loew, 1857	+			
<i>Neurigona</i> Rondani, 1856				<i>Saucropus, Neurogona</i>
<i>abdominalis</i> (Fallén, 1823)		+		
<i>pallida</i> (Fallén, 1823)	+	+		
<i>quadrifasciata</i> (Fabricius, 1781)	o +	+		
<i>suturalis</i> (Fallén, 1823)		+		
<i>Poecilobothrus</i> Mik, 1878				
<i>infuscatus</i> (Stannius, 1831)			x	
<i>nobilitatus</i> (Linnaeus, 1767)	o		x	
<i>Rhaphium</i> Meigen, 1803				<i>Anglearia, Xiphandrium, Porphyrops</i>
<i>caliginosum</i> Meigen, 1824		+		
<i>commune</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>crassipes</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>elegantulum</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>fasciatum</i> Meigen, 1824	o	+		

<i>fissum</i> Loew, 1850		+		
<i>fractum</i> Loew, 1850	o			
<i>laticorne</i> (Fallén, 1823)	o +	+		
<i>longicorne</i> (Fallén, 1823)	o	+		
<i>macrocerum</i> Meigen, 1824	o			
<i>micans</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>nasutum</i> (Fallén, 1823)	o +	+		
<i>penicillatum</i> Loew, 1850	+	+		
<i>praerosum</i> Loew, 1850	+	+		
<i>zetterstedti</i> (Parent, 1925)		+		
<i>Sciapus</i> Zeller, 1842				<i>Psilopus, Stenarus, Psilopodius, Psilopondinus, Agonosoma</i>
<i>albifrons</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>contristans</i> (Wiedemann, 1817)	o +		x	
<i>laetus</i> (Meigen, 1838)	o			
<i>lobipes</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>longulus</i> (Fallén, 1923)	o	+	x	
<i>maritimus</i> Becker, 1918		+		
<i>nervosus</i> (Lehmann, 1822)	o +	+		
<i>platypterus</i> (Fabricius, 1805)	o	+		
<i>wiedemanni</i> (Fallén, 1823)	+	+		
<i>Scellus</i> Loew, 1857				
<i>notatus</i> (Fabricius, 1781)	o			
<i>Sybistroma</i> Meigen, 1824				<i>Nodicornis</i>
<i>nodicornis</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Sympycenus</i> Loew, 1857				<i>Hopliognusus, Sympygnus</i>
<i>aeneicoxa</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>annulipes</i> (Meigen, 1824)	o +	+	x	
<i>Syntormon</i> Loew, 1857				<i>Bathycranium, Eutarsus, Synarthus, Drymonoeca</i>
<i>bicolorellus</i> (Zetterstedt, 1843)		+		
<i>metathesis</i> (Loew, 1850)		+		
<i>pumilus</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>tarsatus</i> (Fallén, 1823)		+		
<i>Systemus</i> Loew, 1857				
<i>pallipes</i> (von Roser, 1840)		+		
<i>Tachytrechus</i> Haliday, 1851				<i>Ammobates, Hammobates, Tetrechus</i>
<i>ammobates</i> (Hal. in Walker, 1851)	o +			
<i>insignis</i> (Stannius, 1831)	+	+		
<i>melaleucus</i> Gerstäcker, 1864	+		x	Locus typicus: bei Berlin
<i>notatus</i> (Stannius, 1831)		+		
<i>Teuchophorus</i> Loew, 1857				
<i>spinigerellus</i> (Zetterstedt, 1843)		+		
<i>Thrypticus</i> Gerstäcker, 1864				<i>Submedeterus</i>
<i>divisus</i> (Strobl, 1880)		#		Locus typicus <i>T. crassiseta</i> Oldenburg, 1916: Berlin
<i>viridis</i> Parent, 1932		x		Locus typicus: Berlin
<i>Xanthochlorus</i> Loew, 1857				
<i>ornatus</i> (Haliday, 1832)	+	+		
<i>tenellus</i> (Wiedemann, 1817)	+	+	x	
DROSOPHILIDAE Obstfliegen				BB: 43 / Dt.: 59 / Eur.: 121 / Ww: 3.300 Arten
<i>Acletoxenus</i> Frauenfeld, 1868				
<i>formosus</i> (Loew, 1864)		x		
<i>Amiota</i> Loew, 1862				<i>Phortica, Paraphortica</i>
<i>alboguttata</i> (Wahlberg, 1839)		+		
<i>oldenberg</i> (Duda, 1924)		#		Locus typicus: Berlin

<i>variegata</i> (Fallén, 1823)		x		
<i>Cacoxenus</i> Loew, 1858				<i>Domomyza, Paragitona, Gitonides, Paracacoxenus</i>
<i>indagator</i> Loew, 1858		+	+	
<i>Chymomyza</i> Czerny, 1903				<i>Amphoroneura</i>
<i>amoena</i> (Loew, 1862)			+	
<i>costata</i> (Zetterstedt, 1838)		+	+	
<i>distincta</i> (Egger, 1862)		x		
<i>fuscimana</i> (Zetterstedt, 1838)		x		
<i>Drosophila</i> Fallén, 1823				<i>Dorsilopha, Lordiphosa, Sophophora, Dorsilopha, Hirtodrosophila, Spinulophila, Acanthopterna, Acanthophila</i>
<i>ambigua</i> Pomini, 1940			+	
<i>andalusiaca</i> Strobl, 1906		+		
<i>bifasciata</i> Pomini, 1940			+	
<i>busckii</i> Coquillett, 1901		+	+	
<i>confusa</i> Staeger, 1844	o	+	x	
<i>deflexa</i> Duda, 1924		+		
<i>fenestrarum</i> Fallén, 1823	o	+	x	
<i>funnebris</i> (Fabricius, 1787)	o	+	+	
<i>helvetica</i> Burla, 1948			x	
<i>histrion</i> Meigen, 1830	o	x	+	
<i>hydei</i> Sturtevant, 1921			+	
<i>immigrans</i> Sturtevant, 1921			+	
<i>limbata</i> von Roser, 1840		+	x	
<i>littoralis</i> Meigen, 1830		+	x	
<i>melanogaster</i> Meigen, 1830	o	+	+	
<i>obscura</i> Fallén, 1823	o	+	+	
<i>phalerata</i> Meigen, 1830	o	+	+	
<i>picta</i> Zetterstedt, 1847		+ #		Locus typicus für <i>D. pleurofasciata</i> Duda: Berlin
<i>repleta</i> Wollaston, 1858		+	+	
<i>rufifrons</i> Loew, 1873		+	x	
<i>simulans</i> Sturtevant, 1919			x	
<i>subobscura</i> Collin in Gordon, 1936			+	
<i>subsilvestris</i> Hardy & Kanesh., 1968			x	
<i>testacea</i> von Roser, 1840		+	+	
<i>transversa</i> Fallén, 1823	o	+	+	
<i>tristis</i> Fallén, 1823		+	+	
<i>Gitona</i> Meigen, 1830				
<i>distigma</i> Meigen, 1830	o	+		
<i>Leucophenga</i> Mik, 1886				<i>Drosomyiella</i>
<i>maculata</i> (Dufour, 1839)		x	x	
<i>Scaptomyza</i> Hardy, 1849				<i>Scaptomyzella</i>
<i>flava</i> (Fallén, 1823)	o	+	+	
<i>graminum</i> (Fallén, 1823)	o	+	+	
<i>griseola</i> (Zetterstedt, 1847)		x		
<i>pallida</i> (Zetterstedt, 1847)		+	+	
<i>Stegana</i> Meigen, 1830				<i>Steganina, Chaetocnema, Oxyphortica</i>
<i>coleoprata</i> (Scopoli, 1763)	o	+		
<i>furta</i> (Linnaeus, 1767)	o	+		
DRYOMYZIDAE Baumfliegen				BB: 2 / Dt.: 3 / Eur.: 4 / Ww: 9 Arten
<i>Dryomyza</i> Fallén, 1820				
<i>analis</i> Fallén, 1820	o	+		
<i>flaveola</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
EGINIIDAE Eginiden [ehem. zu Muscidae]				BB: 1 / Dt.: 1 / Eur.: 1 / Ww: 10 Arten

<i>Eginia</i> Robineau-Desvoidy, 1830			
<i>ocypterata</i> (Meigen, 1826)	o		
EMPIDIDAE Tanzfliegen [Empidae]			BB: 94 / Dt.: 383 / Eur.: 816 / Ww: 2.500 Arten
<i>Chelifera</i> Macquart, 1823			<i>Mantipeza, Polydromia</i>
<i>monostigma</i> (Meigen, 1822)		+	
<i>precatória</i> (Fallén, 1816)		+	
<i>stigmatica</i> (Schiner, 1862)		+	
<i>Chelipoda</i> Macquart, 1823			<i>Chiromantis, Chryomantis, Thamnomyia</i>
<i>vocatoria</i> (Fallén, 1816)	+		
<i>Clinocera</i> Meigen, 1803			<i>Hydrodromia, Kowarzia, Phaeobalia, Atalanta, Paramesia, Wiedmannia, Bergenstammia, Archiclinocera, Hypoclinocera</i>
<i>nigra</i> Meigen, 1804		x	
<i>stagnalis</i> (Haliday, 1833)	x	x	
<i>wesmaeli</i> (Macquart, 1835)		+	
<i>Dolicocephala</i> Macquart, 1823			<i>Ardoptera, Leptosceles</i>
<i>guttata</i> (Haliday, 1833)		+	
<i>irrorata</i> (Fallén, 1816)		+	
<i>Empis</i> Linnaeus, 1758			<i>Anacrostichus, Captophlebia, Pachymeria, Platyptera, Polyblepharis, Xanthempis, Ancrostichus, Lissempis, Argyradrus, Zapolia, Leptempis, Kritempis, Rhadinempis, Euempis, Planempis, Pachymerina, Platypterygia</i>
<i>acinerea</i> Chvála, 1985		x	
<i>aestiva</i> Loew, 1867		+	
<i>beckeriana</i> Engel, 1946		x	Locus typicus: Berlin
<i>borealis</i> Linnaeus, 1758	+	+	
<i>chioptera</i> Meigen, 1804		+	
<i>cognata</i> Egger, 1860		+	
<i>decora</i> Meigen, 1822	+		
<i>digramma</i> Meigen, 1835		+	
<i>femorata</i> Fabricius, 1798	o		
<i>livida</i> Linnaeus, 1758	o	+	
<i>modesta</i> Meigen, 1838	o		
<i>morosa</i> Meigen, 1822	o		
<i>nigricans</i> Meigen, 1804		+	
<i>nigripes</i> Fabricius, 1794	o	+	
<i>nütida</i> Meigen, 1804		+	
<i>opaca</i> Meigen, 1804	o +	+	
<i>pennipes</i> Linnaeus, 1758	+	+	
<i>picipes</i> Meigen, 1804		+	
<i>pilosa</i> Loew, 1867		+	
<i>punctata</i> Meigen, 1804	o +	+	
<i>rufiventris</i> Meigen, 1838		+	
<i>serotina</i> Loew, 1867		+	
<i>stercorea</i> Linnaeus, 1761		+	
<i>tesselata</i> Fabricius, 1794	o	+	
<i>trigramma</i> Wied. in Meigen, 1822		+	
<i>vitripennis</i> Meigen, 1822	o	+	
<i>volucris</i> Wied. in Meigen, 1822		+	
<i>Hemerodromia</i> Meigen, 1822			<i>Microdromia</i>
<i>oratoria</i> (Fallén, 1816)	+		
<i>raptoria</i> Meigen, 1830		+	
<i>Hilara</i> Meigen, 1822			<i>Pseudoragas, Ochtherohilaria</i>
<i>abdominalis</i> Zetterstedt, 1838	+		

<i>albipennis</i> von Roser, 1840		+		
<i>apta</i> Collin, 1927		+		
<i>chorica</i> (Fallén, 1816)	o +			
<i>cilipes</i> Meigen, 1822	o			
<i>clypeata</i> Meigen, 1822	o			
<i>flavipes</i> Meigen, 1822		+		
<i>fuscipes</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>gallica</i> (Meigen, 1804)	o +	+	x	
<i>griseola</i> Zetterstedt, 1838		+		
<i>intermedia</i> (Fallén, 1816)		x		
<i>interstincta</i> (Fallén, 1816)	o			
<i>litorea</i> (Fallén, 1816)		+	x	
<i>lugubris</i> (Zetterstedt, 1819)	+	+		
<i>lurida</i> (Fallén, 1816)	+	+		
<i>manicata</i> Meigen, 1822		+		
<i>maura</i> (Fabricius, 1776)	o +	+		
<i>nigrina</i> (Fallén, 1816)	o +			
<i>pilipes</i> Zetterstedt, 1838		+		
<i>pilosa</i> Zetterstedt, 1842	o +	x		
<i>sartor</i> Becker, 1888			x	
<i>tenella</i> (Fallén, 1816)		+		
Ragas Walker, 1837				<i>Rhagas</i>
<i>unica</i> Walker, 1837		+		
Rhamphomyia Meigen, 1822				<i>Aclonempis, Amydroneura, Holoclera, Lundstroemiella, Megacyttarus, Dionnaea, Choreodromia, Ctenempis, Amydrosoma, Alpinomyia, Collinaria, Orientomyia, Pararhamphomyia, Calorhamphomyia</i>
<i>albipennis</i> (Fallén, 1816)		+		
<i>albissima</i> Frey, 1913	x			
<i>anfractuosa</i> Bezzi, 1904	+	+		Locus typicus: Berlin
<i>anomala</i> Oldenberg, 1915		#		Locus typicus: bei Berlin
<i>anomalipennis</i> Meigen, 1822		#		Locus typicus: Berlin
<i>atra</i> Meigen, 1822	+	+		
<i>barbata</i> (Macquart, 1823)	+	+		
<i>coracina</i> Zetterstedt, 1849		x		
<i>crassicauda</i> Strobl, 1893		+		
<i>dentata</i> Oldenberg, 1910		#		Locus typicus: Berlin
<i>erythrophthalma</i> Meigen, 1830		#		Locus typicus R. serotina Oldenbg., 1915: Berlin
<i>flava</i> (Fallén, 1916)	+	+		
<i>galactoptera</i> Strobl, 1893		+		
<i>gibba</i> (Fallén, 1816)		+		
<i>ignobilis</i> Zetterstedt, 1859		x		
<i>laevipes</i> (Fallén, 1816)	+			
<i>marginata</i> (Fabricius, 1787)	o +	+		
<i>micans</i> Oldenberg, 1915		#		Locus typicus: bei Berlin
<i>nitidula</i> Zetterstedt, 1842		+		
<i>niveipennis</i> (Zetterstedt, 1838)	+			
<i>nodipes</i> (Fallén, 1816)	+			
<i>obscura</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>pilifer</i> Meigen, 1838		+		
<i>plumipes</i> (Meigen, 1804)	+	+		
<i>pokorny</i> Bezzi, 1904		+		
<i>sciarina</i> (Fallén, 1816)	o			
<i>spinipes</i> (Fallén, 1816)	o +	+		

<i>spinosipes</i> Oldenberg, 1915		#		Locus typicus: bei Berlin
<i>sulcata</i> (Meigen, 1804)	+	+		
<i>trigemina</i> Oldenberg, 1927		#		Locus typicus: bei Berlin
<i>umbripennis</i> Meigen, 1822		+		
<i>variabilis</i> (Fallén, 1816)		+		
<i>vesiculosa</i> (Fallén, 1816)		+		
EPHYDRIDAE Sumpf- Ufer- Weitmaulfliegen				BB: 65 / Dt.: 177 / Eur.: 331 / Ww: 1.800 Arten
<i>Allotrichoma</i> Becker, 1896				<i>Epiphasis, Eremotrichoma</i>
<i>laterale</i> (Loew, 1860)		+		?DEI
<i>schumanni</i> Papp, 1974		+		?DEI
<i>strandii</i> Duda, 1942		+		?DEI
<i>trispinum</i> Becker, 1896		+		?DEI
<i>Athyroglossa</i> Loew, 1860				<i>Stranditrichoma</i>
<i>glabra</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>Axysta</i> Haliday, 1839				<i>Axista</i>
<i>cesta</i> (Haliday, 1833)	o			Vorkommen fraglich
<i>Clanoneurum</i> Becker, 1903				<i>Heringium, Cyclocephala, Discomyzoides</i>
<i>cimiciforme</i> (Haliday, 1855)		+		
<i>Cnestrum</i> Becker, 1896				
<i>lepidopes</i> Becker, 1896		+		?DEI
<i>Coenia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Caenia</i>
<i>curvicauda</i> (Meigen, 1830)	o			Vorkommen fraglich
<i>palustris</i> (Fallén, 1823)	o			Vorkommen fraglich
<i>Dichaeta</i> Meigen, 1830				
<i>caudata</i> (Fallén, 1813)	o	+		
<i>Discocerina</i> Macquart, 1835				<i>Clasiopa</i>
<i>obscurella</i> (Fallén, 1813)	o			Vorkommen fraglich
<i>Discomyza</i> Meigen, 1830				
<i>incurva</i> (Fallén, 1823)	o	+		
<i>Ditrichophora</i> Cresson, 1924				<i>Gymnoclasiopa, Strandiscocera</i>
<i>calceata</i> (Meigen, 1830)	o			Vorkommen fraglich
<i>nivea</i> (Becker, 1896)		+		?DEI
<i>Ephydra</i> Fallén, 1810				
<i>glauca</i> Meigen, 1830	o			Vorkommen fraglich
<i>riparia</i> Fallén, 1813	o			Vorkommen fraglich
<i>Eutaenionotum</i> Oldenberg, 1923				
<i>olivaceum</i> Oldenberg, 1923		+ #		Locus typicus: Berlin
<i>Gymnoclasiopa</i> Hendel, 1930				
<i>cinerella</i> (Stenhammar, 1844)		# +		Locus typicus für <i>D. gemina</i> Oldenberg: Berlin
<i>plumosa</i> (Fallén, 1823)		+		
<i>pulchella</i> (Meigen, 1830)		x		
<i>Hyadina</i> Haliday in Curtis, 1837				<i>Lytogaster, Hyadrina</i>
<i>guttata</i> (Fallén, 1813)		+		
<i>rufipes</i> (Meigen, 1830)	o			Vorkommen fraglich
<i>Hydrellia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Hydropota</i>
<i>albifrons</i> (Fallén, 1813)	o	+	+	Loci typici: Brandenburg für <i>H. hydrocharitis</i> Hering und Berlin für <i>H. xenophaga</i> Hering
<i>albilabris</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>cochleariae</i> Haliday, 1839		+		
<i>fascitibia</i> (von Roser, 1840)		+		
<i>griseola</i> (Fallén, 1813)	o	+	x	
<i>maura</i> Meigen, 1830		+		
<i>nigriceps</i> (Meigen, 1830)	o			Vorkommen fraglich
<i>obscura</i> (Meigen, 1830)	o			Vorkommen fraglich

<i>pilitarsis</i> (Stenhammar, 1844)			x	
<i>ranunculi</i> Haliday, 1839	o			Vorkommen fraglich
<i>svecica</i> Zatwarnicki, 1988	o			Vorkommen fraglich
<i>tarsata</i> Haliday, 1839	#	#		Locus typicus für <i>H. sera</i> Cresson, 1932: Berlin
<i>thoracica</i> Haliday, 1839		+		Locus typicus f. <i>H. glyceriae</i> Hendel: in Brdbrg.
<i>viridescens</i> (Rob.-Desv., 1830)		+		
<i>Ilythea</i> Haliday, 1839				<i>Epipela, Dichaetopareia</i>
<i>spilota</i> (Curtis, 1832)		+		
<i>Limnellia</i> Malloch, 1925				<i>Stictoscatella, Eustigoptera, Stranditella</i>
<i>quadrata</i> (Fallén, 1813)	o		x	Vorkommen fraglich
<i>Mosillus</i> Latreille, 1804				<i>Gymnopa, Glabrinus</i>
<i>subsultans</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>Nostima</i> Coquillett, 1900				<i>Philygriola</i>
<i>picta</i> (Fallén, 1813)	o			
<i>Notiphila</i> Fallén, 1810				<i>Agrolimna, Keratocera, Dichaeta, Pegophila</i>
<i>cinerea</i> Fallén, 1813	o	+	x	
<i>riparia</i> Meigen, 1830	o	+	+	
<i>Ochthera</i> Latreille, 1802				<i>Macrochira</i>
<i>mantis</i> (De Geer, 1776)	o			Vorkommen fraglich
<i>Parydra</i> Stenhammar, 1844				<i>Napaea, Paranaepaea, Chaetoapnaea</i>
<i>coarctata</i> (Fallén, 1813)	o		x	
<i>fossarum</i> (Haliday, 1833)	o			Vorkommen fraglich
<i>littoralis</i> (Meigen, 1830)	o			Vorkommen fraglich
<i>pusilla</i> (Meigen, 1830)	o			Vorkommen fraglich
<i>quadripunctata</i> (Meigen, 1830)	o			Vorkommen fraglich
<i>undulata</i> Becker, 1896	x			Locus typicus: Berlin
<i>Pelina</i> Haliday in Curtis, 1837				<i>Telmatobia, Calocephala</i>
<i>aenea</i> (Fallén, 1813)	o	+		
<i>Philygria</i> Stenhammar, 1844				<i>Hydrina, Nostima, Philygriola</i>
<i>femorata</i> (Stenhammar, 1844)			x	
<i>flavipes</i> (Fallén, 1823)			+	
<i>interstincta</i> (Fallén, 1813)			x	
<i>posticata</i> (Meigen, 1830)			x	
<i>punctatonervosa</i> (Fallén, 1813)	o	+		
<i>vittipennis</i> (Zetterstedt, 1838)			x	
<i>Psilopa</i> Fallén, 1823				<i>Hygrella, Ephygrobia, Diasemocera, Discocerinella</i>
<i>compta</i> (Meigen, 1830)	o			Vorkommen fraglich
<i>leucostoma</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>nitidula</i> (Fallén, 1813)			x	
<i>polita</i> (Macquart, 1835)	o	+	x	
<i>Scatella</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Trixostomus, Strandella, Teichomyza</i>
<i>stagnalis</i> (Fallén, 1813)	o		x	
<i>Scatophila</i> Becker, 1896				
<i>mesogramma</i> (Loew, 1869)			#	Locus typicus <i>S. infantina</i> Becker: Brandenburg
<i>quadriguttata</i> (Meigen, 1830)	o			Vorkommen fraglich
<i>Trimerina</i> Macquart, 1835				
<i>madizans</i> (Fallén, 1813)	o	+		
FANNIIDAE Latrinenfliegen				BB: 33 / Dt.: 56 / Eur.: 83 / Ww: 265 Arten
<i>Fannia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Philinta, Aminta, Homalomyia, Coelomyia, Rhizomyia, Myantha, Eriopoda, Parmalomyia, Gymnochoristomma</i>
<i>armata</i> (Meigen, 1826)	o	+		Locus typicus <i>A. macrophthalma</i> Bouché: Berlin
<i>atra</i> (Stein, 1895)			+	
<i>canicularis</i> (Linnaeus, 1761)	o	+	+	

<i>coracina</i> (Loew, 1873)		+		
<i>cothurnata</i> (Loew, 1873)		x		
<i>fuscata</i> (Fallén, 1825)	o	+	x	
<i>genualis</i> (Stein, 1895)		+		Locus typicus: Berlin
<i>hirticeps</i> (Stein, 1892)		+		
<i>incisurata</i> (Zetterstedt, 1838)		+	+	
<i>lepida</i> (Wiedemann, 1817)	o	+		
<i>limbata</i> (Tiensuu, 1938)		#		Locus typicus für <i>F. berlinensis</i> Hennig : Berlin
<i>lineata</i> (Stein, 1895)		x		
<i>lustrator</i> (Harris, 1780)		+		
<i>manicata</i> (Meigen, 1826)		+	+	
<i>metallipennis</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>minutipalpis</i> (Stein, 1895)		x		
<i>mollissima</i> (Haliday in Westw., 1840)		+		
<i>monilis</i> (Haliday, 1838)		+		
<i>ornata</i> (Meigen, 1826)		x	x	
<i>pallitibia</i> (Rondani, 1866)		+		
<i>postica</i> (Stein, 1895)	x		x	Locus typicus f. <i>F. paraposticata</i> Hennig: Bln.
<i>polychaeta</i> (Stein, 1895)		+		
<i>pruinosa</i> (Meigen, 1826)		x		
<i>rondanii</i> (Strobl, 1893)		+		
<i>scalaris</i> (Fabricius, 1794)	o	+	x	
<i>serena</i> (Fallén, 1825)		+		
<i>similis</i> (Stein, 1895)		+		
<i>sociella</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>spathiophora</i> Malloch, 1918		x		
<i>speciosa</i> (Villeneuve, 1898)		x		
<i>subpubescens</i> Collin, 1958		x		
<i>vespertilionis</i> Ringdahl, 1934		x		
<i>Piezura</i> Rondani, 1866				
<i>graminicola</i> (Zetterstedt, 1846)	x		+	
GASTEROPHILIDAE Magendasseln				BB: 4 / Dt.: 4 / Eur.: 10 / Ww: 18 Arten
<i>Gasterophilus</i> Leach, 1817				<i>Stomachobia, Gastrus, Enteromyza, Stomachobia, Rhinogasterophilus, Enteromyia</i>
<i>haemorrhoidalis</i> (Linnaeus, 1758)		+		
<i>intestinalis</i> (De Geer, 1776)	o	+	x	
<i>nasalis</i> (Linnaeus, 1758)	o		x	
<i>pecorum</i> (Fabricius, 1794)		+		
HELCOMYZIDAE Tangfliegen				BB: 0 / Dt.: 3 / Eur.: 3 / Ww: 13 Arten
HELEOMYZIDAE Scheufliegen [<i>Trioxscelididae, Helomyzidae</i>]				BB: 47 / Dt.: 74 / Eur.: 150 / Ww: 340 Arten
<i>Eccoptomera</i> Loew, 1862				<i>Viatica</i>
<i>filata</i> Loew, 1862	x	+		
<i>longiseta</i> (Meigen, 1830)	o			Nachweis unsicher
<i>marginicornis</i> Czerny, 1924		#		Locus typicus: Berlin
<i>microps</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>obscura</i> (Meigen, 1830)	+	+		
<i>pallescens</i> (Meigen, 1830)	o			Nachweis unsicher
<i>triseta</i> Czerny, 1924		#		Locus typicus: Berlin
<i>Heleomyza</i> Fallén, 1810				<i>Leria, Blephariptera, Subleria, Anypotacta</i>
<i>captiosa</i> (Gorodkov, 1962)	o			Nachweis unsicher
<i>modesta</i> (Meigen, 1838)	o	+		
<i>serrata</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>Heteromyza</i> Fallén, 1820				<i>Lentiphora, Thelida, Heteromyella</i>
<i>atricornis</i> Meigen, 1830	o			Nachweis unsicher

<i>oculata</i> Fallén, 1820		+		
<i>Morpholeria</i> Garret, 1921				<i>Spanoparera, Anthroleria</i>
<i>ruficornis</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>Neoleria</i> Malloch, 1919				
<i>flavicornis</i> (Loew, 1862)	o	#		Locus typicus f. <i>M. chaetopleura</i> Czerny: Berlin
<i>inscripta</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>ruficeps</i> (Zetterstedt, 1838)	o	+		
<i>Oecothea</i> Haliday in Curtis, 1837				
<i>fenestralis</i> (Fallén, 1820)	o	+		
<i>Oldenbergiella</i> Czerny, 1925				
<i>brumalis</i> Czerny, 1925		+		Locus typicus: Berlin
<i>Orbellia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Crymobia, Aranostomoides, Barbastoma</i>
<i>cunicolorum</i> (Rob.-Desv., 1830)		+		
<i>hiemalis</i> (Loew, 1862)	+	+		
<i>Schroederella</i> Enderlein, 1920				<i>Schroederia</i>
<i>iners</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>Scoliocentra</i> Loew, 1862				<i>Archaetomus, Amoebalera, Gymnomus, Chaetomus, Trichoclamys, Leriola</i>
<i>amplicornis</i> (Czerny, 1924)		#		Locus typicus: Berlin
<i>caesia</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>dupliciseta</i> (Strobl, 1894)		+		
<i>flavotestacea</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>villosa</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>Suillia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Helomyza, Herbina, Allophyla, Helomyza</i>
<i>affinis</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>atricornis</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>bicolor</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>femoralis</i> (Loew, 1862)		+		
<i>flava</i> (Meigen, 1830)	o	+		Locus typicus für <i>H. praeusta</i> (Meigen): Berlin
<i>fuscicornis</i> (Zetterstedt, 1847)		+		
<i>humilis</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>imberbis</i> Czerny, 1924		+		
<i>laevifrons</i> (Loew, 1862)	x			Locus typicus: Berlin
<i>lurida</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>nemorum</i> (Meigen, 1830)	o			Locus typicus: Berlin
<i>notata</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>pallida</i> (Fallén, 1820)	o	+		
<i>similis</i> (Meigen, 1838)	o	+		
<i>umbratica</i> (Meigen, 1838)		+		
<i>ustulata</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>Tephrochlaena</i> Czerny, 1924				
<i>halterata</i> (Meigen, 1830)	x			Locus typicus: Berlin
<i>Tephroclamys</i> Loew, 1862				
<i>flavipes</i> (Zetterstedt, 1838)	o	+		
<i>laeta</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>rufiventris</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>tarsalis</i> (Zetterstedt, 1847)	o	+	+	
HILARIMORPHIDAE Hilarimorphiden				BB: 0 / Dt.: 2 / Eur.:2 / Ww: 33 Arten
HIPPOBOSCIDAE Lausfliegen				BB: 8 / Dt.: 12 / Eur.: 30 / Ww: 204 Arten
<i>Crataerina</i> von Olfers, 1816				<i>Oxypterum, Anapera</i>
<i>pallida</i> (Latreille in Olivier, 1812)	o	+		
<i>Hippobosca</i> Linnaeus, 1758				<i>Zoomyia, Niromyia</i>
<i>equina</i> Linnaeus, 1758	o	+	+	
<i>Lipoptena</i> Nitzsch, 1818				<i>Haemobora, Ornithobia, Alcephagus, Alaphagus</i>

<i>cervi</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>Melophagus</i> Latreille, 1802				<i>Melophila</i>
<i>ovinus</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>Ornithomya</i> Latreille, 1802				<i>Ornithomyia</i>
<i>avicularia</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>fringillina</i> (Curtis, 1836)		+		
<i>Ornithophila</i> Rondani, 1879				<i>Ornithiza</i>
<i>metallica</i> (Schiner, 1864)			+	
<i>Stenopteryx</i> Leach, 1817				<i>Stenopteryx, Chelidomyia</i>
<i>hirundinis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
HYBOTIDAE Buckeltanzfliegen [ehem. zu Empididae]				BB: 69 / Dt.: 229 / Eur.: 442 / Ww: 1.700 Arten
<i>Bicellaria</i> Macquart, 1823				<i>Cyrtoma, Enicopteryx, Calo</i>
<i>nigra</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>pilosa</i> Lundbeck, 1910	o	+		
<i>simplicipes</i> (Zetterstedt, 1842)	+	+		
<i>spuria</i> (Fallén, 1816)	o +	+		
<i>Crossopalpus</i> Bigot, 1857				<i>Therinoopsis, Grossopalpus</i>
<i>aeneus</i> (Walker, 1871)		x		
<i>curvipes</i> (Meigen, 1822)		+		
<i>flexuosus</i> (Loew, 1840)		+		
<i>humilis</i> (Frey, 1913)			x	
<i>nigritellus</i> (Zetterstedt, 1842)			x	
<i>setiger</i> (Loew, 1859)	+			
<i>Drapetis</i> Meigen, 1822				<i>Elaphropeza, Caecula, Arbicola</i>
<i>arcuata</i> Loew, 1859			x	
<i>assimilis</i> (Fallén, 1815)	o	x	x	
<i>ephippiata</i> (Fallén, 1815)		+		
<i>exilis</i> Meigen, 1822		x	x	
<i>flavipes</i> Macquart, 1834	+			
<i>pusilla</i> Loew, 1859		+	x	
<i>simulans</i> Collin, 1961			x	
<i>Hybos</i> Meigen, 1803				<i>Neozia</i>
<i>culiciformis</i> (Fabricius, 1775)			x	
<i>femoratus</i> (Müller, 1776)	o	+		
<i>grossipes</i> (Linnaeus, 1767)	o	+		
<i>Ocydromia</i> Meigen, 1820				<i>Eucinesia</i>
<i>glabricula</i> (Fallén, 1816)	o +			
<i>Oedalea</i> Meigen, 1820				
<i>holmgreni</i> Zetterstedt, 1852		+		
<i>hybotina</i> (Fallén, 1816)	+	+		
<i>stigmatella</i> Zetterstedt, 1842	+			
<i>zetterstedti</i> Collin, 1926			x	
<i>Platypalpus</i> Macquart, 1827				<i>Phoroxypa, Cleptodromia, Coryneta, Tachydromia</i>
<i>aeneus</i> (Macquart, 1823)		x		
<i>albiseta</i> (Panzer, 1806)	o	+		
<i>annulatus</i> (Fallén, 1815)			x	
<i>annulipes</i> (Meigen, 1822)	o		x	
<i>articulatoides</i> (Frey, 1918)			x	
<i>australominutus</i> Grootaert, 1989			x	
<i>brachystylus</i> (Bezzi, 1892)			x	
<i>candicans</i> (Fallén, 1815)	+	+		
<i>ciliaris</i> (Fallén, 1816)		+		
<i>cothurnatus</i> Macquart, 1827		+		
<i>cursitans</i> (Fabricius, 1775)	o +	x		

<i>excisus</i> (Becker, 1907)			x	
<i>exilis</i> (Meigen, 1922)		+		
<i>flavicornis</i> (Meigen, 1822)	+			
<i>fuscicornis</i> (Zetterstedt, 1842)		+		
<i>longicornis</i> (Meigen, 1822)	o +	+	x	
<i>longimanus</i> (Corti, 1907)		x		
<i>longiseta</i> (Zetterstedt, 1842)			x	
<i>luteus</i> (Meigen, 1804)	o	+		
<i>maculimanus</i> (Zetterstedt, 1842)			x	
<i>maculipes</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>major</i> (Zetterstedt, 1842)	+	+		
<i>minutus</i> (Meigen, 1804)	o +		x	
<i>niger</i> (Meigen, 1804)	o			
<i>nigritarsis</i> (Fallén, 1816)		+	x	
<i>nigrosetosus</i> (Strobl, 1893)		x		
<i>pallidiventris</i> (Meigen, 1822)			x	
<i>Stilpon</i> Loew, 1859				<i>Agatachys, Tetraneurella, Pseudostilpon</i>
<i>graminum</i> (Fallén, 1815)	o			
<i>lunatus</i> (Walker, 1851)		x		
<i>nubilus</i> Collin, 1926			x	
<i>Synballophthalmus</i> Becker, 1889				<i>Macroptera</i>
<i>dissimilis</i> (Fallén, 1815)		x		
<i>Syndas</i> Loew, 1857				
<i>nigripes</i> (Zetterstedt, 1842)		+		
<i>Synechus</i> Walker, 1852				<i>Acromyia, Pterospilus</i>
<i>muscarius</i> (Fabricius, 1794)		+		
<i>Tachydromia</i> Meigen, 1803				<i>Sicus, Sicodus, Coryneta, Danistes, Tachista</i>
<i>annulimana</i> Meigen, 1822		x	x	
<i>arrogans</i> (Linnaeus, 1761)	o +	+	x	
<i>connexa</i> Meigen, 1822	o	+		
<i>sabulosa</i> Meigen, 1830	+		x	
<i>terricola</i> Zetterstedt, 1819			x	
<i>Tachypeza</i> Meigen, 1830				<i>Cormodromia</i>
<i>fuscipennis</i> (Fallén, 1815)		x	x	
<i>nubila</i> (Meigen, 1804)	+	+	x	
<i>truncorum</i> (Fallén, 1815)	+			
<i>Trichina</i> Meigen, 1830				<i>Pipistrellus, Oealeopsis</i>
<i>clavipes</i> Meigen, 1830		+		
<i>Trichinomyia</i> Tuomikoski, 1959				
<i>flavipes</i> (Meigen, 1830)		+		
HYPODERMATIDAE Hautdasseln [ehem. zu Oestridae]				BB: 4 / Dt.: 5 / Eur.: 8 / Ww: 32 Arten
<i>Hypoderma</i> Latreille, 1818				<i>Marmarya</i>
<i>bovis</i> (Linnaeus, 1758)			x	
<i>diana</i> Brauer, 1858		+		
<i>lineatum</i> (de Villers, 1789)			x	
<i>Oestromyia</i> Brauer, 1860				
<i>leporina</i> (Pallas, 1778)		+		
LAUXANIIDAE Faulfliegen [Sapromyzidae]				BB: 41 / Dt.: 67 / Eur.: 157 / Ww: 1.500 Arten
<i>Aulogastromyia</i> Hendel, 1925				
<i>anisodactyla</i> (Loew, 1845)	o	+		
<i>Calliopum</i> Strand, 1928				<i>Calliope, Halidayella</i>
<i>aeneum</i> (Fallén, 1820)	o	+	x	
<i>elisae</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>geniculatum</i> (Fabricius, 1805)	o			?

<i>Eusapromyza</i> Malloch, 1923					
<i>balioptera</i> Czerny, 1932		+			
<i>multipunctata</i> (Fallén, 1820)	o	+			
<i>Homoneura</i> van der Wulp, 1891					
<i>biumbrata</i> (Loew, 1847)		+			
<i>limnea</i> (Becker, 1895)		+			
<i>mediospinosa</i> (Merz, 2003)			+		
<i>minor</i> (Becker, 1895)		+	x		
<i>notata</i> (Fallén, 1820)	o	+			
<i>Lauxania</i> Latreille, 1804				<i>Callixania</i>	
<i>cylindricornis</i> (Fabricius, 1794)	o	+			
<i>Lyciella</i> Collin, 1948				<i>Lycia, Meiosimyza</i>	
<i>affinis</i> (Zetterstedt, 1847)		+			
<i>decempunctata</i> (Fallén, 1820)	o	+	x		
<i>decipiens</i> (Loew, 1847)	o	+			
<i>illota</i> (Loew, (1847)	o	+			
<i>pallidiventris</i> (Fallén, 1820)	o	+			
<i>rorida</i> (Fallén, 1820)	o	+			
<i>vittata</i> (Walker, 1949)	x	x		Locus typicus f. <i>S. quadrivittata</i> (Loew): Brdbg.	
<i>Minettia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Proraphochaeta, Frenzelia</i>	
<i>fasciata</i> (Fallén, 1826)	o	+	x		
<i>flaviventris</i> (Costa, 1844)		+			
<i>loewi</i> (Schiner, 1864)		+			
<i>longipennis</i> (Fabricius, 1794)	o	+	x		
<i>longiseta</i> (Loew, 1847)		+			
<i>lupulina</i> (Fabricius, 1787)	o	+			
<i>plumicornis</i> (Fallén, 1820)	o	+			
<i>Peplomyza</i> Haliday, 1837					
<i>discoidea</i> (Meigen, 1830)	o	+			
<i>litura</i> (Meigen, 1826)		+	+		
<i>Sapromyza</i> Fallén, 1810				<i>Paralauxania, Sapromyzosoma, Schumannimyia</i>	
<i>albiceps</i> Fallén, 1820	o			?	
<i>apicalis</i> Loew, 1847	o	+	x		
<i>dicromocera</i> Czerny, 1933		#		Locus typicus: Berlin	
<i>hyalinata</i> (Meigen, 1826)	o	+			
<i>obscuripennis</i> Loew, 1847		+			
<i>obsoleta</i> Fallén, 1820		+	x		
<i>quadricincta</i> Becker, 1895	o	+			
<i>quadripunctata</i> (Linnaeus, 1767)	o	+	x		
<i>sexpunctata</i> Meigen, 1826	o			?	
<i>simplicior</i> Hendel, 1908	o			?	
<i>Tricholauxania</i> Hendel, 1925					
<i>praeusta</i> (Fallén, 1820)	o	+			
<i>Trigonometopus</i> Macquart, 1835					
<i>frontalis</i> (Meigen, 1830)	o	+			
LONCHAEIDAE Lanzen- Samenfliegen				BB: 20 / Dt.: 47 / Eur.: 96 / Ww: 500 Arten	
<i>Chaetolonchaea</i> Czerny, 1934					
<i>brevipilosa</i> Czerny, 1934		+	#		
<i>dasyops</i> (Meigen, 1826)	o	+			
<i>Dasiops</i> Rondani, 1856				<i>Psilolonchaea</i>	
<i>mucronotatus</i> Morge, 1959		#	x	Locus typicus: Berlin	
<i>perpropinquus</i> Morge, 1959		#	#	+	Locus typicus: Berlin
<i>trichosternalis</i> Morge, 1959			x		
<i>Earomyia</i> Zetterstedt, 1842				<i>Spermatolonchaea</i>	

<i>lonchaeoides</i> Zetterstedt, 1848		+		
<i>viridana</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>Lonchaea</i> Fallén, 1820				<i>Tricholonchaea</i>
<i>albitarsis</i> Zetterstedt, 1837		+		
<i>chorea</i> (Fabricius, 1781)	o	+		
<i>contraria</i> Czerny, 1934		+ #		Locus typicus: Brandenburg
<i>laticornis</i> Meigen, 1826		x		
<i>palposa</i> Zetterstedt, 1847		+	x	
<i>peregrina</i> Becker, 1895		+		
<i>scutellaris</i> Rondani, 1874		+		
<i>subneatos</i> a Kovalev, 1974		+		
<i>sylvatica</i> Beling, 1873		+		
<i>tarsata</i> Fallén, 1820	o			?
<i>zetterstedti</i> Becker, 1902		+		
<i>Protearomyia</i> McAlpine, 1962				<i>Priscoearomyia</i>
<i>nigra</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>Setisquamalonchaea</i> Morge, 1963				
<i>fumosa</i> (Egger, 1862)		+		
LONCHOPTERIDAE Lanzettfliegen [Muscidoridae]				BB: 5 / Dt.: 9 / Eur.: 13 / Ww: 45 Arten
<i>Lonchoptera</i> Meigen, 1803				<i>Musidora, Dispa, Lonchopteryx</i>
<i>bifurcata</i> (Fallén, 1810)	o		x	
<i>fallax</i> de Meijere, 1906		+		
<i>lutea</i> Panzer, 1809	o	+	x	
<i>scutellata</i> Stein, 1890		+		
<i>strobli</i> de Meijere, 1906		+		
MEGAMERINIDAE Megameriden [Megameridae]				BB: 1 / Dt.: 1 / Eur.: 1 / Ww: 13 Arten
<i>Megamerina</i> Rondani, 1861				
<i>dolium</i> (Fabricius, 1805)	o	+		
MICROPEZIDAE Stelzfliegen [Tylidae]				BB: 6 / Dt.: 13 / Eur.: 22 / Ww: 450 Arten
<i>Calobata</i> Meigen, 1803				<i>Trepidaria</i>
<i>petronella</i> (Linnaeus, 1761)	o	+		
<i>Micropeza</i> Meigen, 1803				<i>Tylos</i>
<i>corrigiolata</i> (Linnaeus, 1761)	o	+		
<i>lateralis</i> Meigen, 1826	o	+		
<i>Neria</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Calobatella, Compsobata</i>
<i>cibaria</i> (Linnaeus, 1761)	o	+		
<i>commutata</i> (Czerny, 1930)		+		
<i>ephippium</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
MICROPHORIDAE Kleine Tanzfliegen [ehem. zu Empididae]				BB: 1 / Dt.: 6 / Eur.: 16 / Ww: 40 Arten
<i>Microphor</i> Macquart, 1827				<i>Microphorus, Microphora</i>
<i>holosericeus</i> (Meigen, 1804)	o x	+		
MILICHIIDAE Nistfliegen [Phyllomyzidae]				BB: 9 / Dt.: 13 / Eur.: 43 / Ww: 240 Arten
<i>Desmometopa</i> Loew, 1866				<i>Liodesma</i>
<i>m-nigrum</i> (Zetterstedt, 1848)			x	
<i>sordida</i> (Fallén, 1820)		+		
<i>Leptometopa</i> Becker, 1903				<i>Macrurus, Hypaspistomyia, Prodesmometopa, Cnemoplegas, Desmometopina, Dicraeoptera</i>
<i>latipes</i> (Meigen, 1830)	x		+	Locus typicus: Berlin
<i>niveipennis</i> (Strobl, 1900)		x		
<i>Madiza</i> Fallén, 1810				<i>Lobioptera, Cleptoneria, Polphorina</i>
<i>glabra</i> Fallén, 1820	o	+	+	
<i>Neophyllomyza</i> Melander, 1913				<i>Vichyia</i>
<i>acyglossa</i> (Villeneuve, 1920)		x		
<i>Phyllomyza</i> Fallén, 1810				<i>Hendelimyza</i>

<i>equitans</i> (Hendel, 1919)		x		
<i>securicornis</i> Fallén, 1823	o		+	
<i>tetragona</i> Hendel, 1924		x		
MUSCIDAE Echte Fliegen				BB: 208 / Dt.: 317 / Eur.: 572 / Ww: 4.000 Arten
<i>Achanthiptera</i> Rondani, 1856				<i>Sphecolyma</i>
<i>rohrelliformis</i> (Rob.-Desv., 1830)	o	+		
<i>Atherigona</i> Rondani, 1856				<i>Orthostylum</i>
<i>varia</i> (Meigen, 1826)	o			?
<i>Azelia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Atomogaster, Parazelia</i>
<i>aterrima</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>cilipes</i> (Haliday, 1838)		+		
<i>gibbera</i> (Meigen, 1826)	o			?
<i>triquetra</i> (Wiedemann, 1817)	o	+		
<i>zetterstedti</i> Rondani, 1866		+		
<i>Brontaea</i> Kowarz, 1873				<i>Gymnodia, Anaclysta</i>
<i>humilis</i> (Zetterstedt, 1860)		+		
<i>Coenosia</i> Meigen, 1826				<i>Caricea, Hoplogaster, Limosia, Palusia, Allognota, Centriocera, Xanthorrhinia, Rhynchocoenops, Hebdomostilba</i>
<i>agromyzina</i> (Fallén, 1825)	o	+	x	
<i>albicornis</i> Meigen, 1826	o	+		
<i>ambulans</i> Meigen, 1826	o	+	x	
<i>atra</i> Meigen, 1830	x	+		Locus typicus: Berlin
<i>bilineella</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>femoralis</i> (Robineau-Desv., 1830)	o	+		
<i>flavimana</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>humilis</i> Meigen, 1826	o	+		
<i>intermedia</i> (Fallén, 1825)	o	+		
<i>means</i> Meigen, 1826		+		
<i>mollicula</i> (Fallén, 1825)	o	+		
<i>nigridigita</i> Rondani, 1866		+		
<i>paludis</i> Tiensuu, 1939		x		
<i>pedella</i> (Fallén, 1825)	o	+		
<i>perpusilla</i> Meigen, 1826	o	+		
<i>pumila</i> (Fallén, 1825)	o	+		
<i>pygmaea</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>rufipalpis</i> Meigen, 1826		+		
<i>sexmaculata</i> Meigen, 1838		+		
<i>strigipes</i> Stein, 1916		+	x	
<i>testacea</i> (Robineau-Desv., 1830)	o	+	x	
<i>tigrina</i> (Fabricius, 1775)	o	+	x	
<i>trilineella</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>verralli</i> Collin, 1953		+		
<i>Dexiopsis</i> Pokorny, 1893				
<i>ruficornis</i> (Macquart, 1835)		+		
<i>Dichaetomyia</i> Malloch, 1921				
<i>doubleti</i> (Pandellé, 1898)		x		
<i>Drymeia</i> Meigen, 1826				<i>Bebryx, Eriphia, Drymina, Pogonomyia</i>
<i>hamata</i> (Fallén, 1823)	o	+		
<i>tetra</i> (Meigen, 1826)	o	x	x	
<i>vicana</i> (Harris, 1780)		+		
<i>Eudasyophora</i> Townsend, 1911				<i>Dasyphoromima, Rypellia, Dasypyrellia</i>
<i>cyanicolor</i> (Zetterstedt, 1845)			x	
<i>Graphomya</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Curtonevra, Cyrtonevra</i>

<i>maculata</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>Haematobia</i> LePelet. & Serv., 1828				<i>Lyperosia, Siphona, Priophora</i>
<i>irritans</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>titillans</i> (Bezzi, 1907)		+		
<i>Haematobosca</i> Bezzi, 1907				<i>Bdellolarynx, Lyperosiops</i>
<i>stimulans</i> (Meigen, 1824)	o	+	x	
<i>Hebecnema</i> Schnabl, 1889				
<i>umbratica</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>vespertina</i> (Fallén, 1823)	o	+		
<i>Helina</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Spilogaster, Mydina, Aricia, Deiphobia, Yetodesia, Aspilia, Quadrula, Enoplopteryx</i>
<i>allotalla</i> (Meigen, 1830)	o	+		Locus typicus: Berlin
<i>annosa</i> (Zetterstedt, 1838)		x	x	
<i>calceata</i> (Rondani, 1866)		+	x	
<i>calceataeformis</i> (Schnabl, 1911)		+		
<i>celsa</i> (Harris, 1780)	o	+		
<i>ciliatocosta</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>confinis</i> (Fallén, 1825)	o	+	+	
<i>cothurnata</i> (Rondani, 1866)		x		
<i>crinita</i> Collin, 1953		x		
<i>depuncta</i> (Fallén, 1825)		+		
<i>evecta</i> (Harris, 1780)	o	+	x	
<i>fratercula</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>impuncta</i> (Fallén, 1825)	o	+	x	
<i>lasiophthalma</i> (Macquart, 1835)		+	x	
<i>latitarsis</i> Ringdahl, 1924		+	x	
<i>laxifrons</i> (Zetterstedt, 1860)		+		
<i>maculipennis</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>obscurata</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>pertusa</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>protuberans</i> (Zetterstedt, 1845)		x	x	
<i>pubescens</i> Stein, 1893			x	
<i>quadrinotata</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>quadrum</i> (Fabricius, 1805)	o	+	x	
<i>reversio</i> (Harris, 1780)	o	+	x	
<i>sexmaculata</i> (Preyssler, 1791)	o	+		
<i>tetrastigma</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>trivittata</i> (Zetterstedt, 1860)		+		
<i>Hydrotaea</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Lasiops, Blainvilla, Ophyra, Psiloptera, Microcera, Alloenota</i>
<i>aenescens</i> (Wiedemann, 1830)			+	
<i>albipuncta</i> (Zetterstedt, 1845)			x	
<i>armipes</i> (Fallén, 1825)	o	+		
<i>basdeni</i> Collin, 1939		+		
<i>borussica</i> Stein, 1899		x		
<i>capensis</i> (Wiedemann, 1818)	o	x		
<i>cinerea</i> Robineau-Desv., 1830		+		
<i>cyrtoneurina</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>dentipes</i> (Fabricius, 1805)	o	+	x	
<i>diabolus</i> (Harris, 1780)	o	+	x	
<i>glabricula</i> (Fallén, 1825)	o	x		
<i>ignava</i> (Harris, 1780)	o	+	x	
<i>irritans</i> (Fallén, 1823)	o	+	x	
<i>meridionalis</i> Portschinsky, 1882	o	+		

<i>meteorica</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>militaris</i> (Meigen, 1826)			x	
<i>nidicola</i> Malloch, 1925		+		
<i>palaestrica</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>pandellei</i> Stein, 1899		x		
<i>pellucens</i> Portschinsky, 1879		+		
<i>pilipes</i> Stein, 1903		x		
<i>similis</i> Meade, 1887		x		
<i>tuberculata</i> Rondani, 1866			x	
<i>velutina</i> Robineau-Desv., 1830		+		
<i>Limnophora</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Calliophrys, Curculla, Melanochelia, Strobli</i>
<i>maculosa</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>nigripes</i> (Robineau-Desv., 1830)		+		
<i>pollinifrons</i> Stein, 1916		x		
<i>scrupulosa</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>tigrina</i> (Am Stein, 1860)	o	+		
<i>triangula</i> (Fallén, 1825)	o	+		
<i>Lispe</i> Latreille, 1796				<i>Myoda, Discopterna, Blepharopoda, Lispa</i>
<i>caesia</i> Meigen, 1826	o			?
<i>consanguinea</i> Loew, 1858		+	+	
<i>pygmaea</i> (Fallén, 1825)	o	+		
<i>superciliosa</i> Loew, 1861		x		
<i>tentaculata</i> (De Geer, 1776)	o	+		
<i>trivialis</i> Ruthe, 1864	o			?
<i>uliginosa</i> Fallén, 1825	o	+		
<i>Lispocephala</i> Pokorny, 1893				
<i>alma</i> (Meigen, 1826)	o			?
<i>brachialis</i> (Rondani, 1877)	+	+		
<i>erythrocerata</i> (Rob.-Desv., 1830)		+		
<i>fuscitibia</i> Ringdahl, 1944		x		
<i>verna</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>Lophosceles</i> Ringdahl, 1922				
<i>cinereiventris</i> (Zetterstedt, 1845)		x		
<i>Macrorchis</i> Rondani, 1877				
<i>meditata</i> (Fallén, 1825)		x	x	
<i>Mesembrina</i> Meigen, 1826				<i>Hypodermodes</i>
<i>meridiana</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>mystacea</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>Morellia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Alina, Camilla, Dasysterna</i>
<i>aenescens</i> Rob.-Desv., 1830		+		
<i>hortorum</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>simplex</i> (Loew, 1857)			x	
<i>Musca</i> Linnaeus, 1758				<i>Conostoma, Byomya, Plaxemya, Sphora</i>
<i>autumnalis</i> De Geer, 1776	o	+	x+	
<i>domestica</i> Linnaeus, 1758	o	+	x+	
<i>tempevista</i> Fallén, 1817	o	+		Locus typicus für <i>M. nana</i> Meigen: Berlin
<i>Muscina</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Blissonia, Pararicia</i>
<i>levida</i> (Harris, 1780)		+	x	
<i>pascuorum</i> (Meigen, 1826)	o	+	+	
<i>prolapsa</i> (Harris, 1780)	o	+	+	
<i>stabulans</i> (Fallén, 1817)	o	+	+	
<i>Mydaea</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Subphaonia, Xenomydaea</i>
<i>ancilla</i> (Meigen, 1826)	o	+	+	Locus typicus f. <i>A. abominalis</i> Bouche: Berlin
<i>corni</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	

<i>electa</i> (Zetterstedt, 1860)		+		
<i>humeralis</i> Robineau-Desv., 1830		+	x	
<i>lateritia</i> (Rondani, 1866)		+		Locus typicus für <i>M. riedeli</i> Stein: Brandenburg
<i>nebulosa</i> (Stein, 1893)		+		
<i>nubila</i> Stein, 1916		x		
<i>urbana</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>Myospila</i> Rondani, 1856				
<i>meditabunda</i> (Fabricius, 1781)	o	+	x	Locus typicus für <i>M. incurvata</i> Bouché: Berlin
<i>Neomyia</i> Walker, 1859				<i>Orthellia, Cryptolucilia, Euphoria, Cryptolucilaia, Pseudopyrellia</i>
<i>cornicina</i> (Fabricius, 1781)	o	+	+	
<i>viridescens</i> (Rob.-Desv., 1830)		+		
<i>Orchisia</i> Rondani, 1877				
<i>costata</i> (Meigen, 1826)		x		
<i>Phaonia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Dialyta, Fellaea, Trennia, Euphemia, Rohrella, Stagnia, Wahlgreenia</i>
<i>aeneiventris</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>angelicae</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>angulicornis</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>apicalis</i> Stein, 1914		x		Locus typicus: Berlin
<i>atriceps</i> (Loew, 1858)		x		
<i>berolinensis</i> Hennig, 1963		#	x	Locus typicus: Berlin
<i>canescens</i> Stein, 1916		x	x	
<i>cincta</i> (Zetterstedt, 1846)		+	x	
<i>consobrina</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>czernyi</i> Hennig, 1963			x	
<i>errans</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>erronea</i> (Schnabl, 1888)		+		
<i>exoleta</i> (Meigen, 1826)		x		
<i>falleni</i> Michelsen, 1977	o	+		
<i>fuscata</i> (Fallén, 1825)	o	+		
<i>gobertii</i> (Mik, 1881)		+	x	
<i>gracilis</i> Stein, 1916		x		
<i>halterata</i> (Stein, 1893)		+		
<i>hirtifrons</i> Karl, 1940		x		Locus typicus: Brandenburg
<i>hybrida</i> (Schnabl, 1888)		+		
<i>incana</i> (Wiedemann, 1817)	o	+		
<i>laeta</i> (Fallén, 1823)		x	x	
<i>magnicornis</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>mediterranea</i> Hennig, 1963		#	x	
<i>mystica</i> (Meigen, 1823)		+		
<i>nymphaearum</i> (Rob.-Desv., 1830)		+		
<i>pallida</i> (Fabricius, 1787)	o	+	+	
<i>palpata</i> (Stein, 1897)		+		
<i>perdita</i> (Meigen, 1826)	o	+		Locus typicus: Berlin
<i>pratensis</i> (Rob.-Desv., 1830)	o		+	Locus typicus für <i>A. betuleti</i> Bouché: Berlin
<i>profugax</i> (Pandellé, 1899)		x		
<i>pura</i> (Loew, 1873)		x	x	
<i>rufipalpis</i> (Macquart, 1835)		+		
<i>rufiventris</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>serva</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>siebecki</i> (Schnabl, 1911)		+		
<i>steinii</i> (Strobl, 1898)		+	x	
<i>subventa</i> (Harris, 1780)	o	+	+	

<i>trimaculata</i> (Bouché, 1834)		+	x	Locus typicus: Berlin
<i>tuguriorum</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>valida</i> (Harris, 1780)		+		
<i>Polietes</i> Rondani, 1866				<i>Macrosoma, Pseudophaonia, Polietella</i>
<i>domitor</i> (Harris, 1780)	o			?
<i>lardarius</i> (Fabricius, 1781)	o	+	x	
<i>Potamia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Dendrophaonia</i>
<i>littoralis</i> Robineau-Desv., 1830		+	+	Locus typicus für <i>A. querceti</i> Bouché: Berlin
<i>Pseudocoenosia</i> Stein, 1916				<i>Coenosiosoma, Paracoenosia</i>
<i>abnormis</i> Stein, 1916		+		Locus typicus: Berlin
<i>Pyrellia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>rapax</i> (Harris, 1780)	o	+	x	
<i>vivida</i> Robineau-Desvoidy, 1830	o	+	x	
<i>Schoenomyza</i> Haliday, 1833				<i>Litorella</i>
<i>litorella</i> (Fallén, 1823)		+		
<i>Spanochaeta</i> Stein, 1919				
<i>dorsalis</i> (von Roser, 1840)		+		
<i>Spilogona</i> Schnabl, 1911				<i>Limnarcia, Coenosites, Scatocoenosia, Forcepsia, Mydaricia</i>
<i>acrostichalis</i> (Stein, 1916)		+		
<i>baltica</i> (Ringdahl, 1918)		+		
<i>brunneisquama</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>contractifrons</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>denigrata</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>depressula</i> (Zetterstedt, 1845)		x		
<i>dispar</i> (Fallén, 1823)	o	+		
<i>marginifera</i> Hennig, 1959		+	x	
<i>pacifica</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>scutulata</i> (Schnabl, 1911)		x		
<i>surda</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>varsaviensis</i> Schnabl, 1911			x	
<i>veterrima</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>Stomoxys</i> Geoffroy, 1762				<i>Stomoxis</i>
<i>calcitrans</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>Thricops</i> Rondani, 1856				<i>Alloestylus, Hera, Rhynchotrichops, Mydaria, Brachylabis, Syllegopterula, Rhynchopsilops</i>
<i>diaphanus</i> (Wiedemann, 1817)	o	+		
<i>genarum</i> (Zetterstedt, 1838)			x	
<i>longipes</i> (Zetterstedt, 1845)		+		
<i>nigrifrons</i> (Rob.-Desv., 1830)		+		
<i>semicinereus</i> (Wiedemann, 1817)	o	+		Locus typicus für <i>A. apicalis</i> Meigen: Berlin
<i>simplex</i> (Wiedemann, 1817)		+	x	
NEOTTIOPHILIDAE Vogelnestfliegen, Vogelsauger				BB: 1 / Dt.: 1 / Eur.: 2 / Ww: 3 Arten
<i>Neottiophilum</i> Frauenfeld, 1868				
<i>praeustum</i> (Meigen, 1826)		+		
NYCTERIBIDAE Fledermaus(laus)fliegen				BB: 5 / Dt.: 8 / Eur.: 15 / Ww: 270 Arten
<i>Basilia</i> Miranda Ribeiro, 1903				<i>Paracyclopodia</i>
<i>nana</i> Theodor & Moscana, 1954		+	+	
<i>Nycteribia</i> Latreille, 1796				<i>Listropodia, Nycteriphila, Acrocholidia</i>
<i>kolenatii</i> Theodor & Moscana, 1954		+	+	
<i>vexata</i> Westwood, 1835		+		
<i>Penicillidia</i> Kolenati, 1863				<i>Megistopoda</i>
<i>monoceros</i> Speiser, 1900		+	+	
<i>Phthiridium</i> Hermann, 1804				<i>Celeripes, Stylidia</i>

<i>biarticulatum</i> Hermann, 1804		+		Fundort unsicher
ODINIIDAE Baumsaftfliegen				BB: 3 / Dt.: 9 / Eur.: 14 / Ww: 60 Arten
<i>Neoalticomerus</i> Hendel, 1903				
<i>formosus</i> (Loew, 1844)	o	x		
<i>Odinia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Alticomerus</i>
<i>loewi</i> Collin, 1952		x		Locus typicus: Brandenburg
<i>maculata</i> (Meigen, 1830)		+	+	
OESTRIDAE Dasselfliegen, Nasenbremsen				BB: 1 / Dt.: 6 / Eur.: 22 / Ww: 34 Arten
<i>Oestrus</i> Linnaeus, 1758				<i>Cephalomyia, Cephalemyia</i>
<i>ovis</i> Linnaeus, 1758		+		
OPETIIDAE Opetiden [ehem. zu Platypezidae]				BB: 1 / Dt.: 1 / Eur.: 1 / Ww: 3 Arten
<i>Opetia</i> Meigen, 1830				
<i>nigra</i> Meigen, 1830		+		
OPOMYZIDAE Grasfliegen [Geomyzidae]				BB: 12 / Dt.: 15 / Eur.: 33 / Ww: 45 Arten
<i>Geomyza</i> Fallén, 1810				
<i>acutipennis</i> Czerny, 1928		+ #	+	Locus typicus: Berlin
<i>apicalis</i> (Meigen, 1830)	o			Bestimmung unsicher
<i>balachowskyi</i> Mesnil, 1934			+	
<i>breviseta</i> Czerny, 1928		#		Locus typicus: Berlin
<i>combinata</i> (Linnaeus, 1767)	o	+	x	
<i>paganettii</i> (Strobl, 1909)		#		Locus typicus für <i>B. fusca</i> Oldenberg: Berlin
<i>tripunctata</i> Fallén, 1823	o	+	x	
<i>Opomyza</i> Fallén, 1820				<i>Balioptera, Geomyzella</i>
<i>florum</i> (Fabricius, 1794)	o	+	+	
<i>germinationis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>lineatopunctata</i> von Roser, 1840		+		
<i>punctata</i> Haliday, 1833	o			Bestimmung unsicher
<i>punctella</i> Fallén, 1820		+		
OTITIDAE Schmuckfliegen [Orthalidae]				BB: 12 / Dt.: 26 / Eur.: 79 / Ww: 500 Arten
<i>Cephalia</i> Meigen, 1826				<i>Myrmecomyyia</i>
<i>rufipes</i> Meigen, 1826	x			Locus typicus: Berlin
<i>Ceroxys</i> Macquart, 1835				<i>Meckelia</i>
<i>urticae</i> (Linnaeus, 1758)	+	+	x	
<i>Herina</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Tephronota</i>
<i>frondescens</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>oscillans</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>palustris</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>Meliara</i> Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>crassipennis</i> (Fabricius, 1794)	o	+	+	
<i>picta</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>Myennis</i> Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>octopunctata</i> (Coquebert, 1798)		+		
<i>Otiites</i> Latreille, 1804				<i>Heramyia</i>
<i>centralis</i> (Fabricius, 1805)		+		
<i>lamed</i> (Schränk, 1781)	o			Bestimmung unsicher
<i>Seioptera</i> Kirby, 1817				<i>Myodina</i>
<i>vibrans</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>Tetanops</i> Fallén, 1820				
<i>myopina</i> Fallén, 1820	o	+		
PALLOPTERIDAE Zitterfliegen				BB: 9 / Dt.: 16 / Eur.: 23 / Ww: 170 Arten
<i>Palloptera</i> Fallén, 1820				
<i>flava</i> Oldenberg, 1910		#		Locus typicus: Berlin
<i>umbellatarum</i> (Fabricius, 1775)	o	+	+	
<i>ustulata</i> Fallén, 1820	o		+	

<i>Toxoneura</i> Macquart, 1835				
<i>ephippium</i> (Zetterstedt, 1860)			+	
<i>modesta</i> (Meigen, 1830)			+	
<i>muliebris</i> (Harris, 1780)				x
<i>quinquemaculata</i> (Macquart, 1835)			+	
<i>trimacula</i> (Meigen, 1826)	o		+	
<i>usta</i> (Meigen, 1826)			+	
PERISCELIDIDAE Saftfliegen [<i>Somatiidae</i> , <i>Stenomicroidae</i>]				BB: 2 / Dt.: 6 / Eur.: 6 / Ww: 66 Arten
<i>Periscelis</i> Loew, 1858				<i>Myodris</i>
<i>annulata</i> (Fallén, 1813)	o	x		
<i>winnertzi</i> Egger, 1862		x		
PHAEOMYIIDAE Hornfliegen [ehem. zu <i>Sciomyzidae</i>]				BB: 2 / Dt.: 3 / Eur.: 3 / Ww: 3 Arten
<i>Pelidnoptera</i> Rondani, 1856				<i>Phaeomyia</i>
<i>fuscipennis</i> (Meigen, 1830)			+	
<i>nigripennis</i> (Fabricius, 1794)	+ #	+ #		x
PHORIDAE Buckelfliegen				BB: 115 / Dt.: 364 / Eur.: 604 / Ww: 3.000 Arten
<i>Anevrina</i> Lioy, 1864				<i>Aneurina</i>
<i>curvinervis</i> (Becker, 1901)			+	
<i>thoracica</i> (Meigen, 1804)	o	+	+	
<i>urbana</i> (Meigen, 1830)			+	
<i>Borophaga</i> Enderlein, 1924				
<i>agilis</i> (Meigen, 1930)	o			Bestimmung zweifelhaft
<i>carinifrons</i> (Zetterstedt, 1848)			+	
<i>erythrocer</i> a (Meigen, 1830)	o	+		Locus typicus: Berlin
<i>femorata</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>incrassata</i> (Meigen, 1830)			+	
<i>Chaetopleurophora</i> Schmitz, 1922				
<i>bohemanni</i> (Becker, 1901)			+	
<i>erythronota</i> (Strobl, 1892)			+	
<i>spinosissima</i> (Strobl, 1892)			+	
<i>Conicera</i> Meigen, 1830				
<i>dauci</i> (Meigen, 1830)	o	+	x	
<i>similis</i> (Haliday, 1833)			+	x
<i>tibialis</i> Schmitz, 1925				x
<i>Diplonevra</i> Lioy, 1864				<i>Diplonevra</i>
<i>abbreviata</i> (von Roser, 1840)			+	x
<i>concinna</i> (Meigen, 1830)	o	+	x	Locus typicus: Berlin
<i>florea</i> (Fabricius, 1794)			+	x
<i>funeris</i> (Meigen, 1830)				x
<i>glabra</i> (Schmitz, 1927)			+	x
<i>nitidula</i> (Meigen, 1830)			+	x
<i>oldenbergi</i> (Schmitz, 1920)	+	#	x	Locus typicus: Berlin
<i>pachycera</i> (Schmitz, 1918)			+	
<i>Dohrniphora</i> Dahl, 1898				
<i>cornuta</i> (Bigot in de la Sagra, 1857)				x
<i>Gymnophora</i> Macquart, 1835				
<i>arcuata</i> (Meigen, 1830)			+	
<i>quartomollis</i> Schmitz, 1920			+	
<i>Hypocera</i> Lioy, 1864				
<i>mordellaria</i> (Fallén, 1823)	o	+		
<i>Megaselia</i> Rondani, 1856				<i>Plastophora</i>
<i>abdita</i> Schmitz, 1959				x
<i>aculeata</i> (Schmitz, 1919)				x
<i>aequalis</i> (Wood, 1909)			+	

<i>albicaudata</i> (Wood, 1910)		+		
<i>albiclava</i> Schmitz, 1926		+		
<i>alticolella</i> (Wood, 1909)		+		
<i>altifrons</i> (Wood, 1909)		+		
<i>arietina</i> Disney, 1991			x	
<i>armata</i> (Wood, 1909)		+		Locus typicus f. <i>M. riedeli</i> Schmitz: Bandenburg
<i>basispinata</i> (Lundbeck, 1920)		+		
<i>berndseni</i> (Schmitz, 1919)		+		
<i>bovista</i> (Gimmerthal, 1848)		+		
<i>brevicostalis</i> (Wood, 1910)		+		
<i>brunneicornis</i> (Schmitz, 1920)		#		Locus typicus: bei Berlin
<i>campestris</i> (Wood, 1908)		+		
<i>ciliata</i> (Zetterstedt, 1848)	o	+		
<i>collini</i> (Wood, 1909)		+		
<i>conformis</i> (Wood, 1909)		+		
<i>crassicosta</i> (Strobl, 1892)		+		
<i>dahli</i> (Becker, 1901)		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>diversa</i> (Wood, 1909)		+		
<i>emarginata</i> (Wood, 1908)		+		
<i>errata</i> (Wood, 1912)		+		
<i>fenestralis</i> (Schmitz, 1919)		+		
<i>flava</i> (Fallén, 1823)	o	+		
<i>frameata</i> Schmitz, 1927		+		
<i>giraudii</i> (Egger, 1862)	o	+		
<i>glabrifrons</i> (Wood, 1909)		+	x	
<i>gregaria</i> (Wood, 1910)			x	
<i>halterata</i> (Wood, 1910)		+		
<i>hirticrus</i> (Schmitz, 1918)		+		
<i>hortensis</i> (Wood, 1909)		+		
<i>involuta</i> (Wood, 1910)		+		
<i>latericia</i> Schmitz, 1935		+		
<i>latifemorata</i> (Becker, 1901)		+		
<i>lutea</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>major</i> (Wood, 1912)		+		
<i>meconicera</i> (Speiser, 1925)		+		
<i>meigeni</i> (Becker, 1901)		+		
<i>minor</i> (Zetterstedt, 1848)		+		
<i>nasoni</i> (Malloch, 1914)		+		
<i>nigra</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>nigriceps</i> (Loew, 1866)		+		
<i>pleuralis</i> (Wood, 1909)		+	x	
<i>plurispinulosa</i> (Zetterstedt, 1860)		+		
<i>pseudogiraudii</i> (Schmitz, 1920)		x		Locus typicus: Berlin
<i>pulicaria</i> (Fallén, 1823)	o	+	x	
<i>pumila</i> (Meigen, 1830)	o			Bestimmung unsicher
<i>pusilla</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>rubella</i> (Schmitz, 1920)		+		
<i>rubricornis</i> (Schmitz, 1919)		x		Locus typicus: Berlin
<i>rufa</i> (Wood, 1908)		+		
<i>ruficornis</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>rufipes</i> (Meigen, 1804)	o	+	x	
<i>scutellaris</i> (Wood, 1909)		+		
<i>subfuscipes</i> Schmitz, 1935		+		
<i>subpalpis</i> (Lundbeck, 1920)		+		

<i>subpleuralis</i> (Wood, 1909)		+		
<i>subtumida</i> (Wood, 1909)		+		
<i>sulphuripes</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>tumida</i> (Wood, 1909)		+		
<i>variana</i> Schmitz, 1926		+		
<i>woodi</i> (Lundbeck, 1922)		+		
<i>xanthozona</i> (Strobl, 1892)		+		
<i>Metopina</i> Macquart, 1835				
<i>oligoneura</i> (Mik, 1867)		x		
<i>Phalacrotophora</i> Enderlein, 1912				
<i>berolinensis</i> Schmitz, 1920		#		Locus typicus: Berlin
<i>fasciata</i> (Fallén, 1823)		+	x	
<i>Phora</i> Latreille, 1796				
<i>atra</i> (Meigen, 1804)		+	x	
<i>dubia</i> (Zetterstedt, 1848)		+		
<i>edentata</i> Schmitz, 1920		+		
<i>holosericea</i> Schmitz, 1920		+	x	
<i>tincta</i> Schmitz, 1920		+		
<i>velutina</i> Meigen, 1830		+		
<i>Pseudacteon</i> Coquillet, 1907				
<i>formicarum</i> (Verrall, 1877)		+		
<i>Spiniphora</i> Malloch, 1909				
<i>bergenstammi</i> (Mik, 1864)		+		
<i>dorsalis</i> (Becker, 1901)		+		
<i>excisa</i> (Becker, 1901)		x		
<i>maculata</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>Triphleba</i> Rondani, 1856				<i>Citrago</i>
<i>aequalis</i> (Schmitz, 1919)		+		Locus typicus: Brandenburg
<i>autumnalis</i> (Becker, 1901)		x		
<i>dentata</i> Schmitz, 1943		x		Locus typicus: Brandenburg
<i>excisa</i> (Lundbeck, 1921)		x		
<i>hyalinata</i> (Meigen, 1830)			x	
<i>intermedia</i> (Malloch, 1908)		+	x	
<i>luteifemorata</i> (Wood, 1906)		x		
<i>minuta</i> (Fabricius, 1787)		+		
<i>nudipalpis</i> (Becker, 1901)		+		
<i>opaca</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>papillata</i> (Wingate, 1906)		x		
<i>trinervis</i> (Becker, 1901)		+		
PIOPHILIDAE Käsefliegen				BB: 7 / Dt.: 12 / Eur.: 29 / Ww: 85 Arten
<i>Mycetaulus</i> Loew, 1845				
<i>bipunctatus</i> (Fallén, 1823)		+		
<i>Parapiophila</i> McAlpine, 1977				
<i>vulgaris</i> (Fallén, 1820)		+	+	
<i>Piophila</i> Fallén, 1810				
<i>casei</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>Prochyliza</i> Walker, 1849				
<i>nigrimana</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>varipes</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>Protopiophila</i> Duda, 1924				
<i>latipes</i> (Meigen, 1838)		+		
<i>Stearibia</i> Lioy, 1864				
<i>nigriceps</i> (Meigen, 1826)		+		
PIPUNCULIDAE Augenfliegen [Dorylaeidae, Dorilaeidae]				BB: 27 / Dt.: 111 / Eur.: 200 / Ww: 1.200 Arten

<i>Cephalops</i> Fallén, 1810				<i>Beckerias, Semicephalops</i>
<i>aeneus</i> Fallén, 1810	o	+		
<i>semifumosus</i> (Kowarz, 1887)			+	
<i>ultimus</i> (Becker, 1900)			+	
<i>Cephalosphaera</i> Enderlein, 1936				Strandimyza
<i>germanica</i> Aczél, 1940			+	
<i>Chalarus</i> Walker, 1834				<i>Atelenevra</i>
<i>spurius</i> (Fallén, 1816)	o	+		
<i>Clistoabdominalis</i> Skevington, 2001				
<i>ruralis</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>Dorylomorpha</i> Aczél, 1939				<i>Dorlomyia, Dorlomyza, Pipinculina</i>
<i>haemorrhoidales</i> (Zett., 1838)			+	
<i>incognita</i> (Verrall, 1901)			+	
<i>rufipes</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>xanthocera</i> (Kowarz, 1887)			+	
<i>xanthopus</i> (Thomson, 1870)			+	
<i>Eudorylas</i> Aczél, 1949				
<i>fuscipes</i> (Zetterstedt, 1844)			+	
<i>fuscus</i> (Zetterstedt, 1844)			+	
<i>halteratus</i> (Meigen, 1838)	o			Nachweis fraglich
<i>terminalis</i> (Thomson, 1869)			+	
<i>zonatus</i> (Zetterstedt, 1849)			+	x
<i>zonellus</i> Collin, 1956				x
<i>Jassidophaga</i> Aczél, 1939				
<i>villosa</i> (von Roser, 1840)			+	
<i>Nephrocerus</i> Zetterstedt, 1838				
<i>scutellatus</i> (Macquart, 1834)			+	
<i>Pipunculus</i> Latreille, 1802				<i>Dorilias, Microcera</i>
<i>calceatus</i> von Roser, 1840			+	
<i>campestris</i> Latreille, 1802	o	+		
<i>oldenbergi</i> Collin, 1956	+			x Locus typicus: Berlin
<i>spinipes</i> Meigen, 1830	o	+		
<i>varipes</i> Meigen, 1824	o	+		
<i>Tomosvaryella</i> Aczél, 1939				<i>Alloneura</i>
<i>geniculata</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>sylvatica</i> (Meigen, 1824)	o	+		x
<i>Verrallia</i> Mik, 1899				<i>Prothechus, Jassidophaga</i>
<i>aucta</i> (Fallén, 1817)	o			Nachweis fraglich
PLATYPEZIDAE Sohlen- Tummelfliegen [<i>Clythiidae</i>]				BB: 18 / Dt.: 23 / Eur.: 43 / Ww: 250 Arten
<i>Agathomyia</i> Verrall, 1901				
<i>antennata</i> (Zetterstedt, 1819)			+	
<i>falleni</i> (Zetterstedt, 1819)			+	x
<i>sexmaculata</i> (von Roser, 1840)			#	Locus typicus für <i>A. biseta</i> Oldenberg: in Brdbg.
<i>viduella</i> (Zetterstedt, 1838)			+	
<i>Bolopus</i> Enderlein, 1932				<i>Orthovena</i>
<i>furcatus</i> (Fallén, 1826)			x	
<i>Callomyia</i> Meigen, 1804				<i>Cleona, Heteroneura, Callomyza, Calomyia</i>
<i>amoena</i> Meigen, 1824	o	+		
<i>elegans</i> Meigen, 1804	o	+		
<i>speciosa</i> Meigen, 1824			+	
<i>Lindneromyia</i> Kessel, 1965				<i>Plesioclythia</i>
<i>dorsalis</i> (Meigen, 1804)	o	+		
<i>Paraplatypeza</i> Kessel & Maggioncalda, 1968				
<i>atra</i> (Meigen, 1804)	o	+		

<i>Platypeza</i> Meigen, 1803				<i>Clythia</i>
<i>consobrina</i> Zetterstedt, 1844		+		
<i>fasciata</i> Meigen, 1804		+		
<i>Platypezina</i> Wahlgren, 1910				<i>Thrinacola</i>
<i>connexa</i> (Boheman, 1858)		+		
<i>Polyporivora</i> Kessel & Mag., 1968				
<i>boletina</i> (Fallén, 1815)	o	+		
<i>ornata</i> (Meigen, 1838)			x	
<i>picta</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>Protoclythia</i> Kessel, 1949				
<i>modesta</i> (Zetterstedt, 1848)		+		
<i>rufa</i> (Meigen, 1830)		+		
PLATYSTOMATIDAE Breitmaulfliegen [Platystomidae]				BB: 3 / Dt.: 3 / Eur.: 21 / Ww: 1.000 Arten
<i>Platystoma</i> Meigen, 1803				
<i>lugubre</i> (Robineau-Desv., 1830)		+		
<i>seminationis</i> (Fabricius, 1775)	o	+		
<i>Rivellia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>syngenesiae</i> (Fabricius, 1781)	o	+		
PSEUDOPOMYZIDAE Pseudopomyziden				BB: 1 / Dt.: 1 / Eur.: 1 / Ww: 20 Arten
<i>Pseudopomyza</i> Strobl, 1893				<i>Protoborborus, Heluscolia</i>
<i>atrimana</i> (Meigen, 1830)	o			
PSILIDAE Nacktfliegen				BB: 17 / Dt.: 30 / Eur.: 47 / Ww: 170 Arten
<i>Chamaepsila</i> Hendel, 1917				<i>Tetrapsila</i>
<i>atra</i> (Meigen, 1826)	o	x		
<i>bicolor</i> (Meigen, 1826)	o			
<i>gracilis</i> (Meigen, 1826)	o	+		? Locus typicus bei Lindner
<i>nigra</i> (Fallén, 1820)	o	x	x	
<i>nigricornis</i> (Meigen, 1826)	o	x		? Locus typicus bei Lindner
<i>pallida</i> (Fallén, 1820)	o	+		
<i>pectoralis</i> (Meigen, 1826)	o			
<i>rosae</i> (Fabricius, 1794)	o	+	x	
<i>rufa</i> (Meigen, 1826)	o	x		? Locus typicus bei Lindner
<i>Chyliza</i> Fallén, 1820				<i>Dasyna</i>
<i>annulipes</i> Macquart, 1835	o	+		
<i>leptogaster</i> (Panzer, 1798)	o			
<i>Loxocera</i> Meigen, 1803				<i>Platystyla</i>
<i>albiseta</i> (Schrank, 1803)	o	+		
<i>aristata</i> (Panzer, 1801)	o			
<i>fulviventris</i> (Meigen, 1826)	o	x		
<i>sylvatica</i> Meigen, 1826	o	+		
<i>Psila</i> Meigen, 1803				
<i>fimetaria</i> (Linnaeus, 1761)	o	+		
<i>Psilesoma</i> Zetterstedt, 1860				
<i>lefebvrei</i> (Zetterstedt, 1835)		+		
PYRGOTIDAE Pyrgotiden [Doryceridae]				BB: 0 / Dt.: 1 / Eur.: 1 / Ww: 330 Arten
RHAGIONIDAE Schnepfenfliegen [Leptidae, Paleostratiomyiidae]				BB: 19 / Dt.: 35 / Eur.: 85 / Ww: 560 Arten
<i>Chrysopilus</i> Macquart, 1826				<i>Chrysopila</i>
<i>auratus</i> (Fabricius, 1805)	o	+		
<i>aureus</i> (Meigen, 1804)		+		
<i>erythrophthalmus</i> Loew, 1840		+		
<i>luteolus</i> (Fallén, 1814)		+		
<i>nubecula</i> (Fallén, 1814)		+		
<i>splendidus</i> (Meigen, 1820)	o	+		
<i>Ptiolina</i> Zetterstedt, 1842				<i>Eurytion, Tyolina</i>

<i>obscura</i> (Fallén, 1814)		+		
<i>Rhagio</i> Fabricius, 1775				<i>Leptis</i>
<i>annulatus</i> (De Geer, 1776)	o	+		
<i>conspicuus</i> Meigen, 1804		+		
<i>immaculatus</i> (Meigen, 1804)	o			
<i>lineola</i> Fabricius, 1794	o	+	+	
<i>maculatus</i> (De Geer, 1776)		+		
<i>notatus</i> (Meigen, 1820)		+		
<i>scolopaceus</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>strigosus</i> (Meigen, 1804)		+		
<i>tringarius</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>vitripennis</i> (Meigen, 1820)		+		
<i>Symphoromyia</i> v. Frauenfeld, 1867				<i>Paraphoromyia, Sympheromyia</i>
<i>crassicornis</i> (Panzer, [1806])		+		
<i>melaena</i> (Meigen, 1820)	o			
RHINOPHORIDAE Asselfliegen [ehem. zu Tachinidae]				BB: 8 / Dt.: 10 / Eur.: 45 / Ww: 80 Arten
<i>Melanophora</i> Meigen, 1803				<i>Illigeria, Sylvanus</i>
<i>roralis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>Paykullia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Chaetostevenia, Plesina, Parafeburia</i>
<i>maculata</i> (Fallén, 1815)			x	
<i>Phyto</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Savia, Metopisena, Semitachina, Styloneurina, Paramorinia, Metopostena, Protachaeta</i>
<i>melanocephala</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Rhinomorinia</i> Br. & Bergenst., 1889				
<i>sarcophagina</i> (Schiner, 1862)		+		
<i>Rhinophora</i> Robineau-Desv., 1830				
<i>lepida</i> (Meigen, 1824)		+	x	
<i>Stevenia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Ptilocera, Ptilocheta, Trisonevra, Ptiloceroides</i>
<i>atramentaria</i> (Meigen, 1824)	o		x	
<i>umbratica</i> (Fallén, 1820)		+		
<i>Tricogena</i> Rondani, 1856				<i>Trichogena, Frauenfeldia, Talmonia</i>
<i>rubricosa</i> (Meigen, 1824)		+	x	
SARCOPHAGIDAE Fleischfliegen				BB: 80 / Dt.: 130/ Eur.: 309 / Ww: 2.750 Arten
<i>Agria</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Pseudosarcophaga</i>
<i>affinis</i> (Fallén, 1817)	o	+		
<i>mamillata</i> (Pandellé, 1896)		+		
<i>monachae</i> (Kramer, 1908)		+		
<i>Amobia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Pachyophthalmus, Senotainella</i>
<i>signata</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>Angiometopa</i> Br. & Bergenst., 1889				
<i>falleni</i> Pape, 1986		+		
<i>Apodacra</i> Macquart, 1854				
<i>pulchra</i> Egger, 1861			x	
<i>Blaesoxipha</i> Loew, 1917				<i>Acridiophaga, Servaisia, Tephromyia, Listeria, Sphaerogaster, Gesneroides, Locustaevora</i>
<i>erythrura</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>grisea</i> (Meigen, 1826)			+	
<i>lapidosa</i> Pape, 1994		x		
<i>laticornis</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>plumicornis</i> (Zetterstedt, 1859)		+		
<i>pygmaea</i> (Zetterstedt, 1844)		+		Locus typicus <i>B. berlinensis</i> Villeneuve: Bln.
<i>rossica</i> Villeneuve, 1912		+		
<i>Brachicoma</i> Rondani, 1856				<i>Oppia</i>
<i>devia</i> (Fallén, 1820)		+		

<i>Macronychia</i> Rondani, 1859				<i>Theone, Moschusa</i>
<i>agrestis</i> (Fallén, 1810)		+		
<i>griseola</i> (Fallén, 1820)		+		
<i>polyodon</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Metopia</i> Meigen, 1803				<i>Ophelia, Opheliella, Araba, Argarella, Anicia</i>
<i>argentata</i> Macquart, 1850	o			Nachweis fraglich
<i>argyrocephala</i> (Meigen, 1824)	o +	+	+	
<i>campestris</i> (Fallén, 1810)	o +	+		
<i>Miltogramma</i> Meigen, 1803				<i>Hamilia, Dichiracanthia, Stephanodactylum, Euryophyra, Rohdendorfia, Myochronum</i>
<i>germari</i> Meigen, 1824	o +	+		
<i>murina</i> Meigen, 1824		+		
<i>oestracea</i> (Fallén, 1820)	o +	+		
<i>punctata</i> Meigen, 1824	o	+		
<i>rutilans</i> Meigen, 1824		+		
<i>testaceifrons</i> (von Roser, 1840)	o	+		
<i>Oebalia</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Ptychoneura</i>
<i>cylindrica</i> (Fallén, 1810)	o	+		
<i>minuta</i> (Fallén, 1810)		+		
<i>Phrosinella</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Phrosina, Pedimyia, Euhilarella</i>
<i>nasuta</i> (Wied. in Meigen, 1824)		+	x	
<i>Phylloteles</i> Robineau-Desv., 1863				
<i>pictipennis</i> Loew, 1844		+	x	
<i>Pterella</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Setulia, Pseudosphecapata, Prometheomyia</i>
<i>grisea</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Ravinia</i> Robineau-Desvoidy, 1863				
<i>pernix</i> (Harris, 1780)		+	x	
<i>Sarcophaga</i> Meigen, 1826				<i>Belliriomima, Bercaea, Discachaeta, Kramerea, Helicophagella, Heteronychia, Liopygia, Mehria, Liosarcophaga, Hartigia, Mimarhopocnemis, Myorhinia, Pandelleana, Pandelleisca, Robineauella, Rosella, Pierretia, Helicobia, Dasypygia, Sarcotachinella, Thysocnema, Variosella, Phorella</i>
<i>africa</i> (Wiedemann, 1824)	o	+	x	
<i>albiceps</i> Meigen, 1826		+	x	
<i>amita</i> Rondani, 1860		+		
<i>aratrix</i> Pandellé, 1896		+	x	
<i>arcipes</i> Pandellé, 1896			x	
<i>argyrostoma</i> (Rob.-Desv., 1830)			x	
<i>carnaria</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>caerulescens</i> Zetterstedt, 1838		+	x	
<i>clathrata</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>crassimargo</i> Pandellé, 1896		+		
<i>depressifrons</i> Zetterstedt, 1845		+		
<i>dissimilis</i> Meigen, 1826	o	+		
<i>granulata</i> Kramer, 1908		+	x	
<i>haemorrhoea</i> Meigen, 1826	o	+	x	
<i>harpax</i> Pandellé, 1896		+		
<i>incisilobata</i> Pandellé, 1896		+	x	
<i>infixa</i> Böttcher, 1913		+		
<i>lehmanni</i> Mueller, 1922			+	
<i>melanura</i> Meigen, 1826		+	x	
<i>nemoralis</i> Kramer, 1908		+		
<i>nigriventris</i> Meigen, 1826		+		
<i>noverca</i> Rondani, 1860		+		

<i>protuberans</i> Pandellé, 1896		+		
<i>proxima</i> Rondani, 1860			x	
<i>pumila</i> Meigen, 1826		+	x	
<i>schineri</i> Bezzi, 1891		+		
<i>schuetzei</i> Kramer, 1909		+		
<i>sexpunctata</i> (Fabricius, 1805)		+		
<i>similis</i> Meade, 1876		+	x	
<i>sinuata</i> Meigen, 1826		+		
<i>socrus</i> Rondani, 1860		+		
<i>sorrer</i> Pape, 1995			x	
<i>subulata</i> Pandellé, 1896		+	x	
<i>subvicina</i> Rohdendorf, 1937		+	x	
<i>teretirostris</i> Pandellé, 1896		+	x	
<i>tuberosa</i> Pandellé, 1696		+		
<i>vagans</i> Meigen, 1826	o +	+	x	
<i>variegata</i> (Scopoli, 1763)		+	x	
<i>vicina</i> Macquart, 1835		+		
<i>villeneuvei</i> Böttcher, 1912		+		Locus typicus: Berlin
<i>Sarcophila</i> Rondani, 1856				
<i>latifrons</i> (Fallén, 1817)	o	+		
<i>Senotainia</i> Macquart, 1846				<i>Sphixapata, Plionychia, Arrhenopus, Pariogymnia, Poecilonychia</i>
<i>albifrons</i> (Rondani, 1859)		+		
<i>conica</i> (Fallén, 1810)	o	+	+	
<i>Taxigramma</i> Perris, 1852				<i>Hilarella, Heteropterina, Paragusia, Elpigia</i>
<i>elegantula</i> (Zetterstedt, 1848)		+		
<i>heteroneura</i> (Meigen, 1830)	o +	+		
<i>hilarella</i> (Zetterstedt, 1844)	o +			
<i>multipunctata</i> (Rondani, 1859)				Nachweis fraglich
<i>stictica</i> (Meigen, 1830)	o	+		Locus typicus: Berlin
<i>Wohlfahrtia</i> Br. & Bergenst., 1889				<i>Disjunctio, Paraphyto, Bracia, Pandellea</i>
<i>magnifica</i> (Schiner, 1862)		+		
SCATHOPHAGIDAE Dungfliegen [Scatomyzidae, Cordyluridae]				BB: 39 / Dt.: 57 / Eur.: 158 / Ww: 290 Arten
<i>Amaurosoma</i> Becker, 1894				<i>Nanna</i>
<i>articulata</i> Becker, 1894		+		
<i>brevifrons</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>fasciata</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>flavipes</i> (Fallén, 1819)	o	+		
<i>inermis</i> Becker, 1894		+		
<i>longicornis</i> (von Roser, 1840)		+		
<i>nigriventris</i> (Loew, 1864)		+		
<i>puberula</i> Becker, 1894		+		
<i>tibiella</i> (Zetterstedt, 1838)	x	+		
<i>Ceratinostoma</i> Meade, 1885				
<i>ostiorum</i> (Haliday in Curtis, 1832)		+		
<i>Chaetosa</i> Coquillett, 1898				
<i>punctipes</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>Chylizosoma</i> Hendel, 1924				
<i>media</i> (Becker, 1894)		+	+	
<i>vittata</i> (Meigen, 1826)		+	+	Locus typicus von <i>P. paridis</i> Hering: Berlin
<i>Cleigastra</i> Macquart, 1835				<i>Ctnemopogon</i>
<i>apicalis</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>Cordilura</i> Fallén, 1810				<i>Parallelomma, Scoliaphleps, Cordylura, Mosina</i>
<i>albipes</i> (Fallén, 1819)	o	+		

<i>ciliata</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>picipes</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>pubera</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>pudica</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>umbrosa</i> (Loew, 1873)		+		
<i>ustulata</i> (Zetterstedt, 1838)	o			Nachweis fraglich
<i>Gimnomera</i> Rondani, 1867				<i>Gymnomera</i>
<i>dorsata</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>Hydromyza</i> Fallén, 1813				<i>Nupharia</i>
<i>livens</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>Leptopa</i> Zetterstedt, 1838				
<i>filiformis</i> Zetterstedt, 1838		+		
<i>Megaphthalma</i> Becker, 1894				
<i>pallida</i> (Fallén, 1819)	o			
<i>Norellia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Norellisoma, Achantholena</i>
<i>spinimana</i> (Fallén, 1819)	o	+		
<i>spinipes</i> (Meigen, 1826)	o		x	
<i>Phrosia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>albilabris</i> (Fabricius, 1805)		+		
<i>Scathophaga</i> Meigen, 1803				<i>Scopeuma, Scatomyza, Coniosternum, Amina, Pyropa, Scatina, Scopeuma</i>
<i>cineraria</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>furcata</i> (Say, 1823)		+		
<i>inquinata</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>lutaria</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>obscura</i> (Fallén, 1819)	o	+		
<i>scybalaria</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>stercoraria</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>suilla</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>Spaziophora</i> Rondani, 1856				
<i>hydromyzina</i> (Fallén, 1819)	o	+		
<i>Trichopalpus</i> Rondani, 1856				
<i>fraternus</i> (Meigen, 1826)	o	+		
SCENOPINIDAE Fensterfliegen [<i>Omphralidae</i>]				BB: 4 / Dt.: 4 / Eur.: 16 / Ww: 400 Arten
<i>Scenopinus</i> Latreille, 1802				<i>Omphrale, Paromphrale, Lucidomphrale, Atricha, Hypselura, Scaenopius, Astoma, Archiscenopinus, Cona, Omphralosoma</i>
<i>fenestralis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>glabrifrons</i> Meigen, 1824		+	x	
<i>niger</i> (De Geer, 1776)	+			
<i>oldenbergi</i> Kröber, 1913		#		Locus typicus: Berlin
SCIOMYZIDAE Schneckenfliegen [<i>Tetanoceridae</i>]				BB: 68 / Dt.: 78 / Eur.: 139 / Ww: 506 Arten
<i>Anticheta</i> Haliday, 1838				<i>Antichaeta, Heteropteryx</i>
<i>analis</i> (Meigen, 1830)	+	+		
<i>atriseta</i> (Loew, 1849)	o	+	x	
<i>brevipennis</i> (Zetterstedt, 1846)	+	+		
<i>obliviosa</i> Enderlein, 1939		+	x	Locus typicus: Berlin
<i>Colobaea</i> Zetterstedt, 1837				<i>Calobaea, Ctenulus</i>
<i>bifasciella</i> (Fallén, 1820)	o	+	x	
<i>distincta</i> (Meigen, 1830)	o	+	x	Locus typicus: Berlin
<i>pectoralis</i> (Zetterstedt, 1847)	+	+		
<i>punctata</i> (Lundbeck, 1923)		+	x	
<i>Coremacera</i> Rondani, 1856				<i>Statinia</i>
<i>catenata</i> (Loew, 1847)		+		
<i>fabricii</i> Rozkosný, 1981		+		

<i>marginata</i> (Fabricius, 1775)	o	+	x	
<i>Dichetophora</i> Rondani, 1868				<i>Dichaetophora</i>
<i>finlandica</i> Verbeke, 1964	+	+		
<i>obliterata</i> (Fabricius, 1805)	o	+		
<i>Dictya</i> Meigen, 1803				
<i>umbrarum</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>Ditaeniella</i> Sack, 1939				
<i>grisescens</i> (Meigen, 1830)	+	+	x	
<i>Elgiva</i> Meigen, 1838				<i>Hedroneura</i>
<i>cucularia</i> (Linnaeus, 1767)	o	+	x	
<i>solicita</i> (Harris, 1780)	o	+	x	
<i>Euthycera</i> Latreille, 1829				<i>Lunigera</i>
<i>chaerophylli</i> (Fabricius, 1798)	+	+		
<i>fumigata</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>Hydromya</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Hydromyia</i>
<i>dorsalis</i> (Fabricius, 1775)	o	+	x	
<i>Ilione</i> Haliday in Curtis, 1837				<i>Knutsonia</i>
<i>albiseta</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>lineata</i> (Fallén, 1820)	o	+		
<i>Limnia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>paludicola</i> Elberg, 1965	+		x	
<i>unguicornis</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>Pherbellia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Graphomyzina, Ditaenia, Oxytaenia</i>
<i>albocostata</i> (Fallén, 1820)	o	+	x	
<i>annulipes</i> (Zetterstedt, 1846)	o			Nachweis fraglich
<i>argyra</i> Verbeke, 1967	o	+	x	
<i>austera</i> (Meigen, 1830)	o	+	x	
<i>brunnipes</i> (Meigen, 1839)		+	+	
<i>cinerella</i> (Fallén, 1820)	o	+	x	
<i>dorsata</i> (Zetterstedt, 1846)	o	+	x	
<i>dubia</i> (Fallén, 1820)	o	+	x	
<i>griseola</i> (Fallén, 1820)	o	+	x	
<i>limbata</i> (Meigen, 1830)	o			Nachweis fraglich
<i>nana</i> (Fallén, 1820)	o	+	x	
<i>obtusa</i> (Fallén, 1820)		+	x	
<i>pallidicarpa</i> (Rondani, 1868)		+		
<i>pallidiventris</i> (Fallén, 1820)	+	+		
<i>schoenherri</i> (Fallén, 1826)	o	+	x	
<i>scutellaris</i> (von Roser, 1840)				Nachweis fraglich
<i>sordida</i> (Hendel, 1902)	+	+	x	Locus typicus: Berlin
<i>ventralis</i> (Fallén, 1820)	o	+	x	
<i>stackelbergi</i> (Elberg, 1965)	+	+	x	
<i>Pherbina</i> Robineau-Desv., 1830				
<i>coryleti</i> (Scopoli, 1763)		+	x	
<i>intermedia</i> Verbeke, 1948		+		
<i>Psacadina</i> Enderlein, 1939				
<i>verbekei</i> Rozkosný, 1975	+	+	x	
<i>vittigera</i> (Schiner, 1864)	+	+	x	
<i>zerny</i> (Mayer, 1853)	+	+	x	
<i>Pteromicra</i> Liroy, 1864				<i>Dichrochira</i>
<i>angustipennis</i> (Staeger, 1845)		+		
<i>glabricula</i> (Fallén, 1820)	o	+	x	
<i>leucopeza</i> (Meigen, 1838)	+	+	x	
<i>oldenbergi</i> (Hendel, 1902)	+	+	x	Locus typicus: Berlin

<i>pectorosa</i> (Hendel, 1902)		+	x	Locus typicus: Berlin
<i>Renocera</i> Hendel, 1900				
<i>pallida</i> (Fallén, 1820)	+	+	x	
<i>striata</i> (Meigen, 1830)	+	+	x	
<i>Sciomyza</i> Fallén, 1820				<i>Bischofia</i>
<i>dryomyzina</i> Zetterstedt, 1846		+	x	
<i>simplex</i> Fallén, 1820	o	+	x	
<i>testacea</i> Macquart, 1835	o	+	x	
<i>Sepedon</i> Latreille, 1804				
<i>sphegea</i> (Fabricius, 1775)	o	+	x	
<i>spinipes</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>Tetanocera</i> Duméril, 1800				
<i>arrogans</i> Meigen, 1830		+	x	
<i>elata</i> (Fabricius, 1781)	o	+	x	
<i>ferruginea</i> Fallén, 1820	o	+	x	
<i>freyi</i> Stackelberg, 1963			x	
<i>fuscinervis</i> (Zetterstedt, 1838)	+	+		
<i>hyalipennis</i> von Roser, 1840	o	+	x	
<i>montana</i> Day, 1881	+	+	x	
<i>phyllophora</i> Melander, 1920	+	+	x	
<i>robusta</i> Loew, 1847		+	x	
<i>silvatica</i> Meigen, 1830	o	+	x	
<i>Trypetoptera</i> Hendel, 1900				
<i>punctulata</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
SEPSIDAE Schwingfliegen				BB: 19 / Dt.: 31 / Eur.: 48 / Ww: 260 Arten
<i>Meroplius</i> Rondani, 1874				<i>Xenosepsis, Pseudomeroplius</i>
<i>minutus</i> (Wiedemann, 1830)		+		
<i>Nemopoda</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Pseudonemopoda</i>
<i>nitidula</i> (Fallén, 1820)	o	+	x	
<i>pectinulata</i> Loew, 1873		+		
<i>Saltella</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Pandora</i>
<i>sphondylii</i> (Schränk, 1803)	o	+	x	
<i>Sepsis</i> Fallén, 1810				<i>Sepsidomorpha</i>
<i>biflexuosa</i> Strobl, 1893		+		
<i>cynipsea</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>flavimana</i> Meigen, 1826	o	+	x	
<i>fulgens</i> Hoffmannsegg in Meig., 1826		+	x	
<i>nigripes</i> Meigen, 1826	o			Nachweis fraglich
<i>orthocnemis</i> Frey, 1908		+	x	
<i>punctum</i> (Fabricius, 1794)	o	+	+	
<i>violacea</i> Meigen, 1826	o	+	x	
<i>Themira</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Cheligaster, Enicita, Enicomira</i>
<i>annulipes</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>lucida</i> (Staeger in Schiodte, 1844)		+		
<i>minor</i> (Haliday, 1833)		+	x	
<i>nigricornis</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>pusilla</i> (Zetterstedt, 1847)			x	Nachweis fraglich
<i>putris</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>superba</i> (Haliday, 1833)		+		
SPHAEROCERIDAE Kleine Dungfliegen [<i>Borboridae, Cypselidae</i>]				BB: 68 / Dt.: 137 / Eur.: 257 / Ww: 1.370 Arten
<i>Alloborborus</i> Duda, 1923				<i>Trichopoda</i>
<i>pallifrons</i> (Fallén, 1820)	o			Nachweis fraglich
<i>Apteromyia</i> Vimmer, 1929				
<i>claviventris</i> (Strobl, 1909)		+		Locus typicus <i>L. brevispina</i> Dahl: in Brandenburg

<i>Borborillus</i> Duda, 1923				
<i>uncinatus</i> (Duda, 1923)			x	
<i>vitripennis</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>Chaetopodella</i> Duda, 1920				
<i>scutellaris</i> (Haliday, 1836)		+	x	
<i>Coproica</i> Rondani, 1861				<i>Heteroptera, Coprophila</i>
<i>acutangula</i> (Zetterstedt, 1847)		+		
<i>ferruginata</i> (Stenhammar, 1855)			x	
<i>hirticula</i> Collin, 1956			x	
<i>hirtula</i> (Rondani, 1880)		+	x	
<i>lugubris</i> (Haliday, 1836)			x	
<i>pusio</i> (Zetterstedt, 1847)		+		
<i>vagans</i> (Haliday, 1833)		+	x	
<i>Copromyza</i> Fallén, 1810				<i>Trichiaspis, Crumomyia, Fungobia, Lotophila, Speomyia, Borborillus, Alloborborus, Olinea, Richardsia, Apterina, Eriosoma, Saprobius, Cimbometopia, Isogaster, Trichopoda</i>
<i>equina</i> Fallén, 1820	o	+	x	
<i>stercoraria</i> (Meigen, 1830)	o	+	x	
<i>Crumomyia</i> Macquart, 1835				<i>Apterina, Fungobia, Stratioboborus</i>
<i>fimetaria</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>glabrifrons</i> (Meigen, 1830)		+	x	
<i>nigra</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>nitida</i> (Meigen, 1830)	o	+	x	
<i>pedestris</i> (Meigen, 1830)	o	+		
<i>Elachisoma</i> Rondani, 1880				
<i>aterrimum</i> (Haliday, 1833)		+	x	
<i>Gigalimosina</i> Roháček, 1983				
<i>flaviceps</i> (Zetterstedt, 1847)		+	+	
<i>Gonioneura</i> Rondani, 1880				<i>Halidayana</i>
<i>spinipennis</i> (Haliday, 1836)		+		
<i>Ischiolepta</i> Lioy, 1864				<i>Ischiogaster</i>
<i>denticulata</i> (Meigen, 1830)	o	x	x	
<i>pusilla</i> (Fallén, 1820)	o		+	
<i>vaporariorum</i> (Haliday, 1836)		+	+	
<i>Leptocera</i> Olivier, 1813				<i>Rachispoda, Collinella, Rachispoda</i>
<i>breviceps</i> (Stenhammar, 1855)		+		
<i>caenosa</i> (Rondani, 1880)		+	x	
<i>cryptochaeta</i> (Duda, 1918)			x	
<i>fontinalis</i> Fallén, 1826)	o	+	x	
<i>limosa</i> (Fallén, 1820)	o	+	x	
<i>lutosa</i> (Stenhammar, 1855)		+		
<i>nigra</i> Olivier, 1813		+	x	
<i>oldenbergi</i> (Duda, 1918)		#		Locus typicus: Berlin
<i>tuberosa</i> (Duda, 1938)		x		Locus typicus: Berlin
<i>Limosina</i> Macquart, 1835				<i>Trichogaster, Scotophilella, Apteromya</i>
<i>silvatica</i> (Meigen, 1830)	o		x	
<i>Lotophila</i> Lioy, 1864				<i>Olinea, Borborus, Olina</i>
<i>atra</i> (Meigen, 1830)	o	+	x	
<i>Minilimosina</i> Roháček, 1983				<i>Allolimosina, Svarciella</i>
<i>fungicola</i> (Haliday, 1836)		+	x	
<i>v-atrum</i> (Villeneuve, 1917)		x		Locus typicus: bei Berlin
<i>vitripennis</i> (Zetterstedt, 1847)			x	
<i>Norrbomia</i> Papp, 1988				<i>Borborillus</i>
<i>costalis</i> (Zetterstedt, 1847)			x	

<i>Opacifrons</i> Duda, 1918				<i>Pseudocollinella, Spinotarsella</i>
<i>coxata</i> (Stenhammar, 1855)		+		
<i>Opalimosina</i> Roháček, 1983				<i>Dentolimosina, Hackmanina, Pappiella</i>
<i>czernyi</i> (Duda, 1918)		+		
<i>mirabilis</i> (Collin, 1902)			x	
<i>liliputana</i> (Rondani, 1880)		+		
<i>Paralimosina</i> Papp, 1973				
<i>fucata</i> (Rondani, 1880)		+		
<i>Phthitia</i> Enderlein, 1938				<i>Alimosina, Kimosina</i>
<i>longisetosa</i> (Dahl, 1909)		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>Pseudocollinella</i> Duda, 1924				
<i>humida</i> (Haliday, 1836)		+		
<i>Pteremis</i> Rondani, 1856				<i>Stenhammaria, Coprobia</i>
<i>fenestralis</i> (Fallén, 1820)		+	x	
<i>Pullimosina</i> Roháček, 1983				<i>Dahlimosina</i>
<i>dahli</i> (Duda, 1918)		x		Locus typicus: in Brandenburg
<i>heteroneura</i> (Haliday, 1836)		+	x	
<i>moesta</i> (Villeneuve, 1918)			x	
<i>pullula</i> (Zetterstedt, 1847)	o	+	x	
<i>Spelobia</i> Spuler, 1924				<i>Bifronsina, Eulimosina</i>
<i>bifrons</i> (Stenhammar, 1855)	x	+	x	
<i>clunipes</i> (Meigen, 1830)		+	x	
<i>hungarica</i> (Villeneuve, 1917)		+		
<i>luteilabris</i> (Rondani, 1880)		+	x	
<i>ochripes</i> (Meigen, 1830)	x	+		
<i>pappi</i> Roháček, 1983		x		Locus typicus: in Brandenburg
<i>parapusio</i> (Dahl, 1909)		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>pseudonivalis</i> (Dahl, 1909)		x		Locus typicus: in Brandenburg
<i>pseudosetaria</i> (Duda, 1918)		+	x	
<i>rufilabris</i> (Stenhammar, 1855)		+		
<i>simplicipes</i> (Duda, 1925)		+		
<i>Sphaerocera</i> Latreille, 1804				<i>Cypsela, Borborus</i>
<i>curvipes</i> Latreille, 1805	o	+	+	
<i>Telomerina</i> Roháček, 1983				
<i>flavipes</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>Thoracochaeta</i> Duda, 1918				
<i>zosteræ</i> (Haliday, 1833)			x	
<i>Trachypella</i> Duda, 1918				<i>Minuscula, Nudopella, Trachyops</i>
<i>lineafrons</i> (Spuler, 1925)			x	
<i>Xenolimosina</i> Roháček, 1983				
<i>setaria</i> (Villeneuve, 1918)		x		Locus typicus: Berlin
STRATIOMYIDAE Waffnenfliegen				BB: 39 / Dt.: 66 / Eur.: 141 / Ww: 2.600 Arten
<i>Beris</i> Latreille, 1902				<i>Octacantha</i>
<i>chalybata</i> (Forster, 1771)	o		+	
<i>clavipes</i> (Linnaeus, 1767)	o	+		
<i>vallata</i> (Forster, 1771)	o	+		
<i>Chloromyia</i> Duncan, 1837				
<i>formosa</i> (Scopoli, 1763)	o	+	+	
<i>Chorisops</i> Rondani, 1856				<i>Corisops, Chlorisops</i>
<i>tibialis</i> (Meigen, 1820)		+		
<i>Clitellaria</i> Meigen, 1803				<i>Potamida, Ephippium, Chippium</i>
<i>ephippium</i> (Fabricius, 1775)	o +	+	+	
<i>Microchrysa</i> Loew, 1855				<i>Chrysomyia, Clorisoma, Chlorosia, Myochrysa</i>
<i>flavicornis</i> (Meigen, 1822)		+		

<i>polita</i> (Linnaeus, 1758)		+	+	
<i>Nemotelus</i> Geoffroy, 1762				<i>Galeodiotriger, Nemotelinus, Camptopelta</i>
<i>brevirostris</i> Meigen, 1822		+		
<i>nigrinus</i> Fallén, 1817	o	+	+	
<i>pantherinus</i> (Linnaeus, 1758)	o +	+	+	
<i>uliginosus</i> (Linnaeus, 1767)		+		
<i>Neopachygaster</i> Austen, 1901				
<i>meromelaena</i> (Dufour, 1841)		+		
<i>Odontomyia</i> Meigen, 1803				<i>Opseogymnus, Trichacrostyliia, Neuraphanisis, Catatasina, Eulalia, Stratiomyiopsis, Zoniomyia, Orthogoniocera</i>
<i>angulata</i> (Panzer, 1798)	o	+	x	
<i>argentata</i> (Fabricius, 1794)		+	x	
<i>hydroleon</i> (Linnaeus, 1758)		+	x	
<i>ornata</i> (Meigen, 1822)	o	+		
<i>tigrina</i> (Fabricius, 1775)	o +	+	+	
<i>Oplodontha</i> Rondani, 1863				<i>Hoplodonta</i>
<i>viridula</i> (Fabricius, 1775)	o +	+	+	
<i>Oxycera</i> Meigen, 1803				<i>Hermione, Hypoleon, Heteroxycera, Heraclina</i>
<i>fallenii</i> Staeger, 1844		+	x	
<i>leonina</i> (Panzer, 1798)	o	+	x	
<i>meigenii</i> Staeger, 1844		+		
<i>nigricornis</i> Olivier, 1812	o +	+	x	
<i>rara</i> (Scopoli, 1763)		+		
<i>terminata</i> Meigen, 1822		x		
<i>trilineata</i> (Linnaeus, 1767)	o	+	+	
<i>Pachygaster</i> Meigen, 1803				<i>Vappo, Praomyia, Alphapachygaster</i>
<i>atra</i> (Panzer, 1798)	o +	+	+	
<i>leachii</i> (Curtis, 1824)	o	+		
<i>Sargus</i> Fabricius, 1798				<i>Chrysonotus, Chrysochroma, Chrysonotomyia</i>
<i>bipunctatus</i> (Scopoli, 1763)		+		
<i>cuprarius</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>flavipes</i> Meigen, 1822			x	
<i>iridatus</i> (Scopoli, 1763)	o +			
<i>Stratiomys</i> Geoffroy, 1762				<i>Stratiomyia, Stratiotomyia, Hirtea, Hoplomyia, Thyreodontha, Oreomyia</i>
<i>cenisia</i> Meigen, 1822	o +	+		
<i>chamaeleon</i> (Linnaeus, 1758)	o +	+		
<i>concinna</i> Meigen, 1822		+		
<i>equestris</i> Meigen, 1835	o	+		
<i>longicornis</i> (Scopoli, 1763)	o +	+		
<i>potamida</i> Meigen, 1822		+	+	
<i>singularior</i> (Harris, 1776)	o	+	+	
<i>Zabrachia</i> Coquillett, 1901				
<i>minutissima</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
STRONGOPHTALMIIDAE [ehem. zu Tanypezidae]				BB: 0 / Dt.: 1 / Eur.: 2 / Ww: 30 Arten
SYRPHIDAE Schwebfliegen				BB: 303 / Dt.: 440 / Eur.: 829 / Ww: 5.000 Arten
<i>Anasimyia</i> Schiner, 1864				<i>Eurymyia</i>
<i>contracta</i> Claussen & Torp, 1980		+	x	
<i>interpuncta</i> (Harris, 1767)			x	
<i>lineata</i> (Fabricius, 1787)	o	x	x	
<i>lunulata</i> (Meigen, 1822)	o	+		Nachbestimmung notwendig
<i>transfuga</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>Arctophila</i> Schiner, 1860				
<i>bombiformis</i> (Fallén, 1810)				wahrscheinlich vorkommend

<i>superbiens</i> (Müller, 1776)		+	x	
<i>Baccha</i> Fabricius, 1805				<i>Bacchina</i>
<i>elongata</i> (Fabricius, 1775)	o	+	x	Locus typicus für <i>B. klugii</i> Meigen: Berlin
<i>obscuripennis</i> Meigen, 1822		+		
<i>Blera</i> Billberg, 1820				<i>Cynorrhina</i>
<i>fallax</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>Brachymyia</i> Williston, 1882				
<i>berberina</i> (Fabricius, 1805)	o	+	x	
<i>floccosa</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>Brachyopa</i> Meigen, 1822				
<i>bicolor</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>dorsata</i> (Zetterstedt, 1837)	+		x	
<i>grunewaldensis</i> Kassebeer, 2000			x	Locus typicus: Berlin
<i>insensilis</i> Collin, 1939	+	+	x	
<i>maculipennis</i> Thompson, 1980			x	als <i>arcuata</i> in Röder-Sammlung
<i>panzeri</i> Goffe, 1945		+		
<i>pilosa</i> Collin, 1939		+	x	
<i>scutellaris</i> Robineau-Desv., 1843			x	
<i>testacea</i> (Fallén, 1817)		+	x	
<i>Brachypalpoidea</i> Hippa, 1978				
<i>lentus</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>Brachypalpus</i> Macquart, 1834				
<i>laphriformis</i> (Fallén, 1816)	o	+	x	
<i>valgus</i> (Panzer, 1798)	o	+	x	
<i>Callicera</i> Panzer, 1809				
<i>aenea</i> (Fabricius, 1781)			x	
<i>rufa</i> Schummel, 1842		x		
<i>Ceriana</i> Rafinesque, 1815				<i>Ceria</i>
<i>conopsoides</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>Chalcosyrphus</i> Curran, 1925				<i>Xylotina, Xylotodes, Xylotomima, Dimorphoxylota, Syrittoxylota</i>
<i>femoratus</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>nemorum</i> (Fabricius, 1805)	o	+	x	
<i>piger</i> (Fabricius, 1794)	+	+		
<i>valgus</i> (Gmelin, 1790)	+	+	x	
<i>Chamaesyrrhus</i> Mik, 1895				
<i>lusitanicus</i> Mik, 1898	+	+	x	
<i>scaevoides</i> (Fallén, 1817)	o	+		Nachbestimmung notwendig
<i>Cheilisia</i> Meigen, 1822				<i>Cartosyrphus, Nephomyia, Taenochilosa, Dasychilisia</i>
<i>aerea</i> Dufour, 1848	o	x	x	
<i>albipila</i> Meigen, 1838		+	x	
<i>albitarsis</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>antiqua</i> (Meigen, 1822)		+		Nachbestimmung notwendig
<i>barbata</i> Loew, 1857	+	x	x	
<i>bergenstammi</i> Becker, 1894		+	x	
<i>brachysoma</i> Egger, 1860	o		x	
<i>caerulescens</i> (Meigen, 1822)			x	
<i>canicularis</i> (Panzer, 1801)	o	+	x	
<i>carbonaria</i> Egger, 1860	o		x	
<i>chlorus</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>chrysocoma</i> (Meigen, 1822)		x		nur bei Schirmer angegeben
<i>cynocephala</i> Loew, 1840	+	+	x	
<i>flavipes</i> (Panzer, 1798)				wahrscheinlich vorkommend

<i>fraterna</i> (Meigen, 1830)	o	x	x	
<i>frontalis</i> Loew, 1857		+	x	
<i>gigantea</i> (Zetterstedt, 1838)			x	
<i>grossa</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>hercyniae</i> Loew, 1857		x		nur bei Schirmer angegeben
<i>impressa</i> Loew, 1840	o	+	x	
<i>lasiopa</i> Kowarz, 1885		+	x	
<i>latifrons</i> (Zetterstedt, 1843)		+	x	
<i>longula</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>mutabilis</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>nebulosa</i> Verrall, 1871			x	
<i>nigripes</i> (Meigen, 1822)		+		
<i>orthotricha</i> Vujic & Claussen, 1994			+	
<i>pagana</i> (Meigen, 1822)		+	x	
<i>pascuorum</i> Becker, 1894		+	x	
<i>proxima</i> (Zetterstedt, 1843)	o	x	x	
<i>psilophthalma</i> Becker, 1894			x	
<i>pubera</i> (Zetterstedt, 1838)	o	+	x	
<i>ruficollis</i> Becker, 1894			x	
<i>rufimana</i> Becker, 1894		x	x	
<i>scutellata</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>semifasciata</i> Becker, 1894			x	
<i>soror</i> (Zetterstedt, 1843)	o	+		Nachbestimmung notwendig
<i>urbana</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	als <i>praecox</i> in Literatur
<i>variabilis</i> (Panzer, 1798)	o	+	x	
<i>velutina</i> Loew, 1840		x	x	
<i>vernalis</i> (Fallén, 1817)		+	x	
<i>vicina</i> (Zetterstedt, 1849)			x	
<i>vulpina</i> (Meigen, 1822)			x	
<i>Chrysogaster</i> Meigen, 1803				<i>Melanogaster</i>
<i>basalis</i> Loew, 1857		+		Nachbestimmung notwendig
<i>cemiteriorum</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>solstitialis</i> (Fallén, 1817)		+	x	
<i>virescens</i> Loew, 1854	o	+		Locus typicus: Berlin
<i>Chrysotoxum</i> Meigen, 1803				<i>Antiopa</i>
<i>arcuatum</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>bicinctum</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>cautum</i> (Harris, 1776)		+	x	
<i>fasciolatum</i> (De Geer, 1776)	o	+		
<i>festivum</i> (Linnaeus, 1758)		+		Nachbestimmung notwendig
<i>intermedium</i> Meigen, 1822	o	+		
<i>lineare</i> (Zetterstedt, 1819)		+		
<i>octomaculatum</i> Curtis, 1837	o	+		
<i>vernale</i> Loew, 1841	o	+	x	
<i>verralli</i> Collin, 1940	+	+	x	
<i>Criorhina</i> Meigen, 1822				<i>Petheselia</i>
<i>asilica</i> (Fallén, 1816)	o	+	x	
<i>pachymera</i> Egger, 1858	o	+	x	
<i>ranunculi</i> (Panzer, 1804)		+		
<i>Dasysyrphus</i> Enderlein, 1938				<i>Syrphella, Conosyrphus</i>
<i>albostriatus</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>hilaris</i> (Zetterstedt, 1843)	o		x+	
<i>pauxillus</i> (Williston, 1887)			x	
<i>pinastri</i> (De Geer, 1776)	o	+	x	

<i>tricinctus</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>venustus</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>Didea</i> Macquart, 1834				<i>Enica</i>
<i>alneti</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>fasciata</i> Macquart, 1834	o	+	x	
<i>intermedia</i> Loew, 1854	o	+	x	
<i>Doros</i> Meigen, 1803				<i>Bracchiopsis</i>
<i>profuges</i> (Harris, 1780)		+	x	
<i>Epistrophe</i> Walker, 1853				<i>Lagenosyrphus, Eristalosyrphus, Zimaera, Epistrophella</i>
<i>diaphana</i> (Zetterstedt, 1843)		+		stark beschädigt
<i>eligans</i> (Harris, 1780)	o	+	x	
<i>flava</i> Doczkal & Schmid, 1994			x	
<i>grossulariae</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>melanostoma</i> (Zetterstedt, 1843)	o		x	
<i>nitidicollis</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>ochrostoma</i> (Zetterstedt, 1849)		+		
<i>Epistrophella</i> Dusek & Laska, 1967				
<i>euchroma</i> (Kowarz, 1885)		x	x	
<i>Episyrphus</i> Matsumura & Ad., 1917				
<i>balteatus</i> (De Geer, 1776)	o	+	x	
<i>Eristalinus</i> Rondani, 1845				<i>Lathyrphthalmus, Eristalodes, Metalloeristalis</i>
<i>aeneus</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>sepulchralis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>Eristalis</i> Latreille, 1804				<i>Eoseristalis, Tubifera, Elophilus, Helophilus, Eristaloides, Eristalomyia, Eriops</i>
<i>abusiva</i> Collin, 1931		+	x	
<i>alpina</i> (Panzer, 1798)	o	+		
<i>anthophorina</i> (Fallén, 1817)	o	+		
<i>arbustorum</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>horticola</i> (De Geer, 1776)	o	+	x	
<i>interrupta</i> (Poda, 1761)	o	+	x	
<i>intricaria</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>oestracea</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>pertinax</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>picea</i> (Fallén, 1817)			x	
<i>pseudorupium</i> Kanervo, 1938			x	
<i>rupium</i> Fabricius, 1805	o	+	x	
<i>similis</i> Fallén, 1817	o	+	x	
<i>tenax</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>Eumerus</i> Meigen, 1822				<i>Paragopsis</i>
<i>flavitarsis</i> (Zetterstedt, 1843)	+			wahrscheinlich vorkommend
<i>ornatus</i> Meigen, 1822			x	
<i>ovatus</i> Loew, 1848	o	+	x	
<i>sabulonum</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>sogdianus</i> Stackelberg, 1952			x	
<i>strigatus</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>tricolor</i> (Fabricius, 1798)	o		x	
<i>tuberculatus</i> Rondani, 1857	+		x	
<i>Eupeodes</i> Osten-Sacken, 1877				<i>Metasyrphus, Lapposyrphus,</i>
<i>bucculatus</i> (Rondani, 1857)			x	in Literatur als <i>latilunulatus</i>
<i>corollae</i> (Fabricius, 1794)	o	+	x	
<i>lapponicus</i> (Zetterstedt, 1838)		+	x	
<i>latifasciatus</i> (Macquart, 1829)	o	+	x	

<i>lundbecki</i> (Scoot-Ryen, 1946)			x	
<i>luniger</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>nielseni</i> (Dusek & Laska, 1976)			x	
<i>nitens</i> (Zetterstedt, 1843)		+	x	
<i>Fagisyrphus</i> Dusek & Laska, 1967				
<i>cinctus</i> (Fallén, 1817)	o		x	
<i>Ferdinandea</i> Rondani, 1844				<i>Chrysoclamys</i>
<i>cuprea</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>ruficornis</i> (Fabricius, 1775)	o		x	
<i>Helophilus</i> Meigen, 1805				<i>Eurimyia, Eurinomyia, Kirimyia</i>
<i>affinis</i> Wahlberg, 1844		+	x	
<i>hybridus</i> Loew, 1846	o	+	x	
<i>pendulus</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>trivittatus</i> (Fabricius, 1805)	o	+	x	
<i>Heringia</i> Rondani, 1856				<i>Neocnemodon</i>
<i>brevidens</i> (Egger, 1865)		+		
<i>heringi</i> (Zetterstedt, 1843)		+	x	
<i>latitarsis</i> (Egger, 1865)		+		
<i>pubescens</i> (Delucci & Pschorn-Walcher, 1955)			x	
<i>senilis</i> Sack, 1938			x	
<i>verrucula</i> (Collin, 1931)		+		
<i>vitripennis</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>Ischyrosyrphus</i> Bigot, 1882				<i>Karasyrphus</i>
<i>glaucius</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>laternarius</i> (Müller, 1776)	o			Bestimmung unsicher
<i>Lejogaster</i> Rondani, 1857				<i>Liogaster</i>
<i>metallina</i> (Fabricius, 1781)	o	+	x	
<i>tarsata</i> (Megerle in Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>Lejops</i> Rondani, 1857				<i>Liops</i>
<i>vittatus</i> (Meigen, 1822)			x	
<i>Leucozona</i> Schiner, 1860				
<i>lucorum</i> (Linnaeus, 1758)		x	x	
<i>Mallota</i> Meigen, 1822				<i>Zetterstedtia, Bombozelosis, Pseudomallota</i>
<i>cimbiciformis</i> (Fallén, 1817)	o		x	
<i>fuciformis</i> (Fabricius, 1794)	o	+	x	
<i>megilliformis</i> (Fallén, 1817)	o	+		Nachbestimmung notwendig
<i>Megasyrphus</i> Dusek & Laska, 1967				<i>Syrphoides</i>
<i>erraticus</i> (Linnaeus, 1758)		x	x	
<i>Melangyna</i> Verrall, 1901				<i>Stenosyrphus</i>
<i>barbifrons</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>compositarum</i> (Verrall, 1873)		+		
<i>lasiophthalma</i> (Zetterstedt, 1843)	o	+	x	
<i>lucifera</i> Nielsen, 1980			x	
<i>quadrimaculata</i> (Verrall, 1873)			x	
<i>umbellatarum</i> (Fabricius, 1794)	o	+	x	
<i>Melanogaster</i> Rondani, 1857				<i>Chrysogaster</i>
<i>aerosa</i> (Loew, 1843)	+	+	x	
<i>arumplicata</i> (Loew, 1840)				
<i>hirtella</i> (Loew, 1843)			x	
<i>nuda</i> (Macquart, 1829)		+	x	
<i>Melanostoma</i> Schiner, 1860				<i>Psylogaster, Anochailea</i>
<i>dubium</i> (Zetterstedt, 1837)	o	+		Nachbestimmung notwendig
<i>mellinum</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>pumicatum</i> (Meigen, 1838)		+		Nachbestimmung notwendig

<i>scalare</i> (Fabricius, 1794)	o	+	x	
<i>Meligramma</i> Frey, 1946				
<i>cingulata</i> (Egger, 1860)	o	+		Nachbestimmung notwendig
<i>guttata</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>triangulifera</i> (Zetterstedt, 1843)	o	+	x	
<i>Meliscaeva</i> Frey, 1946				
<i>auricollis</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>cinctella</i> (Zetterstedt, 1843)	o	+	x	
<i>Merodon</i> Meigen, 1803				<i>Lampetia, Exmerodon</i>
<i>avidus</i> (Rossi, 1790)	o	+	x	
<i>equestris</i> (Fabricius, 1794)	o	+	x	
<i>Mesembrius</i> Rondani, 1847				
<i>peregrinus</i> (Loew, 1846)		+		
<i>Microdon</i> Meigen, 1803				<i>Aphritis</i>
<i> analis</i> (Macquart, 1842)		x	x	in Literatur unter <i>eggeri</i>
<i>devius</i> (Linnaeus, 1761)		+		
<i>mutabilis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>myrmicae</i> Schönrogge et.al., 2002			x	
<i>Myathropa</i> Rondani, 1845				<i>Myiatropa</i>
<i>florea</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>Myolepta</i> Newman, 1838				<i>Myiolepta, Xylotaeja, Leptomyia</i>
<i>dubia</i> (Fabricius, 18059)	o	+	x	
<i>obscura</i> Becher, 1882)	+		x	
<i>vara</i> (Panzer, 1798)	+	x	x	
<i>Neoscia</i> Williston, 1886				<i>Neosciella, Ascia</i>
<i>interrupta</i> (Meigen, 1822)		+	x	
<i>meticulosa</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
<i>obliqua</i> Coe, 1940			x	
<i>podagrica</i> (Fabricius, 1775)	o	+	x	
<i>tenur</i> (Harris, 1780)		+	x	
<i>Orthonevra</i> Macquart, 1835				<i>Orthoneura, Campeneura</i>
<i>brevicornis</i> (Loew, 1843)	+	+	x	
<i>elegans</i> (Meigen, 1822)	o	+		Nachbestimmung notwendig
<i>erythrogonia</i> (Malm, 1863)	+			Nachweis fraglich
<i>geniculata</i> (Meigen, 1830)	o	+	x	
<i>intermedia</i> Lundbeck, 1916	+	+	x	
<i>nobilis</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>Paragus</i> Latreille, 1804				<i>Pandasyopthalmus</i>
<i>albifrons</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>bicolor</i> (Fabricius, 1794)	o	+	x	
<i>constrictus</i> Simic, 1986			x	
<i>finitimus</i> Goeldlin de Tiefenau, 1971			x	
<i>haemorrhous</i> Meigen, 1822	o	+	x	
<i>majoranae</i> Rondani, 1857		x	x	
<i>tibialis</i> (Fallén, 1817)	o	+	x	
<i>Parasyrphus</i> Matsamura, 1917				<i>Phalacrodira</i>
<i>annulatus</i> (Zetterstedt, 1838)			x	
<i>lineola</i> (Zetterstedt, 1838)			x	
<i>macularis</i> (Zetterstedt, 1843)	o			Bestimmung fraglich
<i>nigratarsis</i> (Zetterstedt, 1843)			x	
<i>punctulatus</i> (Verrall, 1873)		+	x	
<i>vittiger</i> (Zetterstedt, 1838)		+	x	
<i>Parhelophilus</i> Girschner, 1894				
<i>consimilis</i> (Malm, 1863)			x	

<i>frutetorum</i> (Fabricius, 1775)	o	+	x	
<i>versicolor</i> (Fabricius, 1794)	o	x	x	
<i>Pelecocera</i> Meigen, 1822				
<i>tricincta</i> Meigen, 1822	o	+		
<i>Pipiza</i> Fallén, 1810				
<i>austriaca</i> Meigen, 1822	o	+		Nachbestimmung notwendig
<i>bimaculata</i> Meigen, 1822	o	+	x	
<i>fenestrata</i> Meigen, 1822	o			Bestimmung fraglich
<i>festiva</i> Meigen, 1822	o	+	x	
<i>lugubris</i> (Fabricius, 1775)	o	+		Nachbestimmung notwendig
<i>luteitarsis</i> Zetterstedt, 1843		+	x	
<i>noctiluca</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>quadrимaculata</i> (Panzer, 1804)	o	+	x	
<i>Pipizella</i> Rondani, 1856				Pizopsis
<i>annulata</i> (Macquart, 1829)	o		x	
<i>divicoi</i> (Goeldlin deTiefenau, 1974)			x	
<i>viduata</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>virens</i> (Fabricius, 1805)	o	+	x	
<i>Platycleirus</i> Le Peletier & Serville, 1828				<i>Pachysphyria, Platichirus</i>
<i>albimanus</i> (Fabricius, 1781)	o	+	x	
<i>ambiguus</i> (Fallén, 1817)		x	x	
<i>angustatus</i> (Zetterstedt, 1843)		+	x	
<i>clypeatus</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>discimanus</i> Loew, 1871		+	x	
<i>europaeus</i> Goeldlin de Tiefenau, Maybach & Speight, 1990			x	
<i>fulviventris</i> (Macquart, 1829)	o	+	x	
<i>manicatus</i> (Meigen, 1822)	o +		x	
<i>occultus</i> Goeldlin de Tiefenau, Maybach & Speight, 1990			x	
<i>peltatus</i> Meigen, 1822	o	+	x	
<i>perpallidus</i> Verrall, 1901			x	
<i>podagratus</i> (Zetterstedt, 1838)	o	+		Nachbestimmung notwendig
<i>scambus</i> (Staeger, 1843)			x	
<i>scutatus</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>tarsalis</i> (Schummel, 1837)			x	
<i>Psarus</i> Latreille, 1804				
<i>abdominalis</i> (Fabricius, 1794)	o			
<i>Psilota</i> Meigen, 1822				
<i>anthracina</i> Meigen, 1822	o	+	x	
<i>Pyrophaena</i> Schiner, 1860				<i>Cheilosa</i>
<i>granditarsa</i> (Forster, 1771)	o	+	x	
<i>rosarum</i> (Fabricius, 1787)	o	+	x	
<i>Rhingia</i> Scopoli, 1763				
<i>campestris</i> Meigen, 1822	o	+	x	
<i>rostrata</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		Nachbestimmung notwendig
<i>Scaeva</i> Fabricius, 1805				<i>Lasiopthicus, Cataboma</i>
<i>pyrastris</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>selenitica</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>Sericomyia</i> Meigen, 1803				<i>Cinxia, Sericomyza, Bulboscriba</i>
<i>lappona</i> (Linnaeus, 1758)		+	x	
<i>silentis</i> (Harris, 1776)	o	+		
<i>Sphaerophoria</i> Le Pel. & Serville, 1828				<i>Melitrophus, Melithrepus, Neosyrphus</i>
<i>batava</i> Goeldlin de Tiefenau, 1974		+	x	
<i>interrupta</i> (Fabricius, 1805)	o	+		in Literatur als <i>menthastri</i>
<i>loewi</i> Zetterstedt, 1843	o	+		

<i>philantha</i> (Meigen, 1822)		+	x	
<i>ruepelli</i> (Wiedemann, 1830)	o	+	x	
<i>scripta</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>taeniata</i> (Meigen, 1822)	o	+	x	
<i>virgata</i> Goeldlin de Tiefenau, 1974			x	
<i>Sphegina</i> Meigen, 1822				<i>Asiosphengina</i>
<i>clunipes</i> (Fallén, 1816)	o	+	x	
<i>elegans</i> Schummel, 1843			x	
<i>Sphiximorpha</i> Rondani, 1850				<i>Cerionides, Sphecomorpha, Sphiximorpha</i>
<i>subsessilis</i> (Illiger in Rossi, 1807)	o		x	
<i>Spilomyia</i> Meigen, 1803				
<i>diophthalma</i> (Linnaeus, 1758)	+	+		
<i>manicata</i> (Rondani, 1865)	+	+		
<i>saltuum</i> (Fabricius, 1794)		+		Nachbestimmung notwendig
<i>Syritta</i> Le Pelet. & Serville, 1828				<i>Coprina, Xylota</i>
<i>pipiens</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>Syrphus</i> Fabricius, 1775				<i>Syrphidis</i>
<i>ribesii</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>torvus</i> Osten-Sacken, 1875		+	x	
<i>vitripennis</i> Meigen, 1822	o	+	x	
<i>Temnostoma</i> Le Peletier & Serville, 1828				<i>Tritonia, Microrhinchus</i>
<i>apiforme</i> (Fabricius, 1794)			x	
<i>bombylans</i> (Fabricius, 1805)			x	
<i>vespiforme</i> (Linnaeus, 1758)		x	x	
<i>Trichopsomyia</i> Williston, 1888				<i>Parapenium</i>
<i>flavitaris</i> (Meigen, 1822)	+	+		
<i>joratensis</i> Goeldlin de Tiefenau, 1997		+	x	
<i>Triglyphus</i> Loew, 1840				
<i>primus</i> Loew, 1840		+	x	
<i>Tropidia</i> Meigen, 1822				<i>Milesiformis</i>
<i>scita</i> (Harris, 1780)	o	+	x	
<i>Volucella</i> Geoffroy, 1762				<i>Pterocera, Cenogaster, Temnocera</i>
<i>bombylans</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>inanis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>inflata</i> (Fabricius, 1794)	o			Bestimmung fraglich
<i>pellucens</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>zonaria</i> (Poda, 1761)	o	+	x	
<i>Xanthandrus</i> Verrall, 1901				<i>Hiratana</i>
<i>comtus</i> (Harris, 1780)	o	+	x	
<i>Xanthogramma</i> Schiner, 1860				<i>Olbiosyrphus, Philhelius</i>
<i>citrofasciatum</i> (De Geer, 1776)		+	x	
<i>festivum</i> (Linnaeus, 1758)	o	x	x	
<i>laetum</i> (Fabricius, 1794)	+	x		
<i>pedissequum</i> (Harris, 1776)	o		x	
<i>Xylota</i> Meigen, 1822				<i>Zelina, Eumeros, Heliophilus, Micraptooma</i>
<i>abiens</i> Meigen, 1822		x	x	
<i>coeruleiventris</i> Zetterstedt, 1838		+		Nachbestimmung notwendig
<i>florum</i> (Fabricius, 1805)	o	+	x	
<i>ignava</i> (Panzer, 1798)	o	+	x	
<i>segnis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>sylvarum</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>tarda</i> Meigen, 1822	o		x	
TABANIDAE Bremsen				BB: 34 / Dt.: 58 / Eur.: 213 / Ww: 3.500 Arten
<i>Atylotus</i> Osten-Sacken, 1876				<i>Ochrops, Surcoufiella, Baikalia, Dasystypia</i>

<i>fulvus</i> (Meigen, 1804)	o	+		
<i>plebeius</i> (Fallén, 1817)		+		
<i>rusticus</i> (Linnaeus, 1767)	o	+		
<i>Chrysops</i> Meigen, 1803				<i>Turanochrysops, Petersenichrysops, Pseudochrysops</i>
<i>caecutiens</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>divaricatus</i> Loew, 1858		+	+	
<i>relictus</i> Meigen, 1820	o	+	+	
<i>rufipes</i> Meigen, 1820	o	+		
<i>sepulcralis</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>viduatus</i> (Fabricius, 1794)	o	+	+	
<i>Haematopota</i> Meigen, 1803				Chrysozona
<i>crassicornis</i> Wahlberg, 1848	+			
<i>pluvialis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	+	
<i>Heptatoma</i> Meigen, 1803				<i>Hexatoma</i>
<i>pellucens</i> (Fabricius, 1767)	o	+	+	
<i>Hybomitra</i> Enderlein, 1922				<i>Thylostypina, Didymops, Sipala, Aplococera</i>
<i>bimaculata</i> (Macquart, 1826)		+	+	
<i>borealis</i> (Fabricius, 1781)	o	+		
<i>cirueai</i> (Seguy, 1937)			+	
<i>distinguenda</i> (Verrall, 1909)		+	+	
<i>lundbecki</i> Lyneborg, 1959		+		
<i>lurida</i> (Fallén, 1817)	o	+		
<i>montana</i> (Meigen, 1820)		+		
<i>muehfeldi</i> (Brauer, 1880)		+	+	
<i>tarandina</i> (Linnaeus, 1758)		x		
<i>tropica</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>Philipomyia</i> Olsufjev, 1964				
<i>aprica</i> (Meigen, 1820)		+		
<i>Tabanus</i> Linnaeus, 1758				<i>Phyrta, Styporhamphis, Hybostraba</i>
<i>autumnalis</i> Linnaeus, 1761	o	+		
<i>bovinus</i> Linnaeus, 1758	o	+	+	
<i>bromius</i> Linnaeus, 1758	o	+	+	
<i>cordiger</i> Meigen, 1820	o			
<i>glaucoptis</i> Meigen, 1820	o	+		
<i>maculicornis</i> Zetterstedt, 1842		+		
<i>miki</i> Brauer, 1880	+			
<i>quatuornotatus</i> Meigen, 1820		+		
<i>spodopterus</i> Meigen, 1820		+		
<i>sudeticus</i> Zeller, 1842	o	+		
TACHINIDAE Raupenfliegen [Larvaevoridae]				BB: 298 / Dt.: 502 / Eur.: 877 / Ww: 8.000 Arten
<i>Acemya</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Acomyia, Onuxicera, Agculocera, Acylocera</i>
<i>acuticornis</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>rufitibia</i> (von Roser, 1840)		+		
<i>Actia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Thryptocera, Gymnophthalma, Gymnopareia</i>
<i>crassicornis</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>dubitata</i> Herting, 1971		+		
<i>lamia</i> (Meigen, 1838)		+		
<i>nudibasis</i> Stein, 1924		+		Locus typicus: in Brandenburg
<i>pilipennis</i> (Fallén, 1810)	o +	+		
<i>Admontia</i> Br. & Bergenst., 1889				<i>Trichopareira, Trichoparia, Gravenhorstia</i>
<i>blanda</i> (Fallén, 1820)	o +	+	x	
<i>seria</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Anthomyiopsis</i> Townsend, 1916				<i>Ptilopsina</i>
<i>nigrisquamata</i> (Zetterstedt, 1838)		+		

<i>Aphria</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Rhynchosia, Cottila, Olivieria, Eudemoticus, Plagiopsis, Euplagiopsis</i>
<i>longilingua</i> Rondani, 1861		+		
<i>longirostris</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Aplomya</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Aplomyia, Wiedemanniomyia</i>
<i>confinis</i> (Fallén, 1820)	+	+		
<i>Appendicia</i> Stein, 1924				
<i>truncata</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>Athrycia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Athricia, Atrichia, Paraplagia, Blepharigena</i>
<i>curvinervis</i> (Zetterstedt, 1844)	o	+		
<i>trepida</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>Atylomyia</i> Brauer, 1898				
<i>loewi</i> Brauer, 1898		+		
<i>Bactromyia</i> Br. & Bergenst., 1891				<i>Meigeniopsis, Parathryptocera</i>
<i>aurulenta</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>Baumhaueria</i> Meigen, 1838				<i>Leichenor, Pachycephala, Aguilarina</i>
<i>goniaeformis</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>Belida</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Aporotachina</i>
<i>angelicae</i> (Meigen, 1824)	+			
<i>Bessa</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Ephyra, Hubertia, Lilaea, Myrsina, Osmina, Thalpia, Prosopodes, Ptychomyia</i>
<i>parallela</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>selecta</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Besseria</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Wahlbergia, Anepsia, Phanosoma, Apostrophus, Apostrophusia</i>
<i>dimidiata</i> (Zetterstedt, 1844)		+		
<i>melanura</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>Billaea</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Homalogaster, Siristoma, Arenia, Asbella, Nicaea, Atropidomyia, Homalostoma, Gymnodexia, Gymnobasis, Paraprosena, Rhynchodina, Tropidomyia, Myxodexia</i>
<i>irrorata</i> (Meigen, 1826)		x		
<i>pectinata</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>triangulifera</i> (Zetterstedt, 1844)	+			
<i>Bithia</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Rhinotachina, Cynthia, Sarcobia, Sesiophaga, Hystrichoneura</i>
<i>demotica</i> (Egger, 1861)		+		
<i>geniculata</i> (Zetterstedt, 1844)		+		
<i>Blepharipa</i> Rondani, 1856				<i>Ugimyia, Crossocosmia, Hertingia</i>
<i>pratensis</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>schineri</i> (Mesnil, 1939)		+		
<i>Blepharomyia</i> Br. & Bergenst., 1889				
<i>angustifrons</i> Herting, 1971		+		
<i>pagana</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>piliceps</i> (Zetterstedt, 1859)			x	
<i>Blondelia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Gervaisia, Schaumia, Spinolia, Lophyromyia</i>
<i>inclusa</i> (Hartig, 1838)		+		
<i>nigripes</i> (Fallén, 1810)	o	+	x	
<i>Bothria</i> Rondani, 1856				<i>Chariclea</i>
<i>frontosa</i> (Meigen, 1824)	o			
<i>Brachicheta</i> Rondani, 1861				<i>Brachychaeta, Desvoidia</i>
<i>strigata</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Brullaea</i> Rob.-Desvoidy, 1863				
<i>ocypteroidea</i> Rob.-Desv., 1863			x	
<i>Campylocheta</i> Rondani, 1859				<i>Campylochaeta, Elpe, Gaedartia, Hypochaeta</i>

<i>fuscinervis</i> (Stein, 1924)		+	x	Locus typicus: Berlin
<i>inepta</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>similis</i> Ziegler & Shima, 1996			x	
<i>praecox</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Carcelia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Euryclea, Calocarcelia, Cargilla, Chaetolyga, Parexorista, Chaetomyia, Pelmatomyia, Isocarcelia, Girschneria</i>
<i>falenaria</i> (Rondani, 1859)		+		
<i>gnava</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>kowarzi</i> Villeneuve, 1912		+		
<i>laxifrons</i> Villeneuve, 1912	+			
<i>lucorum</i> (Meigen, 1824)	o			
<i>puberula</i> Mesnil, 1941	+			
<i>rasa</i> (Macquart, 1849)		+		
<i>tibialis</i> (Robineau-Desv., 1863)		+		
<i>Catharosia</i> Rondani, 1868				<i>Alithophasia</i>
<i>pygmaea</i> (Fallén, 1815)	o	+		
<i>Ceranthia</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Asiphona</i>
<i>abdominalis</i> (Rob.-Desv., 1830)				
<i>tenuipalpis</i> (Villeneuve, 1921)			x	Locus typicus: Berlin
<i>Ceromasia</i> Rondani, 1856				<i>Edesia, Loevia</i>
<i>rubrifrons</i> (Macquart, 1834)		+		
<i>Ceromya</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Ceromyia, Stenoparia</i>
<i>bicolor</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>flaviceps</i> (Ratzeburg, 1844)		+		
<i>flaviseta</i> (Villeneuve, 1921)		+		Locus typicus: Berlin
<i>silacea</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>Chetogena</i> Rondani, 1856				<i>Chaetogena, Sproggoza, Salia, Eggeria, Ammobia, Stomatomyia, Rhinometopia</i>
<i>obliquata</i> (Fallén, 1810)		+	x	
<i>tschorsnigi</i> Ziegler, 1999		+		
<i>Cinochira</i> Zetterstedt, 1845				
<i>atra</i> Zetterstedt, 1845		+		
<i>Cistogaster</i> Latreille, 1829				
<i>globosa</i> (Fabricius, 1775)	o +	+		
<i>Clairvillia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Phanemya, Phaniomyia</i>
<i>biguttata</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Clemelis</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Tritochaeta</i>
<i>pullata</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Cleonice</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Steiniella, Steinia</i>
<i>callida</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Clytiomya</i> Rondani, 1861				<i>Clytiomyia, Clytia, Clytiophasia</i>
<i>continua</i> (Panzer, 1798)	o	+		
<i>Compsilura</i> Bouché, 1834				<i>Doria, Machaeraea, Machaira, Machaera</i>
<i>concinata</i> (Meigen, 1824)	o +	+	x	
<i>Cyzenis</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Monochaeta, Bavaria</i>
<i>albicans</i> (Fallén, 1810)		+		
<i>Cylindromyia</i> Meigen, 1803				<i>Calocyptera, Neocyptera, Ocypterula, Aubaea, Exogaster, Plesiocyptera, Conopisoma, Ocyptera, Gerocyptera, Neocyptera, Parthenia, Elaphroptera, Partheniella, Ocypteryx</i>
<i>auriceps</i> (Meigen, 1838)	+	+	x	
<i>brassicaria</i> (Fabricius, 1775)	o	+	+	
<i>brevicornis</i> (Loew, 1844)		+		
<i>interrupta</i> (Meigen, 1824)	o +	+		

<i>pusilla</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>Cyrtophleba</i> Rondani, 1856				<i>Stackelbergua</i>
<i>ruricola</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Demoticus</i> Macquart, 1854				
<i>plebejus</i> (Fallén, 1810)		+		
<i>Dexia</i> Meigen, 1826				<i>Dexilla, Ida, Calotheresia, Eomyceropsis</i>
<i>rustica</i> (Fabricius, 1775)	o +	+		
<i>vacua</i> (Fallén, 1817)	o	+		
<i>Dexiosoma</i> Rondani, 1856				
<i>caninum</i> (Fabricius, 1781)	+	+		
<i>Dinerea</i> Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>carinifrons</i> Fallén, 1817)	o +	+		
<i>ferina</i> (Fallén, 1817)	o +	+	x	
<i>grisescens</i> (Fallén, 1817)	o +	+	x	
<i>Diplostichus</i> Br. & Bergenst., 1889				
<i>janitrix</i> (Hartig, 1838)		+		
<i>Drino</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Argyrophylox, Zygobothria, Gyrovaga</i>
<i>galii</i> (Br. & Bergenstamm, 1891)		+	x	
<i>inconspicua</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>lota</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>vicina</i> (Zetterstedt, 1849)		+		
<i>Dufouria</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Ptilops, Calyptidia, Phericia, Silbermannia</i>
<i>chalybeata</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>nigrita</i> (Fallén, 1810)	o	+		
<i>occlusa</i> (Robineau-Desv., 1863)		+		
<i>Ectophasia</i> Townsend, 1912				
<i>crassipennis</i> (Fabricius, 1794)	+	+		
<i>oblonga</i> (Robineau-Desv., 1830)		+		
<i>Elfia</i> Robineau-Desvoidy, 1850				<i>Craspedothrix, Phytomyzoneura</i>
<i>cingulata</i> (Rob.-Desv., 1830)		+	+	
<i>zonella</i> (Zetterstedt, 1844)			+	
<i>Eliozeta</i> Rondani, 1856				<i>Heliozeta, Phanigaster, Chryseria</i>
<i>pellucens</i> (Fallén, 1820)	o +	+	x	
<i>Eloceria</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Helocera, Cerophora, Stauferia</i>
<i>delecta</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Elodia</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Westwoodia, Pentamyia</i>
<i>ambulatoria</i> (Meigen, 1824)		x		
<i>morio</i> (Fallén, 1820)		+		
<i>Entomophaga</i> Liroy, 1864				
<i>nigrohalterata</i> (Villeneuve, 1921)		+		
<i>Epicamponera</i> Macquart, 1849				
<i>succincta</i> (Meigen, 1824)			x	
<i>Eriothrix</i> Meigen, 1803				<i>Olivieria, Telones, Rhynchista, Proboscina</i>
<i>argyreatus</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>prolixa</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>rufomaculatus</i> (De Geer, 1776)	o +	+		
<i>Erycia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Eurythia</i>
<i>fatua</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>festinans</i> (Meigen, 1824)	o	x		
<i>furibunda</i> (Zetterstedt, 1844)		+		
<i>Erycilla</i> Mesnil, 1957				<i>Erycina</i>
<i>ferruginea</i> (Meigen, 1824)		x		
<i>Erynnia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Vanzemia</i>
<i>ocyperata</i> (Fallén, 1810)		+		

<i>Erythrocer</i> Robineau-Desv., 1848				<i>Curtisia, Paranaeera, Pexomyia</i>
<i>nigripes</i> (Robineau-Desv., 1830)		+		
<i>Estheria</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Dexiomorpha, Myostoma, Syntomocera, Dolichodexia, Paramyostoma, Parestheria</i>
<i>bohemani</i> (Rondani, 1862)		+		
<i>petiolata</i> (Bonsdorff, 1866)		+		
<i>picta</i> (Meigen, 1826)	o +	+		
<i>Eumea</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Epimasicera</i>
<i>linearicornis</i> (Zetterstedt, 1844)		+	x	
<i>mitis</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>Eurithia</i> Robineau-Desv., 1844				<i>Hemimasicera, Erigone, Varichaeta</i>
<i>anthophila</i> (Rob.-Desv., 1830)	o +	+		
<i>connivens</i> (Zetterstedt, 1844)		+		
<i>consobrina</i> (Meigen, 1824)	o +	+		
<i>intermedia</i> (Zetterstedt, 1844)		+		
<i>vivida</i> (Zetterstedt, 1838)	o +	+		
<i>Eurysthaea</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Discochaeta, Caenis</i>
<i>scutellaris</i> (Rob.-Desv., 1848)		+		
<i>Exorista</i> Meigen, 1803				<i>Guerinia, Podotachina, Tricolyyga, Marsiellia, Larvaevora, Cleodora, Eribea, Futilia, Adenia, Gaubilia, Walkeria, Zelleria, Acromera, Zetterstedtia, Chaetotachina, Eutachina, Microtachina, Pokornia, Scottiell, Ptilotachina, Fauniodes, Exoristella, Spixomyia</i>
<i>fasciata</i> (Fallén, 1820)		+		
<i>grandis</i> (Zetterstedt, 1844)		+		
<i>larvarum</i> (Linnaeus, 1758)	o +	+		
<i>mimula</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>rustica</i> (Fallén, 1810)		+	+	
<i>Fausta</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Echinosoma</i>
<i>nemorum</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Freraea</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Gymnopeza, Gymnophania</i>
<i>gagatea</i> Robineau-Desv., 1830	+			
<i>Frontina</i> Meigen, 1838				
<i>laeta</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>Gastrolepta</i> Rondani, 1862				<i>Medoria</i>
<i>anthracina</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>Germaria</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Illigera, Atracochaeta, Atracogonia</i>
<i>angustata</i> (Zetterstedt, 1844)			x	
<i>ruficeps</i> (Fallén, 1820)	o			
<i>Gonia</i> Meigen, 1803				<i>Salmacia, Reaumuria, Redia, Pissemya</i>
<i>capitata</i> (De Geer, 1776)	o	+	x	
<i>distinguenda</i> Herting, 1963		+		
<i>divisa</i> Meigen, 1826	o +	+	+	
<i>ornata</i> Meigen, 1826		+		
<i>picea</i> (Robineau-Desv., 1830)	o +	+		
<i>Graphogaster</i> Rondani, 1868				<i>Pseudalophora, Anurogyna, Paracyrilla, Parahyria</i>
<i>brunnescens</i> Villeneuve, 1907		x		Locus typicus: Berlin
<i>Gymnocheta</i> Rob.-Desvoidy, 1830				<i>Gymnochaeta, Dasyma, Chrysocosmius, Chrysosoma</i>
<i>viridis</i> (Fallén, 1810)	+	+		
<i>Gymnosoma</i> Meigen, 1803				<i>Rhodogyne, Stylogymnomyia</i>
<i>clavatum</i> (Rohdendorf, 1947)		+		
<i>costatum</i> (Panzer, 1800)	o	+		
<i>dolycoridis</i> Dupuis, 1961		+	x	
<i>nitens</i> Meigen, 1824		+		

<i>rotundatum</i> (Linnaeus, 1758)	o +	+	+	
<i>Hebia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>flavipes</i> Robineau-Desv., 1830		+	x	
<i>Hemyda</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Phania, Evibrissa, Euphania</i>
<i>vittata</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Huebneria</i> Robineau-Desv., 1847				<i>Celea, Cnossia, Parexoristina</i>
<i>affinis</i> (Fallén, 1810)	o +	+		
<i>Istocheta</i> Rondani, 1859				<i>Isochaeta, Hyperecteina, Urophylloides, Fallenia, Haydaea, Hyperecteina, Latigena</i>
<i>cinerea</i> (Macquart, 1850)		x		
<i>hemichaeta</i> (Brauer & Brgst., 1889)		+		
<i>longicornis</i> (Fallén, 1810)		+		
<i>Kirbya</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Clista</i>
<i>moerens</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>unicolor</i> Villeneuve, 1927		+		
<i>Klugia</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Ptilopareia</i>
<i>marginata</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>Lecanipa</i> Rondani, 1859				<i>Lecanipus, Amphichaeta</i>
<i>bicincta</i> (Meigen, 1824)		+	x	
<i>Leiophora</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Arrhinomyia, Microptera, Apathelia, Apathelina</i>
<i>innoxia</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Leskia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Pyrrisia (Pyrosia, Pyyhosia)</i>
<i>aurea</i> (Fallén, 1820)		+		
<i>Leucostoma</i> Meigen, 1803				<i>Clelia, Psalida, Pseudoleucostoma</i>
<i>simplex</i> (Fallén, 1815)	o +	+		
<i>Ligeria</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Anachaetopsis, Brachycoelia</i>
<i>angusticornis</i> (Loew, 1847)			x	
<i>Linnaemya</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Linnaemyia, Bonellinyia, Homoeonychia, Ophina, Micropalpis, Bonnetia, Amphisa, Elachipalpus, Leptoceromyia</i>
<i>comta</i> (Fallén, 1810)	+	+		
<i>haemorrhoidalis</i> (Fallén, 1810)	o	x		
<i>impudica</i> (Rondani, 1859)		+		
<i>picta</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>tessellans</i> Rob.-Desv., 1830		+		
<i>vulpina</i> (Fallén, 1810)	o	+		
<i>Loewia</i> Egger, 1856				<i>Thrychogena, Fortisia</i>
<i>foeda</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>phaeoptera</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>Lomachantha</i> Rondani, 1859				<i>Lomachantha</i>
<i>parra</i> Rondani, 1859		+		
<i>Lydella</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Zorella, Paraphrocera, Leptotachina</i>
<i>grisescens</i> Rob.-Desv., 1830		+		
<i>stabulans</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Lydina</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Polydea, Traulotes, Harrisia, Somoleja, Somatiola</i>
<i>aenea</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Lypha</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Apromyia, Enthenis, Micronychia</i>
<i>dubia</i> (Fallén, 1810)	o	+		
<i>Macquartia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Bebricia, Minellia, Arraltia, Hesione, Javetia, Olbya, Pherecida, Proteremoplax</i>
<i>chalconota</i> (Meigen, 1824)	o			
<i>dispar</i> (Fallén, 1820)		+		
<i>grisea</i> (Fallén, 1810)	o	+		
<i>nudigena</i> Mesnil, 1972		+		
<i>pubiceps</i> (Zetterstedt, 1845)		+		

<i>tenebricosa</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>tessellum</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>viridana</i> Robineau-Desv., 1863		x		
<i>Macroprosopa</i> Br. & Brgst., 1889				
<i>atrata</i> (Fallén, 1810)		+		
<i>Masicera</i> Macquart, 1834				
<i>pavoniae</i> (Rob.-Desv., 1830)	o	x		
<i>silvatica</i> (Fallén, 1810)	o	+		
<i>sphingivora</i> (Rob.-Desv., 1830)		+		
<i>Medina</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Degeeria, Arrhinomyia, Amedoria, Mollia</i>
<i>collaris</i> (Fallén, 1820)		+		
<i>luctuosa</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>melania</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>separata</i> (Meigen, 1824)		+	x	
<i>Meigenia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Zenais, Zaida, Spylosia, Microphana, Tenuicera</i>
<i>dorsalis</i> (Meigen, 1824)	+			
<i>incana</i> (Fallén, 1810)		+		
<i>mutabilis</i> (Fallén, 1810)	o +	+	x	
<i>uncinata</i> Mesnil, 1967	+	+		
<i>Microsoma</i> Macquart, 1855				<i>Campogaster, Plesionevra, Andrina, Andrina, Campylura, Syntomogaster, Ahrensia, Lythia, Stephensia</i>
<i>exiguum</i> (Meigen, 1824)		x		
<i>Mintho</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Agyrtomyia, Wiedemannia</i>
<i>rufiventris</i> (Fallén, 1817)	o +	+	+	
<i>Myxexoristops</i> Townsend, 1911				
<i>blondeli</i> (Robineau-Desv., 1830)		+		
<i>bonsdorffi</i> (Zetterstedt, 1859)		+		
<i>stolida</i> (Stein, 1924)		+		
<i>Nemoraea</i> Robineau-Desv., 1830				
<i>pellucida</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>Nemorilla</i> Rondani, 1856				<i>Aubaea, Pitthaea, Thyrella</i>
<i>floralis</i> (Fallén, 1810)		+		
<i>maculosa</i> (Meigen, 1824)	+	+		
<i>Nilea</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Lylibaea, Phorcida</i>
<i>hortulana</i> (Meigen, 1824)		+	x	
<i>Nowickia</i> Wachtl, 1894				<i>Fabriciella, Xantholarvaevoria, Reinigia, Rhodendorfiola, Fabriciella, Chorezmia</i>
<i>ferox</i> (Panzer, 1809)	o +	+		
<i>Ocytata</i> Gistel, 1848				<i>Racodineura, Roeselia, Ceromasiops</i>
<i>pallipes</i> (Fallén, 1820)		+	x	
<i>Opesia</i> Robineau-Desvoidy, 1863				<i>Euxysta</i>
<i>cana</i> (Meigen, 1824)	+	+		
<i>grandis</i> (Egger, 1860)	o	+	x	
<i>Oswaldia</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Edomya, Erytaea, Phaedima, Entomobosca, Dexodes, Ablondelia</i>
<i>muscaria</i> (Fallén, 1810)		+		
<i>spectabilis</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Pales</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Ctenophorocera, Paloides, Neopales</i>
<i>pavida</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>Panzeria</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Ernestia, Meriania, Platychira</i>
<i>laevigata</i> (Meigen, 1838)		+		
<i>puparum</i> (Fabricius, 1794)	+	+		
<i>rudis</i> (Fallén, 1810)	o	+	x	
<i>Parasetigena</i> Br. & Bergenst., 1891				<i>Duponchelia</i>

<i>silvestris</i> (Robineau-Desv., 1863)		+		
<i>Pelatachina</i> Meade, 1894				<i>Hyria</i>
<i>tibialis</i> (Fallén, 1810)	o +	+	x	
<i>Peleteria</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Peleteria, Faurella, Cuphocera, Cyphocera, Sphyracera, Chaetopeleteria, Palpibraca, Popelia, Tetrachaeta</i>
<i>popelii</i> (Portschinsky, 1882)	+			
<i>prompta</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>rubescens</i> (Rob.-Desv., 1830)		+		
<i>Periarchiclops</i> Villeneuve, 1924				<i>Euprosopaea</i>
<i>scutellaris</i> (Fallén, 1820)		+		
<i>Peribaea</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Strobliomyia, Herbstia</i>
<i>tibialis</i> (Robineau-Desv., 1851)		+		
<i>Periscepsia</i> Gistel, 1848				<i>Phorichaeta, Scopolia</i>
<i>carbonaria</i> (Panzer, 1798)	o	+		
<i>Peteina</i> Meigen, 1838				<i>Petina</i>
<i>erinaceus</i> (Fabricius, 1794)	o +			
<i>Pexopsis</i> Br. & Bergenstamm, 1889				<i>Throphops</i>
<i>aprica</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Phania</i> Meigen, 1824				<i>Weberia, Uromyia, Bohemania, Cercomyia, Neuromyia</i>
<i>albisquama</i> (Villeneuve, 1924)		+		
<i>curvicauda</i> (Fallén, 1820)	o	+		
<i>funesta</i> (Meigen, 1824)		+	+	
<i>Phasia</i> Latreille, 1804				<i>Alophora, Allophora, Hyalomya, Phorantha, Thereva, Alophora, Halophora, Alophorella</i>
<i>hemiptera</i> (Fabricius, 1794)			x	
<i>karczewskii</i> (Drb.-Monko, 1965)			x	
<i>obesa</i> (Fabricius, 1798)	o	+		
<i>pusilla</i> Meigen, 1824	o	+	x	
<i>subcoleoprata</i> (Linnaeus, 1767)	o			
<i>Phebellia</i> Robineau-Desv., 1846				<i>Prooppia, Melibaea, Aetylia, Macropalpus</i>
<i>glauca</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>glirina</i> (Rondani, 1859)		x		
<i>Phenicellia</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Phoenicella</i>
<i>haematodes</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Phorocera</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Setigena, Leptocheata</i>
<i>assimilis</i> (Fallén, 1810)	o	+		
<i>obscura</i> (Fallén, 1810)	o +	+		
<i>Phryno</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Eurygaster, Entomobia, Paraphryno</i>
<i>vetula</i> (Meigen, 1824)	o			
<i>Phryxe</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Blepharidea, Pholoe, Hemithaea, Catachaeta, Eurygastrina, Anoxycampta, Pseudophorocera, Erinia, Blumia, Blepharidopsis, Ceratochaeta</i>
<i>erythrostroma</i> (Hartig, 1838)		+		
<i>magnicornis</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>nemea</i> (Meigen, 1824)	o	+		
<i>prima</i> (Br. & Bergenst., 1889)		+		
<i>vulgaris</i> (Fallén, 1810)	o +	+	+	
<i>Phyllomya</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Phyllomyia, Sericocera, Hypostena, Chorega, Melanota, Melania</i>
<i>volvulus</i> (Fabricius, 1794)	o			
<i>Phytomyptera</i> Rondani, 1845				<i>Phytomyzoptera</i>
<i>nigrina</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Picconia</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Neaeropsis</i>

<i>incurva</i> (Zetterstedt, 1844)		+		
<i>Platymya</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Platymya</i>
<i>fimbriata</i> (Meigen, 1824)	o +	+		Locus typicus für <i>P. genibarbis</i> Mesnil: in Brdbg.
<i>Policheta</i> Rondani, 1856				<i>Pericheta, Perichaeta</i>
<i>unicolor</i> (Fallén, 1820)		+	+	
<i>Prosenia</i> Le Peletier & Serville, 1828				<i>Callirhoe</i>
<i>siberita</i> (Fabricius, 1775)	o +	+		
<i>Pseudopachystylum</i> Mik, 1891				
<i>gonioides</i> (Zetterstedt, 1838)		+	x	Locus typicus für <i>P. wachtlii</i> Mik: Berlin
<i>Pseudoperichaeta</i> Br. & Brg., 1889				
<i>nigrolineata</i> (Walker, 1853)		+		
<i>Ptesiomyia</i> Br. & Bergenst., 1893				
<i>alacris</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Ramonda</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Andrina, Ateria, Pentinops</i>
<i>latifrons</i> (Zetterstedt, 1844)		+		
<i>prunaria</i> (Rondani, 1861)	+	+		
<i>prunicia</i> (Herting, 1969)		+		
<i>Rhaphiochaeta</i> Br. & Brgst., 1889				<i>Mimomeriania</i>
<i>breviseta</i> (Zetterstedt, 1838)		+		
<i>Robinaldia</i> Herting, 1983				
<i>angustata</i> (Villeneuve, 1933)		+		
<i>Rondania</i> Robineau-Desv., 1850				<i>Microtricha, Stylomyia, Dysthrixia</i>
<i>cucullata</i> Robineau-Desv., 1850		+		
<i>dimidiata</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>fasciata</i> (Macquart, 1834)		+		
<i>Senometopia</i> Macquart, 1834				<i>Eucarcelia, Tricarcelia, Stenometopia</i>
<i>confundens</i> (Rondani, 1859)		+		
<i>pollinosa</i> (Mesnil, 1941)		+		
<i>separata</i> (Rondani, 1859)		+		
<i>Siphona</i> Meigen, 1803				<i>Bucentes, Crocuta</i>
<i>confusa</i> Mesnil, 1961		+		
<i>cristata</i> (Fabricius, 1805)	o	x		
<i>flavifrons</i> Staeger, 1849		+		
<i>geniculata</i> (De Geer, 1776)	o +	+		
<i>maculata</i> Staeger in Zett., 1849		x		
<i>pauciseta</i> Rondani, 1865		+		
<i>Smidtia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Megalochaeta</i>
<i>conspersa</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Solieria</i> Robineau-Desvoidy, 1848				<i>Anthoica, Myobia, Anthoeca</i>
<i>inanis</i> (Fallén, 1810)	o	x		
<i>pacifica</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>Spallanzania</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Cnephalia, Cnephaliodes</i>
<i>hebes</i> (Fallén, 1820)	o			
<i>Staurochaeta</i> Br. & Bergenst., 1889				
<i>albocingulata</i> (Fallén, 1820)	o			
<i>Strongygaster</i> Macquart, 1834				<i>Tamiclea, Strongylogaster, Erathia, Etheria, Christophoria, Androphana</i>
<i>celer</i> (Meigen, 1838)	+			
<i>Sturmia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Oodigaster, Ctenocnemis</i>
<i>bella</i> (Meigen, 1824)	o	+	x	
<i>Subclytia</i> Pandellé, 1894				
<i>rotundiventris</i> (Fallén, 1820)		+		
<i>Tachina</i> Meigen, 1803				<i>Echinomyia, Echinogaster, Eudoromyia, Servillia, Echinodes, Periechusa, Pelus, Pareudora, Eupeleteria, Larvaevora</i>

<i>fera</i> (Linnaeus, 1761)	o +	+	+	
<i>grossa</i> (Linnaeus, 1758)	o +	+		
<i>lurida</i> (Fabricius, 1781)		+		
<i>magnicornis</i> (Zetterstedt, 1844)	o	+		
<i>praeceps</i> Meigen, 1824	o			
<i>ursina</i> (Meigen, 1824)		+	x	
<i>Thelaira</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Phenicellia, Tachinella, Phoenicella</i>
<i>nigripes</i> (Fabricius, 1794)	o +	+		
<i>Thelymorpha</i> Br. & Bergenst., 1889				<i>Histochaeta</i>
<i>marmorata</i> (Fabricius, 1805)	o +	+		
<i>Timavia</i> Robineau-Desv., 1863				<i>Neosturmia, Chaetolyga, Homotomia</i>
<i>amoena</i> (Meigen, 1824)		+	x	
<i>Triarthria</i> Stephens, 1829				<i>Digonochaeta, Osmaea, Bigonicheta, Dira, Ramburia, Stephanina, Digonicheta, Trichonerva, Digonochaeta</i>
<i>setipennis</i> (Fallén, 1810)		+	x	
<i>Vibrissina</i> Rondani, 1861				<i>Microvibrissina</i>
<i>turrata</i> (Meigen, 1824)	+			
<i>Voria</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Plagia</i>
<i>ruralis</i> (Fallén, 1810)	o +	+		
<i>Wagneria</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Carbonia, Ocalea, Atrania, Neocalea</i>
<i>costata</i> (Fallén, 1815)	o	x		
<i>cunctans</i> (Meigen, 1824)		+		Locus typicus für <i>W. riedeli</i> Villeneuve: in Brbrg.
<i>Winthemia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Dorbinia, Arge, Eversmannia, Catanemorilla</i>
<i>bohemani</i> (Zetterstedt, 1844)		+		
<i>cruentata</i> (Rondani, 1859)		+ #		Locus typicus für <i>W. ligustri</i> Stein: Berlin
<i>erythrura</i> (Meigen, 1838)	o			
<i>quadripustulata</i> (Fabricius, 1794)		+	x	
<i>rufiventris</i> (Maquart, 1849)	+			
<i>variegata</i> (Meigen, 1824)		+		
<i>venusta</i> (Meigen, 1824)		x		
<i>Zaira</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Viviania, Biomya, Sitophaga, Phegea</i>
<i>cinerea</i> (Fallén, 1810)	o	+		
<i>Zenillia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Myxexorista</i>
<i>libatrix</i> (Panzer, 1798)	o +	+		
<i>Zeuxia</i> Meigen, 1826				<i>Ptilocerina, Eggeria, Peyritschia, Ptilozeuxia, Tapinomyia</i>
<i>cinerea</i> Meigen, 1826		+		
<i>Zophomyia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Avernia, Erebia</i>
<i>temula</i> (Scopoli, 1763)	o	+	x	
TANYPEZIDAE Tanypeziden				BB: 1 / Dt.: 1 / Eur.: 1 / Ww: 20 Arten
<i>Tanypeza</i> Fallén, 1820				
<i>longimana</i> Fallén, 1820	o	+		
TEPHRITIDAE Frucht- Bohrfliegen [<i>Trupaneidae, Trypetidae</i>]				BB: 58 / Dt.: 110 / Eur.: 267 / Ww: 4.300 Arten
<i>Acinia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>biflexa</i> (Loew, 1844)		+		
<i>corniculata</i> (Zetterstedt, 1819)	o	+		
<i>Actinoptera</i> Rondani, 1871				
<i>discoidea</i> (Fallén, 1814)	o	+		
<i>Anomoia</i> Walker, 1835				
<i>permunda</i> (Harris, 1776)		+	x	
<i>Campiglossa</i> Rondani, 1870				
<i>absinthii</i> (Fabricius, 1805)	o	+	x	
<i>loewiana</i> (Hendel, 1927)		+		
<i>plantaginis</i> (Haliday, 1833)		+		

<i>producta</i> (Loew, 1844)	o	x		Locus typicus für <i>P. producta</i> : bei Berlin
<i>punctella</i> (Fallén, 1814)		+		
<i>Ceratitis</i> MacLeay, 1829				
<i>capitata</i> (Wiedemann, 1824)			x	
<i>Chaetostomella</i> Hendel, 1927				<i>Sitarea</i>
<i>cylindrica</i> (Rob.-Desv., 1830)	o	+	x	
<i>Dioxyna</i> Frey, 1945				
<i>bidentis</i> (Robineau-Desv., 1830)		+		
<i>Dithryca</i> Rondani, 1856				
<i>guttularis</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>Ensina</i> Robineau-Desv., 1830				
<i>sonchi</i> (Linnaeus, 1767)	o	+		
<i>Euleia</i> Walker, 1836				
<i>heraclei</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>Heringia</i> Aczél, 1940				
<i>guttata</i> (Fallén, 1814)	o	+	x	
<i>Ictericodes</i> Hering, 1942				
<i>japonicus</i> (Wiedemann, 1830)		+		
<i>Myopites</i> Blot, 1827				
<i>inulaedysentericae</i> Blot, 1827	o			
<i>Noeeta</i> Robineau-Desvoidy, 1830				<i>Oplocheta, Carphotricha</i>
<i>pupillata</i> (Fallén, 1814)	o	+		
<i>Orellia</i> Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>falcata</i> (Scopoli, 1763)		+		
<i>Oxya</i> Robineau-Desvoidy, 1830				
<i>flavipennis</i> (Loew, 1844)	o			
<i>parietina</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>Philophylla</i> Rondani, 1870				
<i>caesio</i> (Harris, 1776)	o	+		
<i>Platyparea</i> Loew, 1862				
<i>discoidea</i> (Fabricius, 1787)		+		
<i>Plioreocepta</i> Korneyev, 1987				
<i>poeciloptera</i> (Schränk, 1776)	o	+		
<i>Rhagoletis</i> Loew, 1862				
<i>alternata</i> (Fallén, 1814)		+	x	
<i>cerasi</i> (Linnaeus, 1758)	o	+	x	
<i>meigenii</i> (Loew, 1844)		+	x	
<i>Sphenella</i> Robineau-Desv., 1830				
<i>marginata</i> (Fallén, 1814)	o	+		
<i>Stemonocera</i> Rondani, 1870				<i>Vidalia</i>
<i>cornuta</i> (Scopoli, 1772)		x		
<i>Tephritis</i> Latreille, 1804				
<i>angustipennis</i> (Loew, 1844)		+		
<i>bardanae</i> (Schränk, 1813)	o	+		
<i>cometa</i> (Loew, 1840)		+		
<i>dilacerata</i> (Loew, 1846)		+		
<i>dioscurea</i> (Loew, 1856)		+		
<i>fallax</i> (Loew, 1844)	o			
<i>leontodontis</i> (De Geer, 1776)	o	+		
<i>neesii</i> (Meigen, 1830)		+		
<i>ruralis</i> (Loew, 1844)		+		
<i>vespertina</i> (Loew, 1844)		+		
<i>Terellia</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Cerajocera</i>
<i>ceratocera</i> (Hendel, 1913)		+		

<i>colon</i> (Meigen, 1826)	o	+		
<i>lappae</i> (Cederhjelm, 1798)	o			Nachweis fraglich
<i>plagiata</i> (Dahlbom, 1850)		#		Locus typicus <i>microceras</i> Hering, 1935: Berlin
<i>ruficauda</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>serratulae</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>tussilaginis</i> (Fabricius, 1775)	o	+		
<i>virens</i> (Loew, 1846)	o	+		
<i>Trupanea</i> Schrank, 1795				
<i>stellata</i> (Fuessly, 1775)	o	+		
<i>Trypeta</i> Meigen, 1803				<i>Spilographa</i>
<i>artemisiae</i> (Fabricius, 1794)	o	+		
<i>zoe</i> Meigen, 1826	o	+		
<i>Urophora</i> Robineau-Desv., 1830				<i>Euribia, Eurasimona, Inuromaesa</i>
<i>affinis</i> (Frauenfeld, 1857)		+	x	
<i>cardui</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>cuspidata</i> (Meigen, 1826)		+		
<i>quadrifasciata</i> (Meigen, 1826)	o	+	x	
<i>solstitialis</i> (Linnaeus, 1758)	o	+		
<i>stylata</i> (Fabricius, 1775)	o	+		
<i>Xyphosia</i> Robineau-Desv., 1830				
<i>miliaria</i> (Schrank, 1781)	o	+	x	
TETHINIDAE Thethiniden				BB: 0 / Dt.: 11 / Eur.: 34 / Ww: 126 Arten
THEREVIDAE Stiletfliegen				BB: 16 / Dt.: 32 / Eur.: 99 / Ww: 815 Arten
<i>Acrosathe</i> Irwin & Lyneborg, 1981				
<i>annulata</i> (Fabricius, 1805)	o +	+		
<i>Clorismia</i> Enderlein, 1927				
<i>ardea</i> (Fabricius, 1794)	o +	+		
<i>Dialineura</i> Rondani, 1856				
<i>anilis</i> (Linnaeus, 1761)	o	+		
<i>Dichoglena</i> Irwin & Lyneborg, 1981				
<i>nigripennis</i> (Ruthé, 1831)	x			Locus typicus: bei Berlin
<i>Pandivirilia</i> Irwin & Lyneborg, 1981				
<i>eximia</i> (Meigen, 1820)		+		
<i>Thereva</i> Latreille, 1796				<i>Exapata, Neothereva, Caenozona, Athereva, Reinigiellum</i>
<i>apicalis</i> Wiedemann, 1821		+		
<i>cincta</i> Meigen, 1820	o	+		
<i>cinifera</i> Meigen, 1830	o	+		
<i>circumscripta</i> Loew, 1847	+			
<i>fulva</i> Meigen, 1804	o +	+		
<i>marginula</i> Meigen, 1820		+		
<i>nobilitata</i> (Fabricius, 1775)	o +	+		
<i>plebeja</i> (Linnaeus, 1758)	o +	+		
<i>rustica</i> Loew, 1840	+	+		
<i>strigata</i> (Fabricius, 1794)	+			
<i>unica</i> (Harris, [1780])	o	+		
THYREOPHORIDAE Thyreophoriden				BB: 1 / Dt.: 2 / Eur.: 2 / Ww: 12 Arten
<i>Centrophlebomyia</i> Hendel, 1903				
<i>furcata</i> (Fabricius, 1794)		+		
TRIXOSCELIDIDAE Trixoscelididen [zu Heleomyzidae, Trichoscelidae]				BB: 3 / Dt.: 4 / Eur.: 16 / Ww: 100 Arten
<i>Trixoscelis</i> Rondani, 1856				<i>Trichoscelis</i>
<i>frontalis</i> (Fallén, 1823)		+	x	
<i>marginella</i> (Fallén, 1823)	o	+		

<i>obscurella</i> (Fallén, 1823)	o	+	+	
ULIDIIDAE Wipp- Schmuckfliegen				BB: 3 / Dt.: 4 / Eur.: 106 / Ww: 700 Arten
<i>Physiphora</i> Fallén, 1810				<i>Chrysomyza</i>
<i>alceae</i> (Preyssler, 1791)	o	+	+	
<i>Ulidia</i> Meigen, 1826				
<i>erythrophthalma</i> Meigen, 1826	o	+		
<i>nigripennis</i> Loew, 1845	o			
XYLOMYIDAE Xylomyiden [Solvidae]				BB: 2 / Dt.: 3 / Eur.: 4 / Ww: 130 Arten
<i>Solva</i> Walker, 1859				<i>Hanauia</i>
<i>marginata</i> (Meigen, 1820)	o +	+	+	
<i>Xylomya</i> Rondani, 1861				<i>Subula</i>
<i>maculata</i> (Meigen, 1804)	+			
XYLOPHAGIDAE Holzfliegen [Erynnidae, Coenomyiidae]				BB: 3 / Dt.: 4 / Eur.: 5 / Ww: 116 Arten
<i>Xylophagus</i> Meigen, 1803				<i>Erinnia, Archimya, Pachystomus</i>
<i>cinctus</i> (De Geer, 1776)	+	+		
<i>compeditus</i> Wied. in Mg., 1820		+		
<i>junki</i> (Szilády, 1932)	+	+		